

# Verzeichniss

der verschiedenen

*feinen Tafel- und Oeconomie-Obstsorten,  
Gehölze für Garten-Anlagen, Gewächshaus-  
Pflanzen,*

aus den Sammlungen

von

**S. & J. Rinz,**

Kunst- und Handels-Gärtner,

in

**FRANKFURT AM MAIN.**

**Herbst 1853 bis Herbst 1854.**

## Zur gefälligen Berücksichtigung.

---

Im *September* oder *October* eines jeden Jahres erscheint ein neues Preis-Verzeichniss, und auch ein solches über *Georginen* gewöhnlich zu Ende *Januar*. Die früheren Ausgaben werden demnach ungültig.


Die Preise sind in Gulden des 24 fl. Fusses, und sind veränderlich je nach der Stärke der Pflanzen und anderen Verhältnissen. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung und *auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller*. — Gewächshaus-Pflanzen werden stets am besten durch die Eisenbahn, den Postwagen oder ähnliche schnelle Gelegenheit befördert.

Briefe und Gelder bitten wir portofrei einzusenden.

Neue, schnell in Vermehrung kommende Pflanzen erfahren oft schon vor der nächsten Catalogs-Ausgabe eine Preiserniedrigung, welche wir in jedem möglichen Falle gerne gestatten.

So gross auch immer der Vorrath der hier verzeichneten Gegenstände genannt werden darf, so können doch unerwartete Umstände irgend einen Mangel herbeiführen, welcher dann gewöhnlich auf einige Zeit fühlbar bleibt. Solche Fälle werden wir umgehend berichten und ähnliche Sorten zu möglichst bester Befriedigung in Vorschlag bringen; übrigens bemerken wir hierbei noch, dass hauptsächlich in Frucht- und Zierbäumen, Sträuchern und Pflanzen für's freie Land die Auswahl im *Herbste* (Ende *October* und *November*) am sichersten allen Wünschen entspricht, dass hingegen *Frühjahrsbestellungen* nicht immer gleich vollständig ausgeführt werden können. —

Die Baumschulen der Anstalt halten über 40 Morgen; Neun Gewächshäuser bedecken einen Flächenraum von mehr als 14,000 □' mit Glas. —

 Aus nördlichen Gegenden gehen uns häufig im Frühjahr nach Aufträge ein, wenn hier die Triebe der Bäume und Sträucher bereits einige Zoll Länge erreicht haben; wir glauben daher um frühere gefällige Bestellungen bitten zu sollen. Sind wir in den Stand gesetzt, die genannten Gegenstände wenigstens noch vor Ende März aus der Erde nehmen zu können, so wird hierdurch der Trieb ohnehin zurückgehalten, und dann lässt sich die Versendung nach Umständen bis Ende April vollziehen. Coniferen vertragen sogar noch spätere Verpflanzung. Topfpflanzen für's Kalt- haus reisen am vortheilhaftesten von *October* bis *December*, wenn frostfrei, dann von *März* bis *Mai*.



## Tafel - und Oeconomie - Obstsorten.

Zur Erleichterung der Auswahl haben wir die Reifezeit und Güte (1., 2., 3. Rang) der meisten Kernfrüchte angemerkt; jedoch dürfte hierbei nicht zu übersehen sein, dass Boden, Klima, Jahrgang, Art der Aufbewahrung u. s. w., oft wesentliche Abweichungen bewirken. Seit vielen Jahren bestreben wir uns, die edelsten für Deutschland angemessenen älteren und neuesten Obstsorten aus den zuverlässigsten Quellen zu sammeln, vorzugsweise aber diejenigen zu vermehren, welche allgemeine Verbreitung wirklich verdienen.

### Kern - Obst.

#### Hochstämmige Äpfel,

erste Auswahl . pr. Stück 30 kr.  
zweite Auswahl . " " 24 "  
pr. 100 Stück fl. 24 bis fl. 40.

#### Tafel - Sorten.

Die mit \* bezeichnet können auch als Pyramiden oder Zwerg auf Johannisstämme veredelt abgegeben werden.

Astrachan White. \* Aug. Sept. 1. Rang.  
Beachamwell. \* Dec. März. 1. Rang.  
Barzeloner Pearmain. Dec. Mat. 1.  
Calville blanc d'hiver. \* Jan. Apr. 1. Rang.  
rouge d'hiver. \* Nov. Dec. 2. Rang.  
d'automne. \* Oct. Nov. 2. Rang.  
Court pendu plat. \* Dec. Apr. 1. Rang.  
Danziger Kant-Apfel. Sept. Nov. 1.  
Dominiska. \* Dec. Febr. 2. Rang.  
Early Marguerite.  
Edelhorsdorfer, \* wegen langsamem Wachsthum  
pr. Stück 48 kr.  
Englischer Winter-Goldpearmain. \* Dec.  
März. 1. Rang. (King of pepins.)  
(sehr empfehlenswerth).  
Gefleckter Goldapfel. \* Nov. Jan. 2. Rang.  
Gestreifter Himbeerapfel.  
Graevensteiner, \* vorzüglich. Oct. Dec.  
Kaiser Alexander, \* prächtvoll. Oct. Nov. 2.  
Kiswick's Codlin.  
Köstlicher von Kew. Dez. März. 1.  
Lord Nelson. \*  
Menagère. \* sehr groß. Oct. Dec. 3.  
Old nonpareil. \* Jan. Mai. 1.  
Penningtons seedling \* Nov. März. 1.  
Polnischer Zuckerapfel.  
Pommeranzen-Apfel. \* Oct. Jan. 2.  
Pomme de St. Louis. \* Aug. Sept.  
Reinette Baumann. \* Nov. Mai. 2.  
Carpentine. \* Nov. März. 2.  
Carmin. \*

Reinette Crete's Quitten. \* Dec. März. 2.  
d'Angleterre. \* Jan. Mai. 2.  
de Breda. \* Dec. März. 1.  
d'Orleans. \* Dec. April. 1.  
de Rochelle. \* Oct. Nov. 2.  
du Canada. \* Nov. April. 1.  
du Nord. \* hält 1 Jahr. 2.  
franche. \* hält 1 Jahr. 2.  
Gasdonker Gold. \* Dec. April. 1.  
grise d'automne. \* Nov. 2.  
grosse Casseler. \* Nov. März. 1.  
Holländische Gold- \* Dec. März. 1.  
Kräuter- Dec. Mai. 1.  
Montbron. \* Dec. Mai. 2.  
Montmorency. Jan. Mai. 2.  
Muscat. Nov. Juni. 1.  
Niemann's rothe. \* Dec. März. 2.  
Roussé.  
truite. \* März. Juni. 2.  
Uelner's Gold- \* Dec. März. 1.  
Ribston's pepin. (vorzüglich.) \* Nov. Jan. 2.  
Royale de Christ. \* Jan. März. 1.  
Seedling Young. \* Jan. März. 2.  
Summer-golden pepin.  
Transparent.

#### Oeconomische Sorten.

pr. 100 Stück fl. 30 bis fl. 40.

Anhalter. (schnellwachsend.) Weinobst.  
Api le gros. Oct. April. 2.  
le petit. ditto.  
Bedfordshire foundling. Nov. März. 1.  
Blenheim Orange. \* Nov. Febr. 1.  
Blutrother Wintercardinal. Dec. März. 2.  
Dübener Glasapfel.  
Fassapfel.  
Fränkischer Königsapfel.  
Gelber Calville-Rambour. Nov. Dec. 3.  
Gelderscher Kronenapfel.  
Gestreifter Rettigapfel.

Gestreifter Franziskaner  
 Golden Harwey. \* Dec. Mai. 1.  
 Grosser Bohnapfel, (zu empfehlen.) Jan. Juni.  
 Grosser Nassauer.  
 Grosser Winterfleiner. Nov. März. 3.  
 Grüner Fürstenapfel. 1 Jahr. 3.  
 Grüner Kaiserapfel. Dec. Febr. 3.  
 Grüner von Sedan.  
 Gutleuthöfer.  
 Hawthornden. \* Oct. Dec. 1.  
 Kaisersheimer.  
 Kohlapfel, schwarz-schillernder (zu empfehlen). Weinobst.  
 Köstlicher von Schudt.  
 Lehmann's Ungarapfel.  
 Lothringer bunter Gulderling. Nov. Jan. 2.  
 Matapfel, brauner. Nov. März. 3.  
 spätblühender.  
 weisser. Dec. Juni. 3.  
 Mostapfel.  
 Norfolk Beaufin. \* Jan. Juni. 1.  
 Northern greening. \* Nov. April. 1.  
 Princessinapfel. Nov. Jan. 3.  
 Propsteiapfel.  
 Rheinischer Bohnapfel.  
 Rheinischer Wandapfel.  
 Rother Specialapfel.  
 Rother von Sedan.  
 Rother Winter-Rambour. Dec. März. 2.  
 Schafnase. Weinobst.  
 Schomburger Purpurstreifling.  
 Schöner Marienapfel.  
 Sommerfleiner. Sept. Nov. 2.  
 Spanischer gestreifter Gulderling.  
 Streifling. Weinobst.  
 Streifling königlicher. Dec. Juni. 2.  
 Streifling, Lütticher platter Winter-  
 Winterstettiner, ächter rother (vorzüglich.)  
 Winterstettiner, ächter gelber. Dec. März 2.  
 Winter-Citronapfel. Dec. März. 3.  
 Zehendheber, (zu empfehlen.)  
 Zwiebelborsdorfer Nov. März.

Die vorstehenden Sorten sind dieses Jahr in sehr bedeutender Anzahl und aussergewöhnlich kräftigen, jungen schönen Stämmen vorrätig, deren Kultur und Beschaffenheit überall das beste Gedeihen verspricht.

Tafel-Sorten wachsen in der Regel langsamer als ökonomische, wenn daher bei erster Auswahl auch oft schwächere Stämme sich befinden, so liegt dies grösstentheils in deren Eigenschaft.

Von nachstehenden, den vortrefflichen Cidre der Normandie liefernden Sorten, das Stück zu 48 kr.

- Nr. 1. Gros amer doux.
- » 2. Petit amer doux.
- » 3. Fréquin rouge.
- » 4. Gabayeux.
- » 5. Bérard.
- » 6. Dechenay.
- » 7. Court a pied.

## Pyramiden- oder Zwerg-Aepfel, auf Johannisstämme veredelt,

Der diesjährige Vorrath hiervon ist geringer als gewöhnlich.

pr. Stück 24 kr.

Die auf Johannisstämme veredelten Aepfelstämmchen gewähren bei guter Pflege ganz besondere Vortheile und Genüsse; sie eignen sich ebensowohl für grosse als sehr kleine Gärten, indem sie nur wenig Raum bedürfen, gewöhnlich schon im zweiten Jahre und darauf immer reichlich tragen, vorzügliches Tafelobst liefern und im Laufe ihrer Blüthe und Obstentwicke- lung das mannigfaltigste und herrlichste Ansehen erhalten. Freilich erfordern sie hierzu einen wenigstens mässig kräftigen Gartenboden, diesen aber nur von 1½ bis 2 Fuss Tiefe, weil die vielen Saugwurzeln mehr auf der Oberfläche sich ausbreiten. Aus diesem Grunde wirkt auch das öftere Bebauen und Düngen äusserst vortheilhaft auf kräftiges Wachstum und grösseren Obstertrag. — In Töpfe oder kleine Kübel gepflanzt, gedeihen sie ebenfalls vor- trefflich, und bilden in kurzer Zeit die trag- barste Obst-Orangerie.

Adams Pearmain. Nov. Febr. 1.  
 Alfriston. Nov. April. 1.  
 August von Mons (Engelsapfel.) Oct. Dec. 2.  
 Beats pepin. Nov. Jan.  
 Beauty of Kent Oct. Febr. 1.  
 of Wils. Nov. Dec.  
 Bentzler. Dec. Mai.  
 Black Gilliflower.  
 Blenheim pippin. Nov. Febr. 1.  
 Boston-Roussel.  
 Bullock's pippin.  
 Calville blanc d'été. Aug. Sept. 2.  
 Calville, rother Herbst-Anis- Sept. Oct. 1.  
 Chataigne. Dec. Juni.  
 Claygate pearmain. Nov. März. 1.  
 Cockle pippin. Jan. April. 1.  
 Cobham apple. Nov. Jan. 2.  
 Court pendue pippin.  
 Crafton apple.  
 Downton nonpareille. Dec. April. 1.  
 Early red Margarete.  
 Franklins gold-pippin. Oct. Dec. 2.  
 Gelber gestreifter Sommerpearmain. Sept. 2.  
 Glasapfel.  
 Golden noble. Sept. Oct. 2.  
 Goldmohr. Dec. März. 2.  
 Grange apple. Oct. Febr. 2.  
 Grosser Muscelli.  
 Herefordshire pearmain. Nov. März. 1.  
 Hugh's new golden pippin. Dec. Febr. 1.  
 Irish peach apple. Aug. Sept. 1.  
 King of pippins. Oct. Jan. 1.  
 Kirk's Fame.  
 Kirk's scarlet pippin.  
 Kirk's seedling golden pippin.  
 Kiswick Codlin.  
 Königsapfel von Jersey. Nov. Jan. 2.  
 Ladys Finger.  
 Lothringer Sommer-Rambour. Sept. 1.  
 Mank's Codlin. Aug. Oct. 1.  
 Maidens Blush. Sept. Oct. 2.  
 Monstruous gloria mundi. Nov. Jan. 1.



Negre d'orée.  
 Oslin. Aug. Sept. 1.  
 Palästiner. Aug. 2.  
 Pearmain federal. Dec. März. 1.  
 Pomme de Rose.  
 Possart's Moskauer Nalivia. Nov. Dec. 2.  
 Red Astrachan. Aug. Sept. 2.  
 Reinette Ananas. Nov. April. 1.  
 Bischoff. Nov. April. 1.  
 Champagner.  
 Citronen. Dec. Mai. 2.  
 Damason.  
 d'Espagne. Dec. Jan. 1.  
 d'Hollande. Oct. Nov. 1.  
 de Normandie. Oct. Nov. 2.  
 de New York.  
 Dietzer rothe Mandel-. Dec. Juni 1.  
 d'Orre de Christ. Dec. März.  
 de Sorgkiet. Dec. März.  
 englische Gold.  
 englische Granat. Dec. April. 1.  
 englische Spital (Sickhouse). Dec.  
 April 1.  
 gelbe spanische. Dec. Jan. 1.  
 goldgelbe Sommer- Sept. Nov. 2.  
 Graf Sternbergs röthliche.  
 grise d'orée.  
 Kirk's golden.  
 Limonen.  
 Menonisten. Dec. April. 2.  
 Normander.  
 Piqué. Dec. März.  
 Saffran. Nov. März. 2.  
 Schwarze's Blut- Nov. März. 1.  
 van Mons. Dec. März. 1.  
 Walliser Limonen.  
 Willy's gelbe. Nov. März. 1.  
 Zimmet. Dec. März. 1.  
 Red Ingestrie. Oct. Nov. 1.  
 Red Island greening. Dec. April. 1.  
 Robinsons pippin. Dec. Febr. 1.  
 Roman Stem. Nov. Dec. 2.  
 Romarin blanc. Nov. Febr. 1.  
 Rother Wiener Sommerapfel. Oct. 2.  
 Soll pippin.  
 Spencer's pippin.  
 Sugarloaf-pippin. Aug. 1.  
 Summer golden peppin. Aug. Sept. 1.  
 Tyroler Rosenapfel. Dec. Juni. 2.  
 Türkischer Muskatteller.  
 Weisses Herbstrich. Nov. Dec. 2.  
 Weller's Eckenhagner.  
 Wellington.  
 Wick's Fancy.  
 Wormsley pippin. Sept. Oct. 1.

## Hochstämmige Birn,

pr. Stück 30 kr.

Die mit \* bezeichnet können auch als Pyramiden  
 oder Zwerg auf Quitten veredelt abgegeben  
 werden.

Belle fondante. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Belle et bonne. \* Sept. 2.  
 Bergamotte Crassanne. \* Nov. Dec. 1.  
 Bergamotte Pentecôte. \* Jan. April. 2.  
 Bergamotte Nouvelle Pentecôte. \* ditto 1.  
 d'Hollande.  
 Sageret \* Febr. 2.  
 Beuré blanc. \* Sept. 1.  
 gris. \* Sept. 1.  
 d'Amatis \* Sept. 1.  
 Bouquain \* Oct. 1.  
 Diel \* Nov. 1.  
 Navez \* Nov. 1.  
 d'Arenberg. \* Nov. Febr. 1.  
 d'Argenson. \* Nov. Jan. 1.  
 Napoléon. \* Oct. Nov. 1.  
 Bezy Chaumontel. \* Nov. März. 1.  
 Bon chrétien d'été. \* Sept. 2.  
 d'hiver. \* Dec. März. 2.  
 Carazi de Metz. Oct. Weinbirne.  
 Citron de Carmes panaché, fräheste. Juli, Aug.  
 Collmar. \* Nov. Febr. 1.  
 Colmar Nelis d'hyver. \*  
 Collomas espige. \* Dec. Jan. 1.  
 Dearborn's Seedling. \* Aug. Sept. 1.  
 Delice de Charneux. \*  
 Duchesse d'Angoulême. \* gr. Oct. Nov. 1.  
 Echasserie. \* Nov. Jan. 1.  
 Epargne. \* Aug. 1.  
 Epine d'élé. \* Sept. 2.  
 Feine September Goldbirne.  
 Fassli Birne. Oct. Weinbirne.  
 Gros cuisse Madame. \* Aug.  
 Gros Rousselet. \* Sept. Oct. 1.  
 Leon Leclercq de Laval. \* März, Mai. 2.  
 Jean Baptist (Van Mons). \* Jan. Febr. 3.  
 Muscat Robert. \*  
 Orphelin d'Enghien. \* Nov. Jan. 1.  
 Passe Collmar. \* Dec. Febr. 1.  
 Pfaffenbirne.  
 Poire d'œuf. \* Aug. 1.  
 Poire de St. Pierre. \*  
 Seigneur. \* Sept. 1.  
 Poire truite. \* Nov. Jan. 1.  
 Reine des poires (Esperin). Nov. Jan. 1.  
 Royale d'hyver. \* Dec. Febr. 1.  
 Schönlins Winterbuttebirne. \* 1.  
 St. Germain. \* Nov. April. 1.  
 Studtgarter Weinbirne.  
 Studtgarter Rousselette.  
 Suzette de Bavaix (Esperin). \* Febr. Apr. 1.  
 Sylvange. \* Oct. Nov. 2.  
 Tarquin de Pyrennès. \* hält zwei Jahre, Kochbirne.  
 Urbaniste. \* Oct. 1.  
 Verte longue. \* Oct. 1.  
 Virgouleuse. Nov. Jan. 1.  
 Wolfsbirne (Weinbirne).  
 Welsche Bratbirne (Champagner Weinbirne).  
 ditto ditto mit welligem Laube.  
 Wintercrassanne. \* 1.  
 Von nachstehenden meistens ökonomischen  
 Sorten à 24 kr.  
 Alexander.  
 Baum'sche Birne.

Beuré Briel.  
Gaebacher Bestebirne.  
Klotzbirne.  
Margarete la grosse.  
Röthelsbirne.  
Speckbirne.  
Schollen oder Eisenbirne.  
Stümppling.  
Wahlbirne.

## Pyramiden- oder Zwergbirn, auf Quitten veredelt.

pr. Stück 28 kr.

Von den auf Quitten veredelten Birnstämmchen gilt dasselbe, was über Zwergäpfelstämmchen bemerkt wurde; doch sind nicht alle Sorten für die Topfkultur oder Obstorangerie zu empfehlen, weil sie überhaupt einen tieferen reichen Boden verlangen, in dessen Ermangelung die besten Sorten oft sehr unvollkommenes, steinigtes und rissiges Obst bringen. Obgleich ein feuchtes Erdreich als sehr günstig betrachtet wird, so kränkeln hingegen alle Birnbäume, wenn ihre Wurzeln in einen sumpfigen Untergrund hinabreichen. Gegen das letzte Uebel schützt öfteres Verpflanzen, wodurch die Wurzeln am sichersten nach der Oberfläche geleitet werden können.

Andrews.  
Belle de Bruxelles. Sept. Oct. 1.  
Bergamotte d'été. Sept. 1.  
Cadette.  
d'Hollande. Mai. Juni.  
de Quercy.  
Beuré Auroré. Oct. 2.  
Beauchamps. Nov. 1.  
Bouquain. Sept. Oct. 1.  
Campiement. Oct. 2.  
Colmar d'automne.  
d'Amatis. Sept. 1.  
Dié. groß und vorzüglich. Nov. Dec. 1.  
Lombard (Esperin).  
Rance. Febr. April. 1.  
Romain. groß und gut. Sept. Oct.  
Rose. Oct. Nov. 1.  
rouge. Oct.  
van Mons. (sehr groß und schön. Nov. 1.  
Bezy blanc (vorzüglich).  
Esperin (Bavaix) Dec. Jan. 1.  
de Motte. Oct. Nov. 1.  
Bleeckers Meadow.  
Bon chrétien sans peppins  
de Bruxelles. März. 3.  
d'Espagne. Nov. Dec. 2.  
Napoleon. Oct. Nov. 1.  
Bonne Louise ou Avanchic. vorzüglich. Oct.  
Bretagne la Cour.  
Brown park.  
Catillac. groß. Roghbirne. Nov. Mai. 3.  
Charly (van Mons.)  
Chaptal. groß. Roghbirne. Nov. April.  
Citron de Carmes panaché. Aug. 1.  
de Sierens. Aug.

Clara.  
Clement (van Mons.)  
Colmar d'Arenberg.  
Nelis d'hiver.  
Comperette. schön. Aug. Sept. 1.  
Coter pear. Octob., mittelgroße, feine Butterbirne.  
Cumberland.  
Davy.  
Dearborns Seedling. (vorzüglich.) Aug. Sept. 1.  
Delbeg.  
Delice d'Hartenpont. Nov. 1.  
Jodoyne. Nov. Dec. 1.  
Deroll's Herbstmuscateller.  
Duchesse de Berry.  
Dumortier. (vorzüglich.) Oct. Nov. 1.  
Duquesne d'été. Sept. eine sehr feine Butterbirne.  
Easter beuré. Jan. März. 1.  
Echasserie. (Zagbbirne.) Nov. Jan. 1.  
Epine d'été. (sehr gut und volltragend.) Sept. 2.  
Famengo.  
Feine September-Goldbirne. (vortreflich.)  
Flemish beauty. Sept. Oct.  
Fondante de Lille.  
Sickler. Oct.  
Forellenbirne. Nov. 1.  
Forster's St. Michaels. Sept. 1.  
Fourcroy. Dec. Jan. 2.  
Frankreal d'été. Sept. 1.  
Frühe wohlriechende Pommeranze. August.  
Sept. 1.  
Gansell's Bergamotte. Oct. Nov. 1.  
Gendebien.  
Glou morceau de Chambon. Nov. Jan. 1.  
Golden beuré of Bilbao. Octob. richtig schön.  
Green yair. (sehr empfohlen.) Sept.  
Grand Mogul. Oct. Nov. 3. sehr groß.  
Gros cuisse Madame. (vortreflich.) Aug.  
Gros Rousselette de Rheims. Aug. Sept.  
panaché. Aug. Sep.  
Hartenpont's Winterbutterbirne. Nov. Dec. 1.  
Hasselt. groß und sehr gut. Ende Aug.  
Heathcote.  
Henriette. Novemb. sehr groß, prächtig.  
Hericourt.  
Hooper's Bilbao.  
Jean Baptist (Van Mons). Jan. Febr. 3.  
Jutte.  
Imperial. März. April. 3.  
Julienne. sehr schön und vortreflich. August.  
Kleine Zimmt-Rousselette. Sept. 2.  
Leon Leclercq (Van Mons) vorzüglich. Febr. //  
April. 1.  
Margarethibirne.  
Maria Louise nouvelle.  
Marie Louise. (vortreflich.) Oct. Nov. 1.  
Marly.  
Martin sec. Nov. Dec. 3. Kompotbirne.  
Messire Jean. Nov. Dec. 2.  
Monarch. Jan. 1.  
Muscat blanc.  
Naumkeag.  
Oakley-Park-Bergamotte. Oct. 1.  
Passe Colmar. Dec. Febr. 1.



Poire Ananas. Oct. 1.  
Avignon.  
de Curé. Nov. Dec. 3.  
fortuné. (sehr lange halbkug.) Jan. Juni. 2.  
truite. Sept. Oct. 1.

Poitau.  
Prince St. Germain.  
Princesse royale (Groom).  
Prinz Ferdinand, (sehr empfohlen.) Dec. März 1.  
Reine d'hiver.  
Reine des poires (Esperin). Nov. Jan. 1.  
Roi de Rome. IV.  
Rousse lench. Jan. Febr. 2.  
Rothe Orange.  
Royale d'hiver. Dec. Febr. 1.  
Salisbury. Sept. Oct. 1.  
Secklepear. (vortügl., von America.) Oct. 1.  
Seilebirne. Oct.  
Schönlings Winterbutterbirne. IV.  
Soldat Laboureur (Esperin). Dec. Jan. 1.  
St. Germain von Mons.  
St. Ghislain. Sept. 1.  
Sucré d'Hoyerswerda. Aug. Sept.  
Sucré verte. II.  
Sylvange. Oct. Nov. 2.  
Thompson's. Nov. 1.  
Tyson. vortügl. Aug. Sept.  
Urbanist. (vortügl.) Oct. 1.  
Verte longue panaché. Oct.  
Wahre Pfingst-Bergamotte. IV.  
Washington. Oct. klein, sehr fein.  
Webbers autumnal. IV.  
Whitefield. Nov. 2.  
Wilbur.  
Williams bon Chrétien. Sept. 1.  
Winter-Crassane. IV.

### Ferner neu gesammelte Birn. in geringerem Vorrath.

pr. Stück 36 kr.

Amalis panaché. Sept. 1.  
Ananas belge. Oct. 1.  
Angora. größte Korbirne. Jan. März.  
Belle fondante.  
Belle de Noël. Dec. Jan. 1.  
Bellissime d'été. Aug. 1.  
Bergamotte Sageret. Febr. März. 2.  
Bergamotte d'Angleterre. Sept. Oct.  
Bergamotte d'été.

Beuré Bronzé. Dec. Jan.  
Benner.  
d'Angleterre de Noissette. Sept. Oct. 1.  
de Bois. Oct. 1.  
Engelbert. gros. Dec. Jan. 2.  
gris d'hiver nouveau. Jan. März.  
Moiré.  
Navez (Bouvier). Nov. 1.  
Bon Chrétien William. Sept. 1.  
Bonne grise fondante.  
Calbasse d'été (Esperin). Aug. Sept. 1.  
Collomas (stüßliche Winterbirn.) Dec. Jan. 1.  
Colmar Van Mons. März. April. 2.  
Delice d'Hartenpont d'Angers. Oct. Nov. 1.  
Delice de Charneux.  
Doyenné Pomier. Sept. 2.  
d'été. Juli. 1.  
d'hiver nouveau. Dec. März. 1.  
Duchesse d'Angoulême panaché. Oct. Dec. 1.  
Duchesse de Berry d'été. Aug. Sept. 1.  
Fondante de Malines (Esperin). Dec. Jan. 1.  
Fondante de Noissette.  
Franchipanne. Oct. Nov. 2. Compoisirne.  
Frédéric de Württemberg (V. Mons). Sept. 1.  
Gros Muscat. Sept. 1.  
Henry van Mons. Dec. 1.  
Incomparable Hacons. Nov. 1.  
Josephine de Maline (Esperin). Febr. Apr. 1.  
Lem Leling (?).  
Leon Leclercq (v. Mons). Febr. April. 1.  
Leon Leclercq de Laval. März-Mai. 2.  
Maria Louise Delcourt. Oct.-Nov. 1.  
Mignonne d'hiver.  
Muscat Robert.  
Orpheline d'Enghien (Deschamps). Nov.  
Jan. 1.  
Passe Colmar dorré. Dec. Febr. 1.  
de Bavay. Dec. Febr. 1.  
musqué (Esperin). Oct. Nov. 1.

Poire de Pomme. Oct. Dec. 2.  
de Chair.  
de St. Pierre.  
Leurs. Oct. Dec. 1.  
Pêche (Esperin). Oct.  
Seigneure. Sept. 1.  
Seigneur d'Esperin. Oct. Nov. 1.  
St. Michael Archange. Oct. 1.  
Suzette de Bavaix (Esperin). Febr. Apr. 1.  
Vergaline musqué. Aug. Sept. 1.  
Tarquin des Pyrenées. hat 2 Jahre, Korbirne.

Eine Parthie schöner Pyramiden-Birn auf Quitten in den besten Sorten, von durch Versehen die Namen verloren gingen, bieten wir an zu 20 kr. pr. Stück, fl. 3. 36 kr. pr. Dutzend, fl. 25 pr. 100 Stück.

# Stein - Obst.

## Abricot.

Folgende Sorten können sowohl in Hochstämmen als Zwerg, Spalier oder Pyramiden in schöner, kräftiger Auswahl abgegeben werden.

**Hochstämme** . . . . pr. Stück 40 kr.  
**Zwerg, Spalier, Pyramid.** . . . 30 .  
**Alberge.**

à fruits longue.  
à fruits rond.

blanc Muscat.

Commun.

d'Ailsa.

d'Angoumois hatif.

d'Hollande.

de Nancy (Pfirschen-Abricot) sehr saftreich.

de Paris.

de Provence.

de St. Ambroise.

de Sardeigne.

du Chili lacinié.

du Luxembourg.

du Nord.

gros pêche, sehr saftreich.

gros rouge hatif.

hatif musqué, kleine, früheste.

Mauntgaut.

Moorpark.

Mush-mush.

musqué milieu.

panaché.

pêche hatif d'Ulines.

précoce le gros, frühe, saftreich.

royale.

Rumblers grosse.

## Pflaumen.

Die mit † können hochstämmig, jene mit \* bezeichnete Sorten niederstämmig oder zu Spalier geliefert werden.

Wo kein besonderer Preis bemerkt kosten:

**Hochstämme erster Auswahl** pr. Stück 40 kr.  
" **zweiter** " " 36 .  
**Niederstämme oder Zwerg** " " 30 .

Der Vorrath der Pflaumen ist dieses Jahr so vollständig, dass wir mit Zuversicht vertrauen, jedem billigen Wunsche entsprechen zu können.

† \* Abricoté.

† \* Caledonian, größte, runde, blaue.

† \* Catalogne, früheste gelbe, mirabellenartige, reift Ende Juli.

† \* Coes fine late red.

† \* Coes golden Drop.

† \* Damas Aubert rouge, süßlich.

† \* Mirabelle jaune, die gelbe Mirabelle.  
† \* d'Anjou.

† \* Downton's Imperatrice.

† \* de Bienne, süßlich.

† \* de Monsieur, Hercepsplume.

† \* de Monsieur jaune, neu pr. St. 48 kr.

† \* de Montford.

† \* Diamond, sehr gr., lang, gelblich, rothbackigt.

† \* Diaprè rouge, rothe.

† \* Fellemberg.

† \* Gloire Schönberg, neu.

† \* Gros Damas blanc, Eierpflaume.

† \* Ickworth Imperatrice.

† \* Knight's plum, sehr früh, roth, mirabellenartig.

† \* Mirabelle, Grosse späte gelbe, eine süßliche, vorzügliche, höchst empfehlenswerthe Frucht.  
† pr. Stück 48 kr.  
36 .

† \* Mirabelle, größte, früheste, gelbe, sehr empfehlenswerth.  
pr. Stück. 48 kr.

† \* Mirabelle tardif v. Metz, späte Mirab. v. Metz.

† \* Mirabelle von Bieberich.

† \* Nectarine plum, groß, blau, sehr gut.

† \* Perdrigon rouge.

† \* Ponds Seedling, ungemein groß, prächtig roth.

† \* Prince of Wales, neu, sehr empfohlen.  
pr. Stück fl. 1. — kr.

† \* Reine blanche, neu, sehr empfohlen.  
per Stück fl. 1. — kr.

† \* Reine Claude Aloyse, Frankfurt's Erzeugniß, vorzüglich bei edelster, großer Form den feinsten Geschmack.  
pr. Stück 48 kr.

† \* Reine Claude de Bavay, sehr empfohlen.  
† pr. Stück 48 kr.  
36 .

† \* Reine Claude verte, gewöhnliche große grüne.

† \* Reine Claude rouge.

† \* Reine Claude violette, große blaue.

† \* Reine Claude Washington, allgrößte grüne.

† \* Robe de Sergeant.

† \* Sharp's Emperor, sehr groß, kugelförmig, bläulich-roth und gelblich.

† \* St. Catharine jaune.

† \* Shropshire Dawson, größte, zwetschartige.

† \* Yorkshire wine sour.

† \* Zwetsche, frühe blaue, englische.

† \* Zwetsche, große, frühe.

† \* Zwetsche, große gewöhnliche.  
pr. Stück 24 bis 30 kr.

† \* Zwetsche, große Leipziger.

† \* Zwetsche, große ungarische.

† \* Zwetsche, italienische, größte, vorzüglichste.

† \* Zwetsche, Frankfurter Pfirsche, Frankfurt's Erzeugniß größer, saftiger und feiner als die italienische Zwetsche. † pr. Stück fl. 1. 12 kr.  
\* pr. Stück 48 kr.



## Kirschen.

Die mit † bezeichneten können hochstämmig auf Wildlinge, und die mit \* als Pyramid oder Spalier auf Prunus Mahaleb veredelt abgegeben werden.

**Hochstämme** pr. Stück 30 kr.  
**Pyramiden oder Spalier** „ 24 „

Die Kirschen, besonders die auf Prunus Mahaleb veredelten Sorten in Pyramidenformen, begnügen sich vor allen anderen Obstbaumgattungen mit dem magersten Boden und können unter diesen Umständen vorzugsweise zu Anpflanzungen in Gruppen, an Wandspaliere, zur Deckung von Mauern, mit vielem Nutzen und zu grosser Zierde Verwendung finden. Die Stämmchen sind ausgezeichnet schön und stark.

- † \* Amarelle, rothe, sauer, Juli.
- † \* Amarelle, schwarze, bitto, bitto.
- \* Americain, sauer, Juli.
- \* Americain ou Houet, bitto.
- \* A feuilles de Saule, beste, frühe, süsse.
- † \* Belle Audigoise, ausgezeichnet schön u. schmackhaft.
- † \* Belle de Choisy.
- † \* Belle et Bonne, vorzüglich.
- † \* Bigareau Malacord, neu. pr. Stück 48 kr.
- † \* Brune de Bruxelles.
- † \* d'Angleterre hatife, früh und gut, halbsauer.
- † \* d'Espagne, sauer, Juli.
- \* de Holstein
- \* de Neufchateau.
- † \* des Toussaints.
- \* de Spaa (Belle de Chateauf), vorzüglich.
- \* de Virginie, wilde Weichsel.
- † \* Drogan's gelbe Knorpelkirsche.
- † \* Early of Richmond, früh, groß und gut.
- † \* Elkhorn de Maryland.
- † \* Englische schwarze.
- † \* Flammentine, neue Art, unübertrefflich.
- † \* Fraser's, schwarze tartarische.
- † \* Frühe rothe. Juni.
- † \* Grosse frühe Mai.
- † \* Guigne écarlate, rothe Fleischkirsche.
- † \* jeaune, gelbe.
- † \* noir hatife, schwarze Fleischkirsche.
- † \* Herz, rothe.
- † \* schwarze.
- † \* späte.
- † \* Dachsenberg.
- \* Incomparable en bonté.
- † \* Kleparow, dunkel, sauer, Juli.
- † \* Lauermann's grosse Napoleon, süß, Juli.
- † \* Mayduke, Juni.
- † \* Monstrueuse de Bavay, neu, vorzüglich, Juli.
- † \* Montmorency, sauer, Juni.
- \* Longleys à longue queue, vortrefflich.
- \* Muscat praque, braun, halbsauer.
- † \* Ostheimer Sauerkirsche.
- \* panaché jaune.
- \* Portugal de Becker.
- † \* Reine Hortense, neu, vorzüglich.
- \* Rothe zuckersüsse.

- † \* Royale.
- † \* d'Angleterre hatif, früh, groß und gut.
- † \* d'Angleterre tardif.
- \* Spanische Weichsel.
- † \* Speckkirsche.
- † \* Schatten-Morelle, wird für schalligste Stellen ungemein angerühmt.

## Pfirschen.

Pfirschen verlangen bekanntlich reichen Boden, gute Lage und entsprechende Pflege; desshalb werden sie im Allgemeinen nur an Mauern gegen Osten und Süden erzogen. Hochstämme kommen nur in äusserst geschützten Lagen gut fort, daher ist der Vorrath hiervon auf wenige Sorten beschränkt, welche mit einem \* bezeichnet sind.

**Hochstämme** pr. Stück 48 kr.  
**Spalier** „ 36 „

- Admirable, belle de Vitry, Ende Sept. \*
- A fleurs double, schönblühend.
- Alberge jaune.
- Avant Pêche, August.
- Belle de Beauce, groß, Ende Sept.
- Brugnon musqué, naht.
- Chancellor, Aug. u. Sept.
- Chevreuse hatife, Aug., u. Sept. \*
- d'Hollande.
- d'Isphahan, feinsblättrig.
- d'Malthe, August.
- Grosse bonne (Audibert.)
- Grosse Mignonne, Aug., Sept. \*
- Grosse Mignonne précoce, Aug.
- Grosse Montagne précoce, Aug., Sept.
- Hollaendische doppelte Montagne, Sept.
- Zwoolische, Sept.
- Madeleine blanche.
- de Courson, Sept. \*
- de Bollviller, Sept.
- rouge, Sept. \*
- Monstrueuse.
- Mores white free flore.
- Nivette pourpré, Sept.
- Pavie.
- Pavie de Newington.
- Pêche de Neipperg, neu.
- Petite Mignone (Double de Troyes)
- Pourpre hatif, August.
- Pourpre vineuse, Sept.
- Princesse Marie de Württemberg, neu.
- Rothe August-, \* sehr früh, starkwüchsig, volltragend, groß und vollsaftig, daher wohl eine der vorzüglichsten Sorten für das deutsche Klima.
- Royale, groß, Sept.
- Sanguinole, Blutpfirsich.
- Teton de Venus, groß, Sept. \*

## Weinreben.

Wo kein besonderer Preis bemerkt: **pr. Stück 12 kr.**

Von folgenden Wein- und Tafeltraubenforten können wir zum Theil sehr bedeutende Lieferungen übernehmen und wird dann der Preis nach Maassgabe der Aufträge ermässigt.

### Tafelsorten.

**Basilicum-Rebe (Bronner)** früh, äusserst delikat und süß, ganz neu **fl. 1. 30 kr.**  
**Blussard noir**, oder Jacobstraube, von allen die früheste.  
**Bianca capella**, früh, schwach. **24 kr.**  
**Brasilianer**, früh, schwach. **36 kr.**  
**Chasselas blanc**, weisser Gutedel, früh, croquant, Krah-Gutedel, früh.  
**blanc musque**, weisser Gewürz-Gutedel de Fontainebleau, früh.  
**rouge**, rother, Gutedel, früh.  
**royale**, rother Königs-gutedel, roth vor der Reife, früh.

**Cornichon violet**, schwach.  
**Damas le gros**, spät.  
**Feigentraube**, köstlich **48 kr.**  
**Gelbe Seidentraube**, früh.  
**Grüne Seidentraube**, früh.  
**Grosse Fleischtraube**, sehr groß.  
**Isabella (aus Amerika)**, **pr. Stück 24 kr.**  
**Liverdon**, blau, volltragend, im Sept.  
**Maroc**, blauer, langbeerigster, später.  
**Morillon hatif**, früh.  
**Morillon panaché**.  
**Muscat blanc**, weisser Muscat, mittelfrüh.  
**d'Alexandrie**, größer später.  
**gris**, graurother, mittelfrüh.  
**Lunel**.  
**noir**, schwarzer, mittelfrüh.  
**rouge**, dunkelrother, mittelfrüh.  
**violet**, blauer, mittelfrüh.

**Muscat-Traube (Bronner)** früh, übertrifft an seinem Aroma alle übrigen Muscatellerforten, ganz neu **fl. 1. 30 kr.**

**Orangen-Traube**, früh, extra **48 kr.**  
**Orleans**, weiß, spät.  
**Petersilientraube**, weiß, früh.  
**Portugieser**, früh, schwarzblau, köstlich.  
**Précoce blanc de Kienzheim**, ganz früh, weiß.  
**Précoce de Malingre**, neu, weiß, sehr früh, in schwachen Exemplaren, **fl. 1. 30 kr.**  
**Raisin de Calabre**, neu, sehr groß, weiß, vorzüglich. **pr. Stück fl. 1.**  
**Rheingauer früher**, neu, vorzüglich, in schwachen Exemplaren. **pr. Stück fl. 1. 30 kr.**  
**Rosentraube**, schwach. **36 kr.**  
**Tokay de Hongrie**, schwach. **24 kr.**

**Tokay**, roth, spät.  
**Valltiner**.  
**Wildbacher**, blau, sehr fruchtbar.  
**Gutedel (Chasselas)** und **Krauttrauben** unter einander ohne Namen **pr. 12 Stück fl. 2.**  
**pr. 100 " fl. 15.**

In geringen Quantitäten abgeblüht:

**Albion**.  
**Auvernas blanc**.  
**Auvernas gris**.  
**noir**.  
**rouge clair**.  
**Blussard blanc**.  
**Coussi ou Querci noir**, früh, schwarzblau.  
**Früher Kilianer**.  
**Gentil noir**.  
**Gros Corinth**.  
**Gros Malaga**.  
**Gros perle blanche**.  
**Gros Rauschling**.  
**Grüner Sylvaner**.  
**Jouanen**.  
**Kischmischer**.  
**L'allemand rouge**.  
**Malvoisier blanche**.  
**rouge d'Italie**.  
**Ortliebscher**.  
**Petite Corinth**.  
**Perle rose**.  
**Riesling de Clairette**.  
**Rouge de Bourgogne**.  
**St. Laurent**, sehr früh, schwarzblau **24 kr.**  
**Teinturier**.  
**Verjus**.

### Wein-Sorten.

**Blaue Müller-Rebe**. **pr. Stück 6 kr.**  
**Elben**, weißer.  
**Elben**, schwarzer.  
**Früher schwarzer Burgunder**.  
**Gelbhölzler**.  
**Gewürztraminer**.  
**Hartheimisch**.  
**Klebois von Ingelheim**.  
**Malvoisier**, schwarzer.  
**Oestreicher**.  
**Orleans**, schwarzer.  
**Riesling**, weißer.  
**Rothsaftiger Färber**.  
**Ruländer**.  
**Sylvaner**.  
**Traminer**, schwarzer.  
**Trollinger**, kleiner.

## Verschiedene Obstarten.

**Äpfel Sibirische (Malus baccata)**, gut zum Einmachen. **pr. Stück fl. — 24 kr.**  
**Äpfelquitten**, halbst. — **24 "**  
**Biriquitten**, niederstämmig — **24 "**  
**hochstämmig** — **36 "**  
**gr. vortugiesische** — **24 "**

**Feigen**, zu Spalier. **fl. — 24 kr.**  
**Himbeeren**, grosse gelbe u. rothe — **6 "**  
**— Faststoff**, neue englische — **12 "**  
**— Massons Trauben** — **12 "**  
**— neue immertragende**  
**von Rivers** — **24 "**



Himbeeren, Merveille des 4 saisons.  
pr. Stück fl. — 24 kr.

— Queen Victoria, neu,  
engl. . . . . — 12 "

— Rothenbrg. Trauben- — — 12 "

Johannisbeeren, große, holländ.  
rothe, weiße u. fleischsch. — — 6 "

Groszeiller cerise, oder neue  
Kirschenjohannisb. 12 kr. bis 24 "

Fertile, neue vieltragende Johannisbeere fl. 1. —

Hative, neue frühreifende — fl. 1. —

schwarze Black naples pr. St. fl. — 12 "

schwarze mit grüner Frucht — — 12 "

Kastanien, gr., süße, hochf. — — 36 "

ditto grosse Maronen, b. — — 48 "

Kornelkirsche (*Cornus mas-*  
*cule*) . . . . . — 12 "

Mandel, süsse Damenman-  
del . . . . . — 48 "

süsse grossfrüchtige — — 48 "

Maulbeerbäume, schwarze,  
hochstämmige . . . fl. 1. 12 "

niederstämmige — — 48 "

klein, in Töpfen — — 36 "

Die schwarzen Maulbeerbäume wachsen bei dem  
Verpflanzen nur unter guter Pflege an; ein Zu-  
satz von Mistbeet-Erde und nachheriges Feucht-  
halten befördert die neue Bewurzelung.

Mispeln, Riesen-niederst. pr. Stück 24 kr.

Nussbäume, hochstämmig, — 24 "

Juglans fertilis (neue frühe. Waflung) nieder fl. 1.

Spiralringe (*Sorbus do-*  
*mestica*), hochst. pr. Stück fl. 1. 12 kr.

dieselbe niederst. — — 48 "

Stachelbeeren, große, engl. in 25 der besten Sorten  
pr. Stück 10 kr.

Grosse Hagebutten-Rosen — — 12 "

Grosse Haselnüsse . . . — 8 "

Behauen des Landes und endlich Verpflanzung auf  
anderes wohlbereitetes Land nach jedesmaligem  
Verlauf von 3 Jahren. Nur unter diesen Bedingun-  
gen können sämtliche ältere u. neue Sorten den  
Erwartungen vollkommen entsprechen.

Ananas pr. 100 Stück 30 kr.

Monat- oder immertra-  
gende . . pr. 100 Stück fl. 1. — "

Zimmet- . . . . . 30 "

Ferner in geringerer Quantität.

Ananas, buntblättrige . . pr. Stück 12 kr.

Bath . . . . . pr. 6 Stück 24 "

Blanche de Bieton . . . — 24 "

Dépford pine . . . . . — 24 "

Elton . . . . . — 24 "

Gefüllt blühende Monat- — — 24 "

Goliath . . . . . — 24 "

Grimstone . . . . . — 24 "

Keen's Seedling . . . . . — 24 "

Methven Castel . . . . . — 24 "

Princesse. Alice Maude . . — 24 "

Twaminston Seedling . . . — 24 "

Willmott's superb . . . . . — 24 "

late scarlet . . . . . — 24 "

Mammoth . . . . . — 24 "

Première de Bagnolet . . . — 36 "

Princesse. royale . . . . . — 24 "

Prolific, ausgezeichnet schön — — 24 "

Beehive, volltragend . . . . — 24 "

Aigburgh Seedling . . . . . — 24 "

Black prince . . . . . — 24 "

Myatts new fertilised Haut-  
bois . . . . . pr. Stück 6 "

Barnes large white . . . . . 6 "

Louise Marie . . . . . 6 "

Sans pareille . . . . . 6 "

St. Lambert . . . . . 6 "

Triomphe de Liège . . . . . 6 "

Atlète (Salter) . . . . . 12 "

Victoria (Trollop) . . . . . 12 "

## Erdbeeren.

Erdbeeren verlangen einen lockeren, reichen, gut  
gedüngten Boden, öfteres Begießen, wiederholtes

## Propfreiser.

Von den meisten oben verzeichneten Obstsorten können im Laufe  
des Monates Februar auch Propfreiser, je 1 bis 2 Reiser zu 6 kr. pr. Sorte,  
oder fl. 1. pr. 12 Sorten geliefert werden, jedoch bitten wir bei etwaigen  
Aufträgen die angegebene Zeit möglichst zu beobachten, da wir später  
durch den Zusammenfluss vieler Arbeiten nicht mehr die nöthige Auf-  
merksamkeit zu deren Effectuierung verwenden können.

## Spargelpflanzen.

Dreijährige Ulmer, (starke Wurzeln), Gegen

Anfang April lieferbar . . . . pr. 100 Stück fl. 2 24 kr.

— 1000 — „ 12 — „

Dreijährige Darmstädter . . . . — 100 — „ 1 50 „

— 1000 — „ 14 — „

**NB.** Die Ulmer Spargelpflanzen liefern sehr dicke, äusserst zarte, grüngefärbte Köpfe; die Darmstädter Sorte erreicht kaum die nämliche Stärke und Zartheit, bringt aber weisse Köpfe. Oft wird die Eine, oft die Andere vorgezogen. Uebrigens erreichen beide Sorten ihre höchste Vollkommenheit nur durch starke, etwa 1 bis 1½ Fuss dicke Düngerlage, öftere Düngung von Oben und möglichst nahrhafte, lockere Erde.

## Gehölz- und Bier-Sträucher.

Die mit \* bezeichneten halten nur unter Bedeckung oder in geschützten Lagen unseren Winter im Freien aus:

Jene mit **D** können dutzendweise,  
 — — **H** — — — — — hundertweise,  
 — — **h** — — — — — hochstämmig geliefert werden;  
 — — **t** sind in Töpfen cultivirt,  
 — — **sch** zeichnen sich durch schöne Blüthe besonders aus.  
 — — **hde** verlangen Haideerde oder ähnlichen Boden.

|   | fl. | kr. |   | fl. | kr. |
|---|-----|-----|---|-----|-----|
| <b>Acer, der Ahorn.</b>                                     |     |     | <b>Aesculus Hipp. heterophylla</b>                    | 2   | —   |
| coccineum, <b>sch</b> . . . . .                             | 24  | —   | <b>rubicunda</b> , die rothblühende Kasianse,         |     |     |
| dasycarpum ( <b>rubrum</b> ), <b>h</b> , <b>D</b> . . . . . | 20  | —   | prächtigt als Alleebaum, für Schatten-                |     |     |
| coriaceum <b>h</b> , <b>D</b> , ausgezeichnet . . . . .     | 30  | —   | plätze und ähnliche Zwecke, in jeder                  |     |     |
| hyrcanum . . . . .  | 24  | —   | Stärke vorrätzig und zwar, nieder-                    |     |     |
| laciniatum . . . . .  | 24  | —   | stämmig . . . von 24 kr. bis                          | —   | 36  |
| monspesulanum, <b>D</b> . . . . .                           | 24  | —   | hochstämmig von 36 kr. —                              | 1   | —   |
| Negundo, <b>h</b> , <b>D</b> . . . . .                      | 18  | —   | ditto pr. 100 Stück fl. 50 —                          | 80  | —   |
| ditto pr. 100 Stück fl. 20 bis                              | 30  | —   | <b>Aesculus rubicunda</b> fol. var. die               |     |     |
| ditto ditto kleinere . . . . .                              | 10  | —   | rothblüh., mit bunten Blätt. fl. 1. bis               | 2   | —   |
| laciniatum . . . . .  | —   | —   | <b>macrostachia (Pavia spicata)</b> ,                 |     |     |
| pensylvanicum, ( <b>tartaricum</b> ), <b>h</b> ,            |     |     | ein schöner niederer Strauch 24 kr. bis               | —   | 48  |
| <b>D</b> . . . . .  | 20  | —   | <b>Pavia lutea</b> , <b>h</b> , <b>D</b> . 30 kr. bis | —   | 48  |
| nigrum americanum, <b>h</b> . . . . .                       | 24  | —   | <b>rubra</b> , <b>h</b> , <b>D</b> . 30 kr. —         | —   | 48  |
| platanoides, <b>h</b> , <b>D</b> . . . 12 bis               | 24  | —   | <b>californica</b> , neu fl. 3 —                      | 10  | —   |
| pseudo platanum, <b>h</b> , <b>H</b> . 12 —                 | 24  | —   | <b>Akebia quinata</b> , fr. Schlingpflanze .          | 1   | 30  |
| dissectum . . . . .   | 1   | 12  | <b>Ailanthus, der Götterbaum.</b>                     |     |     |
| fol. var., <b>h</b> , <b>D</b> . . . 18 —                   | 24  | —   | <b>glandulosus</b> , <b>h</b> , <b>D</b> . 12 kr. bis | —   | 24  |
| atrosanguineum . . . . .                                    | 1   | —   | <b>Alnus, die Erle.</b>                               |     |     |
| rubrum fol. var. . . . .                                    | 24  | —   | <b>communis</b> , <b>H</b> . . . . .                  | —   | 6   |
| sacharinum . . . . .  | 20  | —   | <b>cordata</b> . . . . .                              | —   | 24  |
| striatum . . . . .  | 24  | —   | <b>laciniata</b> . . . . .                            | —   | 24  |
| <b>Adelia acuminata</b> , * . . . .                         | 24  | —   | <b>oxyacanthoides</b> . . . . .                       | —   | 24  |
| <b>Aesculus, die Rosskastanie.</b>                          |     |     | <b>quercifolia</b> . . . . .                          | —   | 24  |
| Hippocastanum, <b>h</b> . . . . .                           | 24  | —   | <b>Amorpha, der falsche Indigo.</b>                   |     |     |
| Hipp. fl. pleno . . . . .                                   | —   | —   | <b>canescens</b> . . . . .                            | —   | 12  |



|  | n.   kr. |   | n.   kr. |
|--|----------|---|----------|
| <b>Amorpha crocea lanata</b> . . . . .                 | 15       | <b>Unsere neuen gefülltblühenden</b>              |          |
| <b>emarginata</b> . . . . .                            | 12       | <b>Azalea pontica</b> , worunter                  |          |
| <b>fruticosa</b> . . . . .                             | 12       | namentlich A. p. Graf v. Meran,                   |          |
| <b>glabra, H</b> . . . . .                             | 12       | Chromatella und andere im                         |          |
| <b>Lewisii, D</b> . . . . .                            | 15       | letzten Frühjahrse Bewunderung                    |          |
| <b>Amigdalus, die Mandel.</b>                          |          | erregten, können erst im Herbst                   |          |
| <b>communis fl. pleno</b> , gefülltblühend             | 24       | 1854 ausgegeben werden.                           |          |
| <b>nana fl. albo</b> . . . . .                         | 36       | <b>nudiflora, calendulacea, coc-</b>              |          |
| <b>serata</b> , . . . . .                              | 24       | <b>cinea, cuprea, pontica etc.</b> in             |          |
| <b>glandulosa (Siebold)</b> . . . . .                  | 24       | vielen ausgewählten Farben 48 kr. bis             | 2 —      |
| <b>incana</b> , sehr schön . . . . .                   | 30       | <b>ditto pr. 12 Stück fl. 8.</b> bis              | 15 —     |
| <b>pumila, fl. pleno</b> , gefüllte Zwergm.            | 24       | <b>ditto " 100 " " 50.</b> " "                    | 80 —     |
| <b>ditto</b> in schönen Kronbäumchen . . . . .         | 48       |   |          |
| <b>pumila albo pleno (Prunus</b>                       |          | <b>Die Azaleen bedürfen guter Laub-Holz-</b>      |          |
| <b>sinensis)</b> nen, schwache Pflanzen . . . . .      | 5 —      | oder Wald-Erde, etwas feuchte, beschattete        |          |
| <b>persica fl. pleno</b> , gefüllte Pfirsche . . . . . | 30       | Lage und leichte Bedeckung, wenn über             |          |
| <b>albo pleno</b> . . . . .                            | 6 —      | 15° Reaumur Kälte eintritt. Bei solcher Vor-      |          |
| <b>coccineo pleno</b> . . . . .                        | 6 —      | sorge wird eine in ihrer Pracht noch weit         |          |
| <b>sibirica</b> . . . . .                              | 18       | zu wenig gekannte Flor erzielt.                   |          |
| <b>Ampelopsis Royleana</b> . . . . .                   | —        | <b>Berberis, die Berberitze, Sauereich.</b>       |          |
| <b>Andromeda augusta, hde</b> . . . . .                | 36       | <b>aristata</b> . . . . .                         | 24       |
| <b>polifolia et var., hde</b> . . . . .                | 24       | <b>canadensis</b> . . . . .                       | 24       |
| <b>racemosa, hde</b> . . . . .                         | 48       | <b>vulgaris, H</b> . . . . .                      | 6        |
| <b>Aralia, der Angelicabaum.</b>                       |          | <b>fol. atropurpurea</b> , mit                    |          |
| <b>japonica (Siebold)</b> 30 kr. bis                   | 1 —      | dunkelrothem Laub, äußerst auffal-                |          |
| <b>spinosa</b> . . . . . 24 " "                        | 36       | lend, sehr geeignet für Rasenplätze               |          |
| <b>edulis ?</b> nicht holzartig . . . . .              | 30       | <b>vulgaris glauca</b> . . . . .                  | 48       |
| Die Aralien eignen sich wegen deren                    |          | <b>fr. albo</b> . . . . .                         | 36       |
| grossen gefiederten Blättern für Rasen-                |          | <b>Knightsii *</b> . . . . .                      | 130      |
| plätze; sie lieben fette Mistbeeteerde.                |          | <b>nepalensis, *</b> . . . . .                    | 1 —      |
| <b>Arbutus, der Erdbeerbaum.</b>                       |          | <b>Lycium, *</b> . . . . .                        | 1 —      |
| <b>Unedo, *</b> . . . . . 30 kr. bis                   | 130      | <b>dealbata, *</b> . . . . .                      | 130      |
| <b>procera, *</b> . . . . .                            | 2 —      | <b>rotundifolia</b> . . . . .                     | 1 —      |
| <b>Aristolochia, Osterluzey, Heber-</b>                |          | <b>sp. North-India, *</b> . . . . .               | 130      |
| <b>blume, Pfeifenstrauch.</b>                          |          | <b>Mahonia aquifolium, D</b> . . . . .            | 24       |
| <b>Sipho, D</b> , rankend, trefflich zu Lauben,        |          | <b>fiart</b> . . . . . 24 kr. bis                 | 112      |
| Epaliere ic. . . . .                                   | 24       | <b>fascicularis, D</b> . . . . .                  | 24       |
| <b>Aucuba, japonica, *, t, hde</b> 24 kr. bis          | 1 —      | <b>fiart</b> . . . . . 24 kr. bis                 | 112      |
| <b>latimaculata, *, t, hde</b> 36kr. bis               | 130      | <b>latifolia</b> . . . . .                        | 1 —      |
| <b>Azalea, die Azalee für's freie Land.</b>            |          | <b>repens, D</b> . . . . .                        | 24       |
| <b>cal. Sterniana (R.)</b> großblumigt                 | 130      | <b>fiart</b> . . . . . 24 kr. bis                 | 112      |
| <b>Cristata (R.)</b> scharlach . . . . .               | 230      | <b>hybrida</b> . . . . .                          | 1 —      |
| <b>sanguinea (R.)</b> dunkelblutroth                   | 230      | <b>Fortunei, *</b> , fl. 1. bis                   | 230      |
| <b>astreans (R.)</b> orange-scharlach                  | 2 —      | <b>trifoliata, *</b> , fl. 1. 30 kr.              | 3 —      |
| <b>Meteor (R.) ditto</b> . . . . .                     | 2 —      | mehrere Sorten unter einander                     |          |
| <b>pulchella roseola (R.)</b>                          |          | <b>pr. 12 Stück</b>                               | 4 —      |
| <b>roja</b> . . . . .                                  | 2 —      | <b>pr. 100 Stück</b>                              | 25 —     |
| <b>p. albo pleno (R.)</b> gefüllt,                     |          |   |          |
| <b>weiß</b> . . . . .                                  | 130      | <b>Die Mahonien verdienen als ausgezeich-</b>     |          |
| <b>coccinea arbusta</b> , feurig scharf.               | 2 —      | neteste immergrüne, schönblühende und beer-       |          |
| <b>maxima</b> , prächtig feuerfarb                     | 130      | tragende Pflanzen allgemeine Verbreitung,         |          |
| <b>fulgens, ditto</b> . . . . .                        | 130      | um so mehr, da sie sich seit Jahren an un-        |          |
| <b>excelsa ditto</b> . . . . .                         | 130      | seren Winter gewöhnt haben und in schattig-       |          |
| <b>fenestra, rosa mit orange</b> . . . . .             | 112      | ten und sonnigten Lagen überall kräftiger         |          |
| <b>Saturnea, dunkelrosa</b> . . . . .                  | 130      | gedeihen, als meistens die Stechpalme. (Hlex.)    |          |
| <b>Mortieriana, rosa mit orange</b> . . . . .          | 112      | <b>Berchemia volubilis, *</b> , rankend . . . . . | 36       |
| <b>cuprea splendens, dunkelrosa</b>                    | 112      | <b>Betula, die Birke.</b>                         |          |
| <b>elegantissima, ditto</b> . . . . .                  | 112      | <b>alba, h, H</b> . . . . . 12 kr. bis            | 18       |
| Diese 16 Prachtsorten zu-                              |          | <b>laciniata</b> , sehr schön . . . . .           | 1 —      |
| sammen für . . . . .                                   | 24 —     | <b>pendula (heterophylla)</b> . . . . .           | 1 —      |
|  |          | <b>tristis</b> . . . . .                          | —        |
|  |          | <b>nigra</b> . . . . .                            | 24       |
|  |          | <b>fruticosa, t, zwergf.</b> . . . . .            | 30       |
|  |          | <b>pumila (nana) t zwergf.</b> . . . . .          | 30       |

**Bignonia, die Trompetenblume.**

|   |    |
|---|----|
| Catalpa, <b>H</b> , je nach Stärke 24 kr. bis | 48 |
| cerulea (?) Zweigform . . . . .               | 36 |
| Catalpa Bungei neu . . . . .                  | 2  |
| radicans, rankend, schön <b>D</b> . . . . .   | 12 |
| humilis, <b>t</b> , großblumig . . . . .      | 36 |
| flava, gelblichroth . . . . .                 | 36 |
| sanguinea . . . . .                           | 12 |
| capreolata, *, <b>t</b> . . . . . 24 kr. bis  | 36 |
| crucigera, *, <b>t</b> . . . . . 24           | 48 |
| grandiflora, *, <b>t</b> . . . . . 48 kr. bis | 12 |
| atrosanguinea . . . . .                       | 1  |
| purpurea . . . . .                            | 12 |

Die 5 letzteren werden bei dem Eintritt des Winters nur niedergelegt und mit Laub bedeckt; — eine geringe Mühe für so prachtvolle Blumen! —

**Billardiera purpurea** \*, hält unter Bedeckung recht gut aus 30 kr. bis

**Broussonetia**, Papier = Maulbeerbaum.

|   |        |
|---|--------|
| papyrifera . . . . .                          | 12 kr. |
| dissecta, neu mit geschlitz. Blät., fl. 1 bis | 2      |

**Buddleja Lindleyana** \* . . . . . 24

**Buxus, der Buchsbaum.**

|   |     |
|---|-----|
| arborescens, <b>H</b> , der hochwachsende . . . . . | 18  |
| stark . . . . . 24 kr. bis                          | 36  |
| latifolius . . . . .                                | 24  |
| fol. var. albis, buntblätt. . . . .                 | 18  |
| luteis, ditto . 18 kr. bis                          | 24  |
| chinensis longifolia . . . . .                      | 130 |
| rotundifolia . . . . .                              | —   |
| nana fol. var . . . . .                             | —   |
| rosmarinifolia . . . . .                            | —   |

**Callicarpa Murasacki** (fälschlich *Deutzia gracilis*) . . . . . 24

ditto . . . . . pr. 12 Stück

**Calophaca wolgarica.**

**Calycanthus, der Gewürzstrauch.**

|   |    |
|---|----|
| floridus, <b>D</b> , duftet am stärksten . . . . .  | 36 |
| fertilis . . . . .  | —  |
| laevigatus, <b>D</b> . . . . .  | 36 |
| macrophyllus, neu . . . . . fl. 1 bis   | 3  |
| praecox ( <i>Chimonanthus</i> ) blühet im Decemb. und Jan. bei gelind. Wetter, <b>D</b> . . . . . fl. 1 bis | 2  |
| grandiflorus . . . . . fl. 2 bis  | 3  |
| fl. albo . . . . .  | —  |

**Caragana, f. Robinia.**

**Carya, f. Juglans.**

**Catalpa, f. Bignonia.**

**Ceanothus, die Seckelblume.**

|  |     |
|--|-----|
| americanus, schönblühend 12 kr. bis        | 18  |
| Baumanianus . . . . .                      | —   |
| ovatus, blaublühend, *, <b>t</b> . . . . . | 24  |
| fl. pallido * <b>t</b> . . . . .           | 24  |
| cuneifolius, neu . . . . .                 | 130 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Ceanothus dentatus, neu . . . . . | 130 |
| integerrimus . . . . .            | 130 |
| rigidus, neu . . . . .            | 130 |
| papillosus . . . . .              | 130 |

**Celastrus, Bügelholz, Baum-Mörder.**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| scandens, rankender . . . . . | 20 |
|-------------------------------|----|

**Celtis, der Zürgelbaum.**

|                     |    |
|---------------------|----|
| australis . . . . . | 12 |
| cordata . . . . .   | 12 |

**Cephalanthus, die Kopfblume.**

|  |    |
|--|----|
| occidentalis, sch, kleine Pflanzen . . . . . | 12 |
|--|----|

**Cerasus ilicifolius, neu** . . . . . 3

**Cercis, der Judasbaum.**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| canadensis, sch, . . . . .         | 20 |
| japonica . . . . .                 | —  |
| siliquastrum, sehr schön . . . . . | 18 |

**Chimonanthus, f. Calycanthus.**

**Chionanthus, die Schneebume**

(verlangt feuchten Stand-Ort).

|   |     |
|---|-----|
| virginica, sch, <b>D</b> , <b>H</b> , Samenpflanzen . . . . .   | 30  |
| montana, sch, <b>D</b> ditto . . . . .  | 30  |
| longifolia, auf die vorhergehenden veredelt, sehr willig und schön blühend, für nicht zu trockene Lagen sehr zu empfehlen . . . . . | 112 |

**Clematis, die Walddrebe, rankend.**

|   |    |
|---|----|
| Viticella var., <b>D</b> . . . . .              | 12 |
| fl. pleno . . . . .                             | 1  |
| Lassianthus . . . . .                           | 24 |
| flamula . . . . .                               | 12 |
| grata . . . . .                                 | 12 |
| integrifolia . . . . .                          | 12 |
| azurea grandiflora *, prächtig . . . . .        | 1  |
| Sieboldi, ( <i>bicolor</i> ) *, ditto . . . . . | 1  |
| florida fl. pleno * . . . . .                   | 1  |

Die 3 Letzteren sind wirkliche Prachtblumen, welche unter mäßiger Bedeckung der strengsten Kälte widerstehen.

|                              |    |
|------------------------------|----|
| grandiflora . . . . .        | —  |
| macrophylla . . . . .        | —  |
| odoratissima . . . . .       | —  |
| tubulosa mongolica . . . . . | 24 |

**Clethra, alnifolia, verlangt halbe Erde**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| pubescens, ditto . . . . . | 24 |
|----------------------------|----|

**Colutea, der Blasenstrauch.**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| arborescens, <b>H</b> . . . . . | 6 |
|---------------------------------|---|

**Corechorus (Kerria), japonica, sch**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| fl. simplicis . . . . . | 8 |
|-------------------------|---|

**Coriaria, der Gerberstrauch.**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| nepalensis * <b>t</b> . . . . . | 24 |
| myrtifolia . . . . .            | 12 |

**Cornus, der Hartriegel.**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| alba, <b>H</b> . . . . .          | 6  |
| alternifolia . . . . .            | 12 |
| mascula (Kornelkirsche) . . . . . | 12 |
| paniculata . . . . .              | 8  |



|   | n. kr. |   | n. kr.     |
|---|--------|---|------------|
| <b>Cornus stricta</b> . . . . .               | 6      | Die <b>Crataegus</b> zeichnen sich durch          |            |
| fol. var. . . . .                             | 12     | Wachsthum, Blüthe und schöne Früchte              |            |
| verucosa . . . . .                            | 24     | aus, besonders schön sind der neue roth-          |            |
| <b>Coronilla</b> , der Peltischen.            |        | blühende und der rothgefüllt blühende, die        |            |
| Emerus, sch, <b>D</b> . . . . .               | 8      | wir jedem Garten empfehlen. Die Exemplare         |            |
| <b>Corylus</b> , die Haselnuß.                |        | lassen nichts zu wünschen übrig.                  |            |
| americana, . . . . .                          | 10     | <b>Cryptomeria</b> , unter den Na-                |            |
| avellana fr. maxima, <b>D</b> . . . . .       | 8      | delshölzern.                                      |            |
| fol. aureis, neu . . . . .                    | 48     | <b>Cupressus</b> , unter d. Nadelhölzern.         |            |
| atropurpurea, mit dunkelrothen Blättern       | 30     | <b>Cydonia</b> , die Quitte.                      |            |
| laciniata, mit geflügelten Blättern . . . . . | 30     | <b>vulgaris pyramidalis</b> , Birnquit, 6 kr. bis | 24         |
| californica . . . . .                         | —      | lusitanica, große portugiesische . . . . .        | 24         |
| <b>Cotoneaster (Mespilus)</b> , Quit-         |        | japonica ( <b>Pyrus</b> ), <b>D</b> , die ja-     |            |
| tenmispel.                                    |        | pantische, mit prächt. scharlach-                 |            |
| compta . . . . .                              | 48     | rothen Blüten; eine Zierde für                    |            |
| denticulata, * . . . .                        | 36     | jeden Garten . . . . .                            | 1          |
| marginata . . . . .                           | 30     | fl. albo . . . . .                                | 48         |
| mycophylla, * . . . .                         | 24     | fl. atrosanguinea, neu fl. 1 bis                  | 2          |
| thymifolia . . . . .                          | 36     | rosea . . . . .                                   | 1 12       |
| ovalifolia, * . . . .                         | 30     | <b>Cytisus</b> , d. Goldregen, Bohnenbaum.        |            |
| tomentosa . . . . .                           | 24     | alpinus odoratus, . . . . .                       | 18         |
| rotundifolia, * . . . .                       | 24     | fl. albido . . . . .                              | 24         |
| Royleana . . . . .                            | —      | capitatus . . . . .                               | 10         |
| vulgaris . . . . .                            | 18     | nigricans . . . . .                               | 10         |
| <b>Crataegus</b> , der Dorn.                  |        | elongatus (falsch vulgaricus) . . . . .           | 10         |
| coccinea . . . . .                            | 18     | ditto halbhochstämmig . . . . .                   | 36         |
| grandiflora . . . . .                         | 24     | sessilifolius . . . . .                           | 12         |
| Crus galli . . . . .                          | 24     | Laburnum, h, <b>H</b> . . . . .                   | 18         |
| Celsiana . . . . .                            | 24     | Adami h, <b>D</b> . . . . .                       | 24         |
| canadensis ( <b>Mespilus</b> ) . . . . .      | 24     | Parksi . . . . .                                  | —          |
| cretica ( <b>Pyrus</b> ) . . . . .            | 30     | pendulum, h . . . . .                             | 24         |
| cordata . . . . .                             | 24     | involutum h, <b>D</b> . . . . .                   | 24         |
| glandulosa . . . . .                          | 24     | purpureus, rothblühend . . . . .                  | 24         |
| Aria . . . . .                                | 24     | schöne Kronenbäumchen, 36 n "                     | 48         |
| glabra * (Photinia) . . . . .                 | 30     | fl. albo, weißbl. . . . .                         | 24         |
| pruinosa . . . . .                            | 24     | schöne Kronenbäumchen, äußerst zier-              |            |
| nivea . . . . .                               | 24     | lich. <b>D</b> . . . . .                          | 48 kr. bis |
| flava . . . . .                               | 24     | roseo, hellrothbl. <b>D</b> . . . . .             | 24         |
| crenata, * . . . .                            | 36     | Kronenbäumchen . . . . .                          | 48         |
| elliptica . . . . .                           | 24     | Sämmtliche <b>Cytisus purpureus</b> eignen sich   |            |
| tomentosa . . . . .                           | 30     | auch vortreflich für die Blumen-Treiberei.        |            |
| Douglasii . . . . .                           | 36     | <b>Daphne</b> , der Seidelbast.                   |            |
| odorata . . . . .                             | 24     | Blagayana . . . . .                               | —          |
| odoratissima . . . . .                        | 24     | Cneorum . . . . .                                 | 24         |
| lucida . . . . .                              | 24     | maximum *, t . . . . .                            | 1 12       |
| nepalensis, * . . . .                         | 36     | Laureola, t . . . . .                             | —          |
| pentagynca . . . . .                          | 24     | Mezerium . . . . .                                | 6          |
| nigra . . . . .                               | 24     | <b>Deutzia scabra</b> , sehr schön 12 kr. bis     | 24         |
| tanacetifolia . . . . .                       | 24     | gracilis, neu, ist wegen entschieden              |            |
| orientalis . . . . .                          | 24     | blumistischem Werthe vielfach ge-                 |            |
| macrocarantha . . . . .                       | 30     | freut worden . . . . .                            | 24 kr. bis |
| oxyacantha, Weipöter . . . . .                | 6      | Godohokeri . . . . .                              | 1          |
| albo pleno, ditto gefüllt . . . . .           | 24     | sanguinea . . . . .                               | 30         |
| hochstämmig . . . . .                         | 36     | crenata . . . . .                                 | 24         |
| rubra, rothblühend . . . . .                  | 24     | <b>Edgeworthia chrysantha</b> *                   | —          |
| ruberrima, gr. dunkelrothblühender            | 30     | <b>Eleagnus</b> , Oleaster, wilder Delfbaum.      |            |
| hochstämmig . . . . .                         | 48     | angustifolius, <b>D</b> , wohlriechend . . . . .  | 24         |
| rubra plena, roth gefüllt blü-                | —      | macrophyllus, mit Silberblättern . . . . .        | 24         |
| hender . . . . .                              | 48     | arborescens ( <b>orientalis</b> ) . . . . .       | 24         |
| hochstämmig . . . . .                         | 1 12   | fusca . . . . .                                   | 24         |
|   |        | reflexa *, t . . . . .                            | 24 kr. bis |

|  | fl. kr.       |  | fl. kr.       |
|--|---------------|--|---------------|
| <b>Epigaea repens</b> , hde. *                       |               | <b>Genista</b> , die Ginster.  |               |
| <b>Erica</b> , die Heide, verlangt Waldb-<br>Erde.   |               | anglica . . . . .  | 18            |
| ciliaris, *, t . . . . .                             | 24            | Barclayana, * . . . .  | 24 kr. bis 48 |
| cinerea, *, t . . . . .                              | 24            | florida . . . . .  | 18            |
| Dabœcia, *, t . . . . .                              | 24            | floribunda, *, t . . . . .   | 24            |
| alba, *, t . . . . .                                 | 36            | pubescens, t . . . . .   | 24            |
| hibernica, *, t, . . . . .                           | 24 kr. bis 48 | spartioides, vorzüglich schön und dauerhaft  | 30            |
| herbacea, t . . . . .                                | 24            | ditto schöne halbhäutige Kronbäum-<br>chen, sehr empfehlenswerth . . . . .   | 48            |
| Mackayana, *, t . . . . .                            | 24            | scoparia, fl. albida . . . . .   | 24            |
| tetralix . . . . .                                   | 24            | scoparia fol. var. . . . .   | 24            |
| vagans pallida, *, t . . . . .                       | 36            | tinctoria, fl. pleno . . . . .   | 24            |
| vulgaris, fl. pleno, t, . . . . .                    | 24            | <b>Ginkgo</b> , Ginkgobaum.  |               |
| <b>Ephedra</b> , monostachia . . . . .               | 24            | biloba ( <i>Salisburia</i> ), sehr merkwürdig<br>in Wuchs und Blatt, Samenpflanzen   |               |
| <b>Eurybia ilicifolia</b> , * fl. 1.30 kr. bis 3     | —             | fl. 1 bis 2  | 30            |
| <b>Evonymus</b> , Spindelbaum, Pfaf-<br>fentäppchen. |               | <b>Gleditschia triacantha</b> , h, D 24 kr. bis  | 36            |
| latifolius . . . . .                                 | 15            | inermis, h, D . . . . .  | 24 " "        |
| Hamiltonianus, * . . . . .                           | 24            | caspica, h, D . . . . .  | 24 " "        |
| europæus . . . . .                                   | 6             | macroantha . . . . .   | 1             |
| repens, *, t . . . . .                               | 24            | <b>Glycine</b> .   |               |
| linifolius, *, t . . . . .                           | 24            | chinensis ( <i>Vistaria</i> ), blaublühende<br>windende Kletterpflanze, Kultur und aus-<br>dauernd wie der Weinstock. 24 kr. bis | 2             |
| ditto auf Hochstämmchen . . . . .                    | 36            | ditto . . . . . pr. 12 Stück   | 4             |
| japonicus, f. var. albis, * 20 kr. bis               | 1             | ditto . . . . . pr. 100 " "  | 25            |
| luteis, *, t 24 " "                                  | 1 12          | fl. albo, dieselbe weißblühend, ganz neu,<br>starke Pflanzen . . . . .   | 12            |
| <b>Fagus</b> , die Buche.                            |               | <b>Gymnogladius</b> ( <i>Guilandina</i> ).   |               |
| Castanea, Züstaßante, h . . . . .                    | 36            | canadensis, h, D . . . . .   | 24 kr. bis 36 |
| Cunninghami * . . . . .                              | —             | <b>Halesia</b> .   |               |
| sylvatica asplenifolia . . . . .                     | 48            | tetraltera, sehr schönblühender Strauch,<br>der oft in reinem Sande, sicher aber in<br>Heide-Erde gedeiht . . . . .              | 36            |
| atropurpurea, D . . . . .                            | 48            | <b>Halimodendron</b> , der Salzstrauch.  |               |
| fol. var. . . . .                                    | —             | argenteum ( <i>Robinia haloden-</i><br><i>dron</i> ), einer der vorzüglichsten schön-<br>blühenden Gehsträucher . . . . .        | 48            |
| pendula, Trauerbuche 48 kr. bis                      | 1 12          | <b>Hedera</b> , Ephen.   |               |
| cristata . . . . .                                   | 48            | Helix, Wald-Ephen . . . . .  | 6             |
| <b>Forsythia viridissima</b> , neu aus China,        | 24            | fol. var., buntblättrig . . . . .  | 24            |
| <b>Fraxinus</b> , die Esche.                         |               | algeriensis . . . . .  | 24            |
| americana, h, D . . . . .                            | 24            | arbuscula . . . . .  | 1             |
| californica . . . . .                                | —             | digitata nova . . . . .  | 24            |
| excelsior, h, D . . . . .                            | 18            | leucocarpa, mit weißen Beeren . . . . .  | 24            |
| aurea, mit gelbem Holz . . . . .                     | 24            | chrysocarpa, mit gelben Beeren . . . . .   | 24            |
| crispa, mit krausen Blätt. . . . .                   | 24            | taurica, halbbuntbl. 24 kr. bis  | 1             |
| heterophylla, . . . . .                              | 48            | latifolia, breitblätt. engl. Ephen,<br>sehr schnell wachsend, für Zimmer<br>geeignet . . . . . 12 kr. bis                        | 24            |
| nana, Zwergf. . . . .                                | 48            | ditto pr. 12 Stück fl. 2. bis  | 4             |
| pendula, Traueresche, h, 48 kr. bis                  | 1 12          | ditto pr. 100 Stück fl. 15. bis  | 20            |
| horizontalis . . . . .                               | 24            | latifl. fol. var., neue engl.<br>buntbl. . . . .   | 1 30          |
| integrifolia . . . . .                               | 24            | <b>Roegneriana</b> , *, gr. herzblätt.<br>neuer Ephen vom Kaukasus 24 kr. bis  | 1 30          |
| microphylla . . . . .                                | 24            | quinquefolia ( <i>Ampelopsis hede-</i><br><i>racea</i> , Jungfernwcin) . . . . .   | 6             |
| myrtifolia . . . . .                                 | 36            | ditto . . . . . pr. 100 Stück  | 7             |
| Ornus, Manna-Esche . . . . .                         | 24            | fol. var., *, buntblätt. . . . .   | 20            |
| floribunda . . . . .                                 | 30            |  |               |
| latifolia, schönblühend . . . . .                    | 48            |  |               |
| lentiscifolia pendula 24 kr. bis                     | 48            |  |               |
| oxyacanthifolia . . . . .                            | 48            |  |               |
| oxicarpa . . . . .                                   | 30            |  |               |
| rotundifolia . . . . .                               | 30            |  |               |
| rufa . . . . .                                       | 36            |  |               |
| verucosa . . . . .                                   | 30            |  |               |
| Theophrasti . . . . .                                | 36            |  |               |
| quadrangularis . . . . .                             | 36            |  |               |
| <b>Gaultheria leucocarpa</b> , hde. *                | 2             |  |               |



|   | fl.  | kr. |   | fl. | kr.  |
|---|------|-----|---|-----|------|
| <b>Hibiscus</b> , Syrische Rose, Blumen-<br>baum. |      |     | <b>Ilex</b> <i>crassifolia</i> , * merkwürdig . . . . .   |     | 2 —  |
| <i>syriacus</i> . . . . .                         | 10   |     | <i>cordata</i> * . . . . . fl. 1. bis                     |     | 1 30 |
| fl. albo . . . . .                                | 12   |     | fol. var. * . . . .                                       |     | 1 30 |
| fl. albo pl. <i>præcox</i> . . . . .              | 24   |     | <i>cornuta</i> , * . . . .                                |     | 7 —  |
| <i>pulchello marmorato</i> . . . . .              | 24   |     | <i>caroliniana</i> , schön . . . 36 kr. bis               |     | 1 30 |
| <i>striato pleno</i> . . . . .                    | 36   |     | <i>Cuninghami</i> . . . . .                               |     | 1 —  |
| <i>syriac. speciosus</i> 30 kr. bis               | 48   |     | <i>dipyrena</i> * . . . . .                               |     | 1 30 |
| <i>rubro pleno</i> . . . . .                      | 24   |     | <i>furcata</i> , . . . . .                                |     | 7 —  |
| <i>violaceo pleno</i> . . . . .                   | 24   |     | <i>latifolia</i> * ( <i>Siebold</i> ), sehr großblätt.    |     |      |
| <i>cæruleo semipl.</i> . . . . .                  | 24   |     | von Japan . . . . . fl. 1. bis                            |     | 3 —  |
| <i>purpureo pl.</i> . . . . .                     | 24   |     | <i>latispina</i> . . . . .                                |     | 2 —  |
| <i>striato superbo pl.</i> . . . . .              | 36   |     | <i>microcarpa</i> . . . . .                               |     | 3 —  |
| <i>cæruleo compacto pl.</i> . . . . .             | 36   |     | <i>nobilis</i> . . . . .                                  |     | 1 12 |
| <b>Hippophaë</b> , Sanddorn.                      |      |     | <i>excorticata</i> . . . . .                              |     | 1 12 |
| <i>canadensis</i> . . . . .                       | —    |     | <i>ovata</i> . . . . .                                    |     | 1 30 |
| <i>rhamnoides</i> . . . . .                       | 10   |     | <i>opaca</i> , sehr ausdauernd . . . 1. "                 |     | 1 30 |
| <b>Hydrangea</b> <i>altissima</i> , * . . . .     | 24   |     | <i>pendula</i> . . . . .                                  |     | 2 —  |
| <i>cordata</i> , schön . . . 18 kr. bis           | 24   |     | <i>Perado</i> , * beh. stark. Ected. fl. 1. bis           |     | 2 —  |
| <i>hortensis</i> (die <i>Dortensia</i> ), *, D .  | 48   |     | <i>Tarayo</i> * . . . . . fl. 1. bis                      |     | 3 —  |
| 24 kr. bis  | 1 30 |     | <i>Thunbergiana</i> . . . . .                             |     | 1 30 |
| <i>involuta</i> * . . . . .                       | 48   |     | <i>vomitaria</i> * . . . . .                              |     | 1 30 |
| <i>japonica</i> ( <i>Siebold</i> ), * 24 kr. bis  | 48   |     | 12 Stück in 12 Sorten fl. 8 bis                           |     | 12 — |
| <i>japonica fol. var</i> . . . . .                | 1 —  |     | 100 " " " " " 50 " 80 —                                   |     |      |
| <i>nivea</i> ( <i>glauca</i> ) . . . . .          | 24   |     |   |     |      |
| <i>pubescens</i> , neu . . . 48 kr. bis           | 1 30 |     |   |     |      |
| <i>quercifolia</i> , *, ausgezeichnet 24 " "      | 48   |     |   |     |      |
| <b>Hypericum</b> , Hartheu, Johanniskraut.        |      |     |   |     |      |
| <i>calycinum</i> * . . . . . 6 kr. bis            | 12   |     |   |     |      |
| <i>japonicum</i> *, klein, zärtlich . . .         | 36   |     |   |     |      |
| <i>kalnianum</i> . . . . .                        | 24   |     |   |     |      |
| <b>Jasminum</b> , ächter Jasmin.                  |      |     |   |     |      |
| <i>fruticans</i> D . . . . .                      | 6    |     | <b>Indigofera</b> <i>Dosua</i> , * . . . .                |     | 24   |
| <i>officinale</i> , *, D, der Italienische, ran-  |      |     | <b>Juglans</b> , der Walnußbaum.                          |     |      |
| kende, starkduftend, verlangt nur leichte         |      |     | <i>americana</i> , h, D, amerikanischer . . .             |     | 24   |
| Laubbede . . . . . 18 kr. bis                     | 24   |     | <i>alba</i> , weißer amerikan. . . . .                    |     | 30   |
| <i>triumphans</i> , *, D . . . 18 kr. bis         | 24   |     | <i>cineria</i> , von Amerika . . . . .                    |     | 30   |
| <b>Ilex</b> , Hülse, Stechpalme.                  |      |     | <i>nigra</i> , ditto . . . . .                            |     | 30   |
| <i>Aquifolium</i> , t, D . . . 20 kr. bis         | 48   |     | <i>sulcata</i> , ditto . . . . .                          |     | 30   |
| <i>arborescens</i> , hochwachsend, .              |      |     | <i>regia</i> , h, H, Europäischer . . . . .               |     | 30   |
| sehr zu empfehlen . . . 48 kr. bis                | 1 12 |     | <i>fertilis</i> , ditto, früh tragbar . . .               |     | 1 —  |
| <i>var. luteis</i> gelbbunt 48 " "                | 1 12 |     | <i>laciniata</i> , geflügelblättrig . . .                 |     | 2 30 |
| <i>marg.</i> ditto gerändert . . . . .            |      |     | <i>fraxinifolia</i> ( <i>Pterocarya cauca-</i>            |     |      |
| 48 kr. bis  | 1 12 |     | <i>sica</i> ), in schöner Strauchform vom Kau-            |     |      |
| <i>albis</i> , weißbunt . . . 48 kr. bis          | 1 12 |     | kasus, wird nur 15 bis 20 Fuß hoch                        |     |      |
| <i>viridis</i> , grün gelbbl. 48 " "              | 1 12 |     | und eignet sich wegen herrlicher Blau-                    |     |      |
| <i>ferox</i> , stark beschelt. 48 " "             | 1 12 |     | bung einzeln auf Rasenplätze . . .                        |     | 48   |
| <i>var. albis</i> , ditto, weißbunt . . .         |      |     | <b>Juniperus</b> , Wachholder, bei den                    |     |      |
| 48 kr. bis  | 1 12 |     | Nadelhölzern verzeichnet.                                 |     |      |
| <i>var. luteis</i> , ditto, gelbbunt . . .        |      |     | <b>Kalmia</b> <i>angustifolia</i> , Beide-Gras 24 kr. bis |     | 36   |
| 48 kr. bis  | 1 12 |     | <i>glauca</i> , sehr schön . . . 36 kr. bis               |     | 1 —  |
| <i>lanceolatum</i> ( <i>myrtifolium</i> ) . . .   |      |     | <i>glauca superba</i> . . . . .                           |     | 1 —  |
| kleinblättrig . . . 48 kr. bis                    | 1 12 |     | <i>latifolia</i> . . . . . fl. 1. bis                     |     | 2 —  |
| <i>laurifolium</i> var. . . 48 kr. bis            | 1 12 |     | <i>lucida</i> . . . . .                                   |     | 1 —  |
| <i>calamistra</i> . . . . . fl. 1. bis            | 2 —  |     | <i>pumila rubra</i> . . . . .                             |     | 1 —  |
| <i>fol. var.</i> . . . . . fl. 1. bis             | 2 —  |     | <b>Kerria</b> , f. <i>Corchorus</i> .                     |     |      |
| <i>cassine</i> * . . . . .                        | —    |     | <b>Röhlreuteria</b> , <i>paniculata</i> , h, schön        |     | 24   |
| <i>castaneifolia</i> , * . . . fl. 1. bis         | 1 30 |     |   |     |      |

|   | fl. kr. |  | fl. kr. |
|---|---------|--|---------|
| <b>Laurus, der Lorbeer.</b>               |         | <b>Magnolia precia (Yulan, conspicua),</b>       |         |
| Benzoïn . . . . .                         |         | fl. 2. bis                                       | 5 —     |
| nobilis, *, t, verlangt starke Laubdecke  | 1 30    | precia grandis aus unserer Sa-                   |         |
| 24 kr. bis                                | — 36    | menucht, die Blumen sind rein weiß               |         |
| sassafras, zweijährig                     | — 24    | mit schwacher rother Zeichnung, und              |         |
| <b>Ledum palustre</b> . . . . .           |         | erreichen fast die Größe jener der               |         |
| <b>Ligustrum, Rainweide.</b>              |         | M. grandiflora fl. 10. bis                       | 18 —    |
| japonicum *                               | — 24    | precia cyathiflora (R.1853)                      |         |
| nepalense, *, ( <i>Borrrya lig.</i> )     | — 24    | groß, breitpetaligt, hellcarmoisin, mit          |         |
| ovalifolium *                             | — 36    | weißem Rande; Wuchserblume . .                   | 18 —    |
| vulgare . . . . .                         | 6       | purpurea, *, D . . . 48 kr. bis                  | 3 —     |
| fr. albo . . . . .                        | — 12    | purpurea reflorescens, aus                       |         |
| fol. var                                  | — 24    | unserer Samenzucht, mit sehr großen              |         |
| <b>Liquidambar, der Amberbaum.</b>        |         | dunkelcarmoisinen Blumen fl. 4. bis              | 6 —     |
| Styraciflua . . . . .                     | — 36    | purpurea excelsa (R.), groß,                     |         |
| <b>Liriodendron, der Tulpenbaum.</b>      |         | dunkelcarmoisin . . fl. 4 bis                    | 6 —     |
| Tulipifera h. D, schöne Hochstämme        | — 48    | purpurea nigricans (R.),                         |         |
| integrifolia . . . . .                    | 1 12    | niedrig, dunkelcarmoisin fl. 3 bis               | 5 —     |
| rubra? . . . . .                          | —       | speciosa . . . . . fl. 2 bis                     | 3 —     |
| <b>Lonicera, die Heckenrösche.</b>        |         | triumphans . . . . .                             | —       |
| cœrulea . . . . .                         | — 18    | Soulangiana . . . . .                            | —       |
| fragrantissima, *, neu aus                |         | striatiflora . . . . .                           | —       |
| China, immergrün, soll den Winter         |         | pyramidalis . . . . fl. 2 bis                    | 3 —     |
| hindurch blähen, wohlriechend . .         | 3 —     | tripetala, D . . . . 48 kr. bis                  | 3 —     |
| Ledebouri . . . . .                       | — 18    | Fast allgemein hält man die Magnolien            |         |
| tartarica, dunkelroth . . . . .           | — 12    | für zu zart für unsern Winter; diese An-         |         |
| sibirica, hellroth . . . . .              | 8       | sicht ist jedoch völlig grundlos. Von den        |         |
| Symphoricarpos . . . . .                  | 6       | oben bezeichneten halten die meisten Sor-        |         |
| fol. var. . . . .                         | — 12    | ten 24° Kälte Re. ohne Bedeckung aus. Nur        |         |
| Roylei *, neu . . . . .                   | — 24    | die grandiflora kann starker Laubdecke nicht     |         |
| caprifolium (Weißblatt) . . . . .         | 8       | entbehren. M. purpurea und einige davon          |         |
| coccineum, ditto, hochroth . .            | — 24    | gewonnene Bastarden, wie Soulangiana lei-        |         |
| Fraserii, hochroth . . . . .              | — 30    | den erst bei 20° Kälte in den Knospen die        |         |
| Brownii ditto . . . . .                   | — 30    | übrigen gar nicht. Sind die Pflanzen in den      |         |
| flavum grandiflorum, gelb . .             | — 24    | zwei ersten Jahren stets feucht erhal-           |         |
| fl. novum, gelb . . . . .                 | — 24    | ten worden, so wachsen sie ohne wei-             |         |
| Douglasii, großbl., graugrün .            | — 36    | tere Pflege rasch vorwärts und zeigen bald       |         |
| semperf. superbum . . . . .               | — 24    | jene grosse Blüthen in Masse, welche hier        |         |
| Goldii, gelb . . . . .                    | — 18    | alljährlich allgemeine Bewunderung erregen.      |         |
| macrophyllum, neu, groß . .               | — 48    | <b>Mahonia f. Berberis.</b>                      |         |
| Magnevillea . . . . .                     | — 48    | <b>Menziesia globosa, hde.</b> . . .             | — 36    |
| occidentale . . . . .                     | — 48    | <b>Mespilus, die Mispel.</b>                     |         |
| sempervirens hybrid. . . . .              | — 24    | Amelanchier ( <i>Pyrus</i> ), . . . .            | — 6     |
| sinense *                                 | — 24    | affinis . . . . .                                | — 24    |
| splendida * neu, prächtig fl. 1 bis       | 2 —     | ovalis . . . . .                                 | — 24    |
| <b>Lycium, Buchsbaum.</b>                 |         | florida . . . . .                                | — 24    |
| europæum . . . . .                        | — 4     | canadensis . . . . .                             | — 24    |
| <b>Maclura, die Osage-Orange.</b>         |         | arbutifolius . . . . .                           | — 30    |
| aurantiaca . . . . . 36 kr. bis           | 1 30    | Chamaemespilus . . . . .                         | — 24    |
| <b>Magnolia, acuminata,</b> . . . .       | 1 30    | Cotoneaster . . . . .                            | — 18    |
| auriculata . . . . .                      | 2 30    | pyracantha, Feuerdorn . 18 kr. bis               | — 24    |
| cordata . . . . .                         | —       | nova . . . . .                                   | — 36    |
| glauca, D . . . . . 36 kr. bis            | 1 30    | <b>Morus, der Maulbeerbaum.</b>                  |         |
| gracilis, ( <i>Kobus</i> ), D . fl. 1 bis | 3 —     | alba, weißer . . . . .                           | — 12    |
| gigantea . . . . . fl. 2. 30 bis          | 3 30    | Kaempferi . . . . .                              | —       |
| grandiflora, *, . . . . 30 kr. bis        | 2 —     | nigra, schwarzer . . . 48 kr. bis                | 1 12    |
| macrophylla, prächtvoll fl. 3 bis         | 5 —     | pensilvanica . . . . .                           | —       |
| Norbertiana ditto . . . . fl. 2 bis       | 5 —     | papyrifera ( <i>Broussonetia</i> )               | — 18    |
|   |         | dissecta . . . . . fl. 1 bis                     | 2 —     |
|   |         | <b>Neillia thyrsiflora, *</b> ganz neu fl. 1 bis | 2 30    |
|   |         | <b>Ononis, Haushechel.</b>                       |         |
|   |         | fruticosa . . . . .                              | — 12    |



|   | fl. kr. |   | fl. kr. |
|---|---------|---|---------|
| <b>Paeonia</b> , Pfingstrose, Bauernrose.       |         | <b>Phillyrea</b> , Steinlinde, immergrün.         |         |
| <i>arborea</i> ( <i>Moutan</i> ) fl. 1 30 bis   | 4       | <i>angustifolia</i> , * . . . .                   | — 24    |
| <i>atropurpurea</i> ( <i>Fortune</i> )          | 4       | <i>latifolia</i> , * . . . .                      | — 24    |
| <i>papaveracea</i> . fl. 1 30 bis               | 2       | <b>Pinus</b> , Kiefern, Föhren, Tannen            |         |
| <i>rosa gallica</i> . . . . .                   | 2 30    | und Fichten, bei den Nadel-                       |         |
| <i>rubra odorata</i> . . . . .                  | 3       | hölzern.  |         |
| <i>Leodiense</i> fl. 1. 30 kr. bis              | 3       | <b>Platanus</b> , die Platane.                    |         |
| <i>albicans pleno</i> fl. 1. 30 kr. bis         | 5       | <i>occidentalis</i> , h, II . 24 kr. bis          | — 48    |
| <i>Carl V.</i> ( <i>Schmeltz</i> ) fl. 3 bis    | 8       | <i>ditto</i> pr. 100, hochst. fl. 40. bis         | 60 —    |
| <i>Deutsche Flagge</i> ( <i>Siebold</i> )       | 2       | <i>umbra culifera</i> . . . . .                   | 1 —     |
| <i>Kenny</i> ( <i>Casoretti</i> ) . . . . .     | 5       | Die übrigen Sorten haben wir ihrer weit ge-       |         |
| <i>phoeniceo pleno</i> . fl. 3 bis              | 2       | ringeren Eigenschaften wegen eingehen lassen.     |         |
| <i>pomponia pleno</i> . . . . .                 | 2       | <b>Podocarpus</b> , bei den Nadelhölzern.         |         |
| <i>regia</i> . . . . .                          | 8       | <b>Populus</b> , die Pappel.                      |         |
| <i>rosea superba</i> , prachtvoll fl. 2 bis     | 10      | <i>alba</i> , Zitterpappel, h . 12 kr. bis        | — 24    |
| <i>Elisabethae</i> ( <i>Casoretti</i> ) . . .   | 5       | <i>argentea vera</i> . . . . .                    | —       |
| <i>trionphe de Malines</i> . . . . .            | 4       | <i>balsamifera</i> , Balsampappel h 18 kr. bis    | — 24    |
| <i>de Van der Molen</i> . . . . .               | 2 30    | <i>betulaefolia</i> . . . . .                     | — 24    |
| <i>Fürstin Metternich</i> . . . . .             | 2 30    | <i>canadensis</i> , h . . . 18 kr. bis            | — 24    |
| — <i>Schwarzenberg</i> . . . . .                | 2 30    | <i>grandidentata</i> , h . . . 18 " "             | — 24    |
| — <i>Lichtenstein</i> . . . . .                 | 6       | <i>Hudsonia</i> . . . . .                         | — 24    |
| <i>Kaiser Leopold</i> . . . . .                 | 8       | <i>italica</i> , h, II . . . . 12 kr. bis         | — 24    |
| <i>Albrecht Dürer</i> . fl. 4. bis              | 7       | <i>laurifolia</i> . . . . .                       | — 24    |
| <i>Rococco</i> . . . . . fl. 2. bis             | 7       | <i>pendula</i> . . . . .                          | —       |
| <i>Rinzii</i> ( <i>Casoretti</i> ) . . . . .    | 8       | <i>suaveolens</i> . . . . .                       | — 24    |
| <i>Van Houttei</i> ( <i>Casoretti</i> ) . . .   | 2 30    | <b>Potentilla</b> , Fünffingerkraut.              |         |
| <i>Victoria</i> . . . . .                       |         | <i>fruticosa</i> . . . . .                        | — 12    |
| Unsere Paeonen dürfen wir auf das ein-          |         | <i>davurica</i> , wird nur 1 Fuß hoch sehr        |         |
| stimliche Urtheil der sehr zahlreichen Besucher |         | niedlich . . . . .                                | — 24    |
| und Kenner als durchaus vorzüglich empfehlen.   |         | <i>parvifolia</i> . . . . .                       | —       |
| <b>Paliurus</b> , Christusdorn.                 |         | <b>Prunus</b> , die Pflaume.                      |         |
| <i>aculeatus</i> ( <i>Rhamnus</i> ), *, t . .   | — 24    | <i>chicasa</i> ( <i>insiticia</i> ) . . . . .     | — 24    |
| <b>Paulownia imperialis</b> , D h, 30 kr. bis   | 1       | <i>spinosa</i> , fl. pleno, sehr zierlich .       | — 24    |
| Dieser herrliche japanische Zierbaum hat        |         | <b>Cerasus</b> , die Kirsche.                     |         |
| mehrere Winter unbedeckt überstanden            |         | <i>avium</i> , fl. pleno, gefüllte Kirsche        | — 30    |
| und in deutschen Gärten geblühet.               |         | fl. pleno, ditto . . . . .                        | — 24    |
| <b>Pavia californica</b> , neu fl. 3 bis        | 10      | <i>pygmaea</i> ( <i>Maryland</i> ) . . .          | — 30    |
| <b>Periploca graeca</b> , Schlinge, eine schön- |         | <i>Laurocerasus</i> , *, Kirschlorbeer . .        | — 24    |
| blühende kräftige Schlingpflanze . . .          | — 12    | <i>angustifolius</i> . . . . .                    | — 24    |
| <b>Philadelphus</b> , Pfeiffenstrauch, un-      |         | <i>colchicum</i> . . . . .                        | — 30    |
| ächter Jasmin.                                  |         | <i>ilicifolius</i> , * neu . . . . .              | 3 —     |
| <i>californicus</i> , neu . . . . .             | 1 30    | <i>lusitanica</i> , *, immergr. 24 kr. bis        | — 36    |
| <i>coronarius</i> , gewöhnl. II . . . . .       | 8       | <i>Mahaleb</i> , Weichsel . . . 6 kr. bis         | — 12    |
| fl. pleno, D . . . . .                          | 18      | <i>Padus</i> , II . . . . .                       | — 8     |
| <i>chinensis</i> , großblühend . . . . .        | 24      | var. . . . .                                      | — 12    |
| <i>Gordonianus</i> , ditto . . . . .            | 18      | <i>persicifolia</i> . . . . .                     | — 24    |
| <i>gracilis</i> . . . . .                       | 18      | <i>pumila</i> ( <i>glauca</i> ) . . . . .         | — 24    |
| <i>grandiflorus</i> . . . . .                   | 18      | <i>virginiana</i> . . . . .                       | — 20    |
| <i>inodorus</i> . . . . .                       | 18      | <b>Ptelea</b> , Lederbaum, Geldbaum.              |         |
| <i>laxus</i> . . . . .                          | 18      | <i>trifoliata</i> . . . . .                       | — 8     |
| <i>mexicanus</i> *, sehr zart 30 kr. bis        | 1       | <b>Pterocarya</b> , caucasica, strauchartige      |         |
| <i>nivalis</i> . . . . .                        | 24      | Wallstrauch vom Kaukasus . . . .                  | — 48    |
| <i>latifolius</i> . . . . .                     | 30      | <b>Pyrus</b> , Apfel, Birne, Quitte.              |         |
| <i>speciosus</i> , besond. großblüh. . . .      | 30      | <i>communis</i> fol. var. . . . .                 | — 24    |
| <i>thyrsiflorus</i> . . . . .                   | 24      | <i>Malus baccata</i> , sibirisch. Apfel .         | — 20    |
|   |         | <i>spectabilis</i> fl. pleno, gef. Apfel          | — 24    |
|   |         | <i>japonica</i> ( <i>Cydonia</i> ), D, japanische |         |
|   |         | Quitte mit prächt. schaalagr. Blüten;             |         |
|   |         | eine Birde s. jed. Gart. 24 kr. bis               | 1 —     |
|   |         | fl. albo, weißl. . . . .                          | 1 —     |

|  | fl.   kr. |  | fl.   kr. |
|--|-----------|--|-----------|
| <i>Pyrus</i> jap. <i>atrosanguinea</i> , neufl. 1 bis        | 2 —       | <b>Rhus</b> , <i>Eumach</i> .                              |           |
| jap. <i>roscosa</i> . . . . .                                | 1 12      | <i>Cotinus</i> ( <i>Perückenbaum</i> ) . . . . .           | — 18      |
| <i>salicifolia</i> . . . . .                                 | 20        | <i>Vernix</i> . . . . .                                    | — 18      |
| <i>cretica</i> . . . . .                                     | 30        | <b>Ribes</b> , <i>Zohannisbeerstaude</i> .                 |           |
| <i>pinnatifida</i> ( <i>Sorbus</i> ) . . . . .               | 30        | <i>aureum</i> ( <i>palmatum</i> ), <b>D</b> . . . . .      | — 12      |
| <i>Sieveriana</i> . . . . .                                  | —         | <i>Bridgesii</i> . . . . .                                 | — 30      |
| <b>Quercus</b> , die <i>Eiche</i> , <i>agilops</i> . . . . . | 1 —       | <i>acerifolium</i> . . . . .                               | — 24      |
| <i>coccinea</i> . . . . .                                    | — 48      | <i>asplenifolium</i> . . . . .                             | 1 —       |
| <i>bicolor</i> , . . . . .                                   | 30        | <i>atropurpureum</i> . . . . .                             | —         |
| <i>Catesbaei</i> . . . . .                                   | 1 —       | <i>Gordonianum</i> , ein vortrefflicher                    |           |
| <i>Cerris</i> , . . . . .                                    | 48        | Wasserd zwischen <i>aureum</i> und <i>San-</i>             |           |
| fol. var. . . . .  | —         | <i>guineum</i> mit orangef. Blüthe <b>D</b> .              | — 24      |
| <i>coccifera</i> , *, t. . . . .                             | — 48      | <i>sanguineum</i> , rothblühend, <b>D</b> . . . . .        | — 24      |
| <i>filicifolia</i> . . . . .                                 | —         | fl. pleno, roth gefüllt . . . . .                          | 1 12      |
| <i>heterophylla</i> ( <i>fastig. cucullata</i> ) . . . . .   | 3 30      | <i>macrobotrys</i> . . . . .                               | — 24      |
| <i>laciniata</i> . . . . .                                   | 1 30      | <i>cerasiforme</i> . . . . .                               | — 24      |
| <i>laurifolia</i> . . . . .                                  | 1 —       | <i>nigrum</i> . . . . .                                    | — 6       |
| <i>macranthera</i> . . . . .                                 | —         | <i>grossularia</i> . . . . .                               | — 10      |
| <i>pendula</i> . . . . .                                     | 1 30      | <i>rubrum</i> . . . . .                                    | — 6       |
| <i>nigra</i> . . . . .                                       | 48        | <b>Robinia</b> , <i>Alfäzie</i> .                          |           |
| <i>pseudosuber</i> . . . . .                                 | 1 30      | <i>pseudoacacia</i> , <b>II</b> , h . . . . .              | — 24      |
| <i>prinos discolor</i> . . . . .                             | 48        | <i>Bessoniana</i> , hochstämmig . . . . .                  | 1 —       |
| <i>macrophylla</i> . . . . .                                 | 1 —       | <i>hispidia</i> , rothblühend . . . . .                    | — 20      |
| <i>pyramidalis</i> ( <i>fastigiata</i> ) 48 kr. bis          | 1 30      | ditto hochstämmig . . . . .                                | — 48      |
| pr. 12 Stück fl. 10. bis                                     | 15 —      | <i>hispidia complexa</i> , eine                            |           |
| <i>robur</i> fol. var. . . . .                               | 1 —       | neue prächtig großblühende, hoch-                          |           |
| <i>rubra</i> . . . . .                                       | 30        | stämmig . . . . .  | 2 —       |
| <i>palustris</i> . . . . .                                   | 30        | niederstämmig . . . . .                                    | 1 —       |
| <i>Jlex</i> * t. . . . .                                     | 48        | <i>inermis</i> , Kugelfäzie, <b>D</b> . . . . .            | — 24      |
| <b>Rhamnus</b> <i>oleaeifolius</i> *, von Californien        | 1 —       | ditto hochstämmig, <b>D</b> . . . . .                      | — 48      |
| <b>Rhododendron</b> , die <i>Alpenrose</i> , hde             |           | <i>rubra</i> ( <i>Goudouin</i> ), schön                    |           |
| <i>azaloides</i> * . . . . .                                 | — 48      | und dauerhafter als die alte                               |           |
| <i>Cartoni</i> , *, . . . . .                                | 1 —       | Kugelfäzie <b>D</b> 24 kr. bis                             | — 36      |
| <i>Gowenianum</i> * . . . . .                                | 1 —       | ditto hochst. <b>D</b> . fl. 1 " . . . . .                 | 1 30      |
| <i>Catawbiense</i> u. var. 36 kr. bis                        | 1 30      | <i>involuta elegans</i> , ( <b>R.</b> )                    |           |
| <i>campanulatum</i> hybr, diese Erzeu-                       |           | äußerst zierlich in Zweigen und                            |           |
| nisse auf unserer Samenzucht von <b>R. cam-</b>              |           | Blättern gesträumt hochst. . . . .                         | 2 —       |
| <b>panulatum</b> verdienen die häufigste                     |           | niederstämmig . . . . .                                    | 1 —       |
| Verbreitung wegen ihres bauartigen,                          |           | <i>microphylla</i> , <b>D</b> 36 kr. " . . . . .           | — 48      |
| ausgebreiteten Wuchses, Größe der Blumen,                    |           | <i>pendula</i> . . . . .                                   | 1 12      |
| und Dauerhaftigkeit im Winter, wodurch sie                   |           | <i>spectabilis</i> , . . . . .                             | — 24      |
| den gewöhnlichen <b>R. ponticum</b> , welcher                |           | <i>stricta</i> . . . . .                                   | — 30      |
| bei strenger Kälte oft leidet, weit übertrifft!              |           | <i>tortuosa</i> . . . . .                                  | — 48      |
| fl. 2. bis   | 20 —      | <i>macrophylla</i> . . . . .                               | — 24      |
| <i>fastuosum</i> flor. pl. fl. 1. 30 kr. bis                 | 5 —       | <i>viscosa</i> , hellrosaf. Kugelfäzie, <b>D</b>           | — 24      |
| <i>dauricum atrovirens</i> , blühet schon                    |           | ditto hochstämmig 36 kr. bis                               | — 48      |
| im März . . . . .  | 1 30      | <i>hybrida</i> . . . . .                                   | — 24      |
| <i>ferrugineum</i> , Alpen . . . . .                         | 1 —       | <i>cylindrica</i> . . . . .                                | — 36      |
| <i>hirsutum arborescens</i> , ditto . . . . .                | 1 —       | <i>elegantissima</i> . . . . .                             | — 36      |
| fol. var. . . . .  | 1 —       | <i>formosa</i> . . . . .                                   | — 36      |
| <i>ponticum</i> und var. . . 30 kr. bis                      | 1 —       | <b>Caragana</b> , <i>Erbfenbaum</i> , gelbfäzie, <b>II</b> | — 8       |
| hydr. <i>caucasicum</i> , fast weiß, sehr                    |           | <i>Chamaglu</i> , sehr schön . . . . .                     | — 36      |
| andauernd, niedrig . . fl. 1. bis                            | 1 30      | <i>ferox</i> . . . . .                                     | — 30      |
| <i>crispum</i> . . . . .                                     | 1 30      | <i>frutescens</i> . . . . .                                | — 10      |
| fol. var. . . . .  | 1 30      | <i>Halodendron</i> , sehr schön roth-                      |           |
| <i>maximum</i> und var. . . 36 kr. bis                       | 1 30      | blühend . . . . .  | — 48      |
| <i>hyacinthiflorum</i> . . . . fl. 1. "                      | 3 —       | <i>gracilis</i> . . . . .                                  | — 36      |
| <i>guttatum</i> . . . . .                                    | 3 —       | <i>jubata</i> . . . . .                                    | —         |
| <i>Lowii</i> . . . . .                                       | 3 —       | <b>Rosa</b> , im betreffenden Verzeichnisse.               |           |
| <i>multimaculatum</i> . . . . " 1. "                         | 3 —       | <b>Rubus</b> , <i>Brombeere</i> , <i>Himbeere</i> .        |           |
| <i>Vernaeum</i> fl. pl. fl. 1. 30 kr. bis                    | 5 —       | <i>fruticosus</i> , fl. albo pleno . . . . .               | — 24      |



|  | fl. | kr. |  | fl.        | kr. |
|--|-----|-----|--|------------|-----|
| Rubus bellidiflorus pleno . . . . .          | —   | 24  | Spiraea hypericifolia, <b>H</b> . . . . .                | —          | 6   |
| laciniatus . . . . .                         | —   | 24  | flexuosa, <b>D</b> . . . . .                             | —          | 10  |
| nobilis . . . . .                            | —   | 24  | laevigata . . . . .                                      | —          | 24  |
| rosaeiflorus, fl. pleno . . . . .            | —   | 24  | lanceifolia . . . . .                                    | —          | 20  |
| odoratus, <b>D</b> . . . . .                 | —   | 8   | Lindleyana, *, <b>H</b> . . . . .                        | —          | 24  |
| Idaeus, <b>H</b> . . . . .                   | —   | 6   | opulifolia, <b>H</b> . . . . .                           | —          | 8   |
| Ruscus, Mäusedorn, immergrün.                |     |     | Pitkowiensis . . . . .                                   | —          | 24  |
| Hypophyllum * <b>D</b> , t . . . . .         | —   | 24  | prunifolia pleno, <b>D</b> , <b>H</b> , sehr schön       |            |     |
| Salisburia, f. Ginfgo.                       |     |     | gefüllt . . . . .  | 18 kr. bis | —   |
| Salix, die Weide.                            |     |     | Reevesi ( <i>Humanni</i> ), ausgezeichnet                |            | —   |
| babylonia, Trauerweide, h . . . . .          | —   | 24  | schön <b>D</b> . . . . .                                 | —          | 24  |
| cornuta, <b>D</b> , krausblätt. . . . .      | —   | 24  | rotundifolia . . . . .                                   | —          | 24  |
| argentea, Silberweide . . . . .              | —   | 24  | salicifolia, <b>H</b> . . . . .                          | —          | 4   |
| caprea tricolor, bunte . . . . .             | —   | 24  | ruberrima . . . . .                                      | —          | 24  |
| canadensis . . . . .                         | —   | 20  | sorbifolia . . . . .                                     | —          | 10  |
| laurifolia, breitblättrige . . . . .         | —   | 24  | vaccinifolia . . . . .                                   | —          | 24  |
| nigra pendula . . . . .                      | —   | 24  | venustula . . . . .                                      | —          | 24  |
| hochstämmig . . . . .                        | 1   | 30  | Staphylea, die Pimpernuß.                                |            |     |
| Sambucus, Hofsunder, Flieder.                |     |     | colchica trifoliata . . . . .                            | 1          | 30  |
| nigra . . . . .                              | —   | 6   | colchica pinnata . . . . .                               | 1          | 30  |
| heterophylla . . . . .                       | —   | 24  | pinnata . . . . .  | —          | 10  |
| fl. pleno, gefülltblühender, schön . . . . . | —   | 24  | Swamerdamia antennaria, *                                |            |     |
| laciniata . . . . .                          | —   | 8   | Symphoria, Peterstrauch.                                 |            |     |
| formosa . . . . .                            | —   | 24  | racemosa, Trauben-Schneebere, <b>D</b> . . . . .         | —          | 12  |
| fol. var. . . . .                            | —   | 10  | vulgaris, <b>H</b> . . . . .                             | —          | 6   |
| monstrosa . . . . .                          | —   | 12  | fol. var. . . . .  | —          | 24  |
| racemosa, <b>H</b> . . . . .                 | —   | 6   | Syrinea, Syrene.   |            |     |
| Schubertia, f. Cupressus.                    |     |     | chinensis, <b>H</b> . . . . .                            | —          | 12  |
| Sophora japonica, h, <b>D</b> . . . . .      | —   | 24  | fl. rubro, <b>D</b> ( <i>Sauchet</i> ) . . . . .         | —          | 24  |
| pendula h, <b>D</b> . 48 kr. bis             | 1   | 12  | fl. albo, die weißblühende chine-                        |            |     |
| Sorbus (Pyrus), Vogelbeerbaum.               |     |     | sische Syrene fl. 1. 30 kr. bis                          | 3          | 30  |
| Aria . . . . .                               | —   | 24  | Emodii, (aus Nepal) . . . fl. 1 bis                      | 2          | —   |
| americana . . . . .                          | —   | 24  | Josikaea . . . . .                                       | —          | 24  |
| aucuparia, h, <b>D</b> . . 12 kr. bis        | —   | 24  | persica . . . . .  | —          | 12  |
| domestica, Epierling . 48 kr. bis            | 1   | 12  | laciniata . . . . .                                      | —          | 24  |
| hybrida, Bastard . . . . .                   | —   | 30  | pteridifolia . . . . .                                   | —          | —   |
| Spartium, Pfriemen, Ginster.                 |     |     | vulgaris, <b>H</b> . . . . .                             | —          | 6   |
| junceum, * . . . . .                         | —   | 10  | fl. albo . . . . .                                       | —          | 6   |
| scoparium, fl. albido, * . . . . .           | —   | 24  | fl. pleno . . . . .                                      | —          | 30  |
| fol. var. * . . . . .                        | —   | 24  | maxima . . . . .   | —          | 24  |
| tinctorium, fl. pleno . . . . .              | —   | 24  | hericartiana . . . . .                                   | —          | 24  |
| Spiraea, Epierstaude.                        |     |     | Liberti, neu . 24 kr. bis                                | 1          | —   |
| acutifolia . . . . .                         | —   | 12  | nigra . . . . .  | —          | 30  |
| alpina, sehr niedrig . . . . .               | —   | 20  | Marly . . . . .  | —          | 24  |
| arifolia, wunderschön <b>D</b> 36 kr. bis    | —   | 48  | sp. Himalaya . . . . . fl. 1 bis                         | 2          | —   |
| pr. 12 Stück                                 | 5   | —   | Tamarix, Tamarisfenstrauch.                              |            |     |
| bella, <b>D</b> . . . . .                    | —   | 18  | germanica . . . . .                                      | —          | 12  |
| Blumei, klein . . . . .                      | —   | 48  | gallica, <b>D</b> , <b>H</b> . . . . .                   | —          | 10  |
| californica, neueste . . . . .               | 2   | —   | indica, sehr zierlich . . . . .                          | —          | 24  |
| callosa, ganz neu, aus Nord-China,           |     |     | africana ( <i>florib.</i> ), ausgez. reichblüh. <b>D</b> | —          | 30  |
| mit großen dunkelrothen Blumen. 24 kr. bis   |     |     | Taxodium, f. Cupressus, bei den                          |            |     |
| chamaedrifolia, <b>H</b> . . . . .           | —   | 6   | Nadelhölzern.  |            |     |
| incisa . . . . .                             | —   | 12  | Taxus, Cybe, Taxusbaum, bei den                          |            |     |
| corymbosa, <b>D</b> . . . . .                | —   | 18  | Nadelhölzern.  |            |     |
| cana ( <i>nana</i> ), kleinste . . . . .     | —   | 24  | Tecoma, f. Bignonia.                                     |            |     |
| canescens . . . . .                          | —   | 24  | Thuja, der Lebensbaum bei den                            |            |     |
| crenata, <b>D</b> . . . . .                  | —   | 10  | Nadelhölzern.  |            |     |
| Douglasii, schönste rothblühende, <b>D</b>   | —   | 24  | Tilia, die Linde.  |            |     |
| expansa . . . . .                            | —   | 24  | americana, h, <b>D</b> , großblätt. 24kr. bis            | —          | 36  |

|   |                |  |                |
|---|----------------|--|----------------|
| <i>Tilia americana</i> pyramidalis . . . . .  | fl.   kr.   48 | <i>Viburnum dauricum</i> * . . . . .                 | fl.   kr.   36 |
| argentea ( <i>alba</i> ), weißliche . . . . . | 30             | grandiflorum, * . . . .                              | 2 30           |
| pendula, hängend . . . . .                    | 1 —            | macrocephalum, *, neu . . . . .                      | 1 30           |
| europæa, h . . . . .                          | 24             | macrocephalum verum . . . . .                        | 5 —            |
| asplenifolia, geisligtblätt. . . . .          | 36             | multatum, neu . . . . .                              | 1 —            |
| pendula, hängend . . . . .                    | 48             | plicatum, äht . . . . .                              | 3 —            |
| <b>Ulex, Stachelginster.</b>                  |                | <b>Vinea, Siumgrün.</b>                              |                |
| europæus, fl. pleno, *, t . . . . .           | 24             | herbacea, trauntartiges . . . . .                    | 12             |
| strictus, *, t . . . . .                      | 24             | major, <b>D</b> . . . . .                            | 10             |
| <b>Ulmus, Ulme, Oyer, Rüstbaum.</b>           |                | reticulata . . . . .                                 | 24             |
| adanthifolia . . . . .                        | 48             | eleg. varieg . . . . .                               | 36             |
| americana, <b>H</b> h, höchst empfehlenswerch |                | minor, <b>H</b> . . . . .                            | 6              |
| zu Alleen und zu größeren Pflanz-             |                | fol. var. * . . . .                                  | 10             |
| zungen wegen raschen Wachthes und             |                | fl. pleno . . . . .                                  | 10             |
| werthvollen Holzes 12 kr. bis                 | 30             | <b>Virgilia lutea</b> , schön . . . . .              | 48             |
| pr. 100 Stück fl. 18. bis                     | 40             | <b>Vitis, wilde Weinrebe.</b>                        |                |
| campestris, fol. var. . . . .                 | 18             | arborea, *, ( <i>Ampelop. bipin.</i> ) . . . . .     | 36             |
| fol. v. elegant. . . . .                      | 1              | hederacea, Traugfernwien . . . . .                   | 6              |
| gracilis, sehr fein . . . . .                 | 48             | ditto pr. 100 Stück . . . . .                        | 7 —            |
| excelsa . . . . .                             | 36             | Labrusca . . . . .                                   | 12             |
| exoniensis, pyramidenf. großbl. . . . .       | 30             | Isabella, prachtvoll großblättrig, bedt              |                |
| asplenifolia . . . . .                        | 30             | große Flächen, und bringt wunderschöne               |                |
| latifolia pendula, schöner Baum . . . . .     | 48             | Früchte, erträgt außerdem wit mehr                   |                |
| fastigiata . . . . .                          | 36             | Sorte, als jeder andere Wein! . . . . .              | 24             |
| <b>Vaccinium Oxycoccus</b> , hde . . . . .    | 24             | <b>Weigelia rosea</b> , dieser schöne neue Strauch   |                |
| ovatum . . . . .                              | 24             | hält unsern Winter ohne Bedeckung                    |                |
| uliginosum . . . . .                          | 24             | aus . . . . . 24 kr. bis                             | 48             |
| virgatum . . . . .                            | 24             | ditto pr. 12 Stück fl. 4. bis                        | 6 —            |
| formosum . . . . .                            | —              | lutea . . . . .                                      | 1 30           |
| venustum . . . . .                            | —              | Middendorfi (?) . . . . .                            | 1 30           |
| Vitis Idæa, Preusselbeere . . . . .           | 24             | splendens . . . . .                                  | 1 30           |
| <b>Viburnum, der Schneeball.</b>              |                | Metelerkampfi . . . . .                              | 1 30           |
| Opulus, fl. pleno, <b>D</b> . . . . .         | 12             | amabilis . . . . .                                   | 1 30           |
| pygmaum, Zwergf. <b>D</b> . . . . .           | 24             | <b>Wistaria, f. Glycine.</b>                         |                |
| dentatum . . . . .                            | 24             | <b>Yucca flaccida</b> , eine frei ausaltende, un-    |                |
| prunifolium . . . . .                         | 24             | vergleichliche Pflanze, <b>D</b> , fl. 1. 30 kr. bis | 5 —            |
| cotinifolium, neu, vom Himalaya . . . . .     | 30             | filamentosa . . . . .                                | 1 —            |
| amethystinum, *, neu, aus China . . . . .     | 1              | californica, ganz neu . . . . .                      | —              |
| tinus et var., *, <b>D</b> . . . . .          | 24             | recurva ( <i>pendula</i> ) . . . . .                 | —              |
| cylindricum * . . . . .                       | 1              | fl. 1. 30 kr. bis                                    | 5 —            |

☞ 100 Sorten Ziersträucher und Bäume nach unserer Wahl, mit Namen fl. 23.  
 100 Stück dergleichen in mehreren Sorten, nach unserer Wahl fl. 10 bis fl. 20.  
 100 Stück immergrüner desgleichen zu Wintergärten fl. 40 bis fl. 60.

## Die Coniferen oder Nadelhölzer

finden in neuester Zeit wegen ihrer mannigfaltigen und äusserst zierlichen Formen, gleichwie wegen ihrer Eigenschaften als immergrüne Bäume und Sträucher sehr bereitwillige Aufnahme. Im Anschluss an die auffallenden immergrünen Sträucher: *Mahonia*, *Ilex*, *Rhododendron* etc. und an die ausgezeichnetsten Zierlaubhölzer, wie *Magnolien*, *Azaleen*, *Paeonien* u. s. w. sind sie von unvergleichlicher Wirkung,



und gewähren die Mittel, das Gartenvergnügen, wenn nicht während der strengsten Jahreszeit hindurch, doch bis tief in den Herbst und schon sehr frühe im Frühjahr reichlich zu genießen.

Aus allen Zonen und Höhen der Erde eingeführt, erträgt nur ein Theil der *Cupressen* unsere Winterkälte von 15° bis über 20° Réaumur. Diese folgen hierunter in der 1sten Abtheilung, wovon die mit \* bezeichneten allerdings noch eines geringen Schutzes bedürfen.

Die 2te Abtheilung enthält die zärteren *Species* für das Gewächshaus, worunter wir alle halbharten rechnen, welche entweder nicht mehr als 1° bis 10° Kälte ertragen, oder in Betreff ihrer Ausdauer im Freien noch Zweifel übrig lassen.

### Erste Abtheilung. (Im Freien ausdauernd.)

|   | fl. | kr. |  | fl. | kr. |
|---|-----|-----|--|-----|-----|
| <b>Cupressus, die Cypresse.</b>                 |     |     | <b>Juniperus succica</b> . . . . .               | —   | 30  |
| <i>disticha</i> ( <i>Schubertia Taxodium</i> ). |     |     | <i>thurifera lusitanica</i> , der portugiesische |     |     |
| die Wasserpyresse f. . 36 kr. bis               | 1   | 12  | Weihrauch, hochwachsend, vollkommen              |     |     |
| <i>fastigiata</i> , f. * . . . .                | 1   | 12  | ausdauernd . . . . .                             | 1   | 30  |
| <i>pendula</i> , f. * . . . fl. 1 bis           | 2   | —   | <i>virginica</i> , sehr beliebt . . . . .        | —   | 24  |
| <i>pinnata</i> , f. * . . . .                   | 1   | 12  | <i>filiformis</i> , (Rinz) . . . . .             | 12  | —   |
| <i>sempervirens</i> , f. * hält 15°             |     |     | fol. var. . . . .                                | 1   | 30  |
| Kälte ohne Bedeckung 36 kr. bis                 | 2   | —   | <i>nana</i> . . . . .                            | 2   | —   |
| ditto pr. 12 Stck. fl. 6. bis                   | 12  | —   | <b>Pinus, Kiefer, Föhre.</b>                     |     |     |
| <i>nucifera</i> ?* ( <i>Glyptostrobus</i> .)    | 1   | 12  | <i>austriaca</i> . . . . .                       | —   | 24  |
| <i>funnebris</i> , neue Tranenpyresse aus       |     |     | <i>cembra</i> , Zirbelnuß fl. 1. 30 kr. bis      | 2   | 30  |
| <i>China</i> f. * . . . . 48 kr. bis            | 4   | —   | <i>inops</i> . . . . .                           | —   | 24  |
| ditto pr. 12 St. fl. 7 .                        | 15  | —   | <i>Laricio</i> , schön . . . . .                 | —   | 24  |
| <i>thujoïdes</i> . . . . . 24 kr. .             | —   | 48  | <i>maritima</i> . . . . .                        | —   | 24  |
| <i>compacta</i> . . . . .                       | —   | 48  | <i>ponderosa</i> . . . . .                       | 3   | 30  |
| <b>Ginkgo biloba</b> ( <i>Salisburia</i> )      |     |     | <i>resinosa</i> . . . . .                        | —   | 24  |
| sehr merkwürdig in Wuchs und Blatt,             |     |     | <i>rigida</i> . . . . .                          | —   | 24  |
| Saamenpflanzen . . . fl. 1 bis                  | 2   | —   | <i>serotina</i> . . . . .                        | —   | 24  |
| <b>Juniperus, Wachholder.</b>                   |     |     | <i>Strobis</i> , Weymouthskiefer . . . . .       | —   | 24  |
| <i>alpina</i> . . . . .                         | —   | 30  | <i>excelsa</i> , . . . . .                       | —   | 48  |
| <i>chinensis</i> , sehr schön und ausdauernd    |     |     | <i>Lambertiana</i> . . . . .                     | 3   | —   |
| 36 kr. bis                                      | 1   | 12  | <i>monticola</i> . . . . .                       | 3   | —   |
| <i>communis</i> , gemeiner . . . . .            | —   | 12  | <i>Pumilio</i> , Zwergkiefer . . . . .           | —   | 24  |
| <i>pendula</i> . . . . .                        | 1   | 12  | <i>variabilis</i> , . . . . .                    | —   | 24  |
| <i>cracovica</i> . . . . .                      | —   | 30  | <i>Abies</i> , und <i>Picea</i> , Weißtanne,     |     |     |
| <i>excelsa</i> * ausgezeichnet . . . . .        | 1   | —   | <i>Rothtanne</i> , Nichte.                       |     |     |
| <i>hibernica</i> . . . . .                      | —   | 48  | <i>alba</i> , Weißtanne . . . . .                | —   | 24  |
| <i>hispanica</i> schön . . . . .                | —   | 36  | <i>ajacensis</i> . . . . .                       | —   | —   |
| <i>interrupta</i> . . . . .                     | —   | 36  | <i>balsamea</i> , Balsamtanne . . . . .          | —   | 24  |
| <i>macrocarpa</i> * . . . . .                   | 1   | 12  | <i>prostrata</i> , Zwergtanne . . . . .          | 1   | 12  |
| <i>nana davurica</i> . . . . .                  | —   | 130 | <i>Brunoniana</i> ( <i>dumosa</i> ) * . . . . .  |     |     |
| <i>nepalensis</i> ( <i>recurva</i> ), * hängend |     |     | neu, sehr schön. fl. 1. 30 kr. bis               | 3   | 30  |
| fl. 1 bis                                       | 2   | —   | <i>canadensis</i> , Hemlocktanne . . . . .       | —   | 24  |
| <i>oblonga pendula</i> * sehr schön . .         | 1   | 30  | ditto 4-5 Fuß hoch                               |     |     |
| <i>oxicedrus</i> . . . . .                      | —   | 24  | 48 kr. bis                                       | 1   | —   |
| <i>davurica</i> * . . . . .                     | 1   | 12  | <i>canad. nana</i> . . . . .                     | 2   | —   |
| <i>echiniformis</i> , ganz nieder in            |     |     | <i>cephalonica</i> , klein . . . . .             | 1   | 12  |
| Kugelform, ein Eigenthum aus unsern             |     |     | <i>Douglasi</i> , sehr schön und aus-            |     |     |
| Saamenbeeten, kleine Pflänzchen                 | —   | 48  | dauernd, aus Californien . . . . .               | 3   | 30  |
| <i>sabina cupressiformis</i> . . . . .          | 1   | —   | <i>excelsa</i> , gewöhnliche Rothtanne . . . . . | —   | 24  |
| fol. var. . . . .                               | —   | 36  | <i>Clanbrasiliana</i> , Zwergform . . . . .      | —   | 36  |
| <i>prostrata</i> . . . . .                      | —   | 30  | ditto stärker . . . . .                          | 1   | 30  |
| <i>tamariscifolia</i> , sehr schön . . . .      | —   | 30  | <i>elegans</i> . . . . .                         | 1   | 12  |
| <i>squamata</i> *, friedend, sehr schön, Hart   | 1   | 12  | <i>glauca alba</i> . . . . .                     | 2   | —   |
| <i>sphaerica</i> ( <i>China</i> ) . . . . .     | 4   | —   | <i>monstrosa</i> . . . . .                       | 2   | —   |

|   | fl. | kr. |   | fl. | kr.        |
|---|-----|-----|---|-----|------------|
| <b>Pinus Abies orientalis</b> , ganz kurzadelig, vom Kaukasus . . . . . | 36  | —   | 12 Pinus in 12 Sorten . . . . .                                   | 4   | bis 12     |
| ditto stärker . . . . . fl. 1. bis                                      | 2   | —   | 100 " " 24 " " 40 " . . . . .                                     | 80  | —          |
| <b>pignaea</b> , schönste Zwergform                                     | 36  | —   | Menge der oben bezeichneten sind in bedeutender Anzahl abgeblüht. |     |            |
| ditto stärker . . . . .   | 112 | —   | <b>Podocarpus Macki</b> , trägt unsreilig                         |     |            |
| <b>stricta</b> . . . . .  | —   | —   | 15° Kälte . . . . .   | 30  | kr. bis 2  |
| <b>tennifolia</b> . . . . .   | —   | —   | <b>Taxodium</b> , s. Cupressus.                                   |     |            |
| <b>Fraseri</b> , sehr schön 36 kr. bis                                  | 112 | —   | <b>Taxus</b> , Eibe, Tarnusbaum.                                  |     |            |
| <b>glauca</b> , klein . . . . .   | 48  | —   | <b>baccata</b> . . . . .  | —   | 24         |
| <b>Hudsoni</b> , auffallende Zwergform fl. 1 bis                        | 2   | —   | fol. var. . . . .   | 24  | kr. bis 36 |
| <b>mariana alba</b> , niedliche weißgrüne                               | 30  | —   | <b>canadensis</b> , schnellwachsend . . . . .                     | —   | 24         |
| ditto 4-5 Fuß hoch . . . . .  | 48  | —   | ditto stärker . . . . .   | 36  | kr. bis 1  |
| <b>nigra</b> , kleine Zwergtaune . . . . .                              | 30  | —   | <b>pyramidalis</b> , vollkommen                                   |     |            |
| <b>pumila</b> , sehr schöne Strauchf.                                   | 112 | —   | aussauernd, pyramidalischer . . . . .                             | 1   | —          |
| <b>Morinda (Smithi, Pindraw, Rhutrow)</b> , mit hängenden               |     |     | <b>Dovestoni (umbraculifera)</b> mit                              |     |            |
| Zweigen . . . . . 36 kr. bis  | 2   | —   | hängenden Zweigen, sehr typia und ent-                            |     |            |
| <b>nobilis</b> , *, schön und selten . . . . .                          | 330 | —   | pschenswerth fl. 1. 30 kr. bis                                    | 2   | —          |
| <b>Nordmanniana</b> , schöne Zweig-                                     |     |     | <b>hibernica</b> *, in schlanker Pyramidenform,                   |     |            |
| taune vom Kaukasus . . . . .  | 2   | —   | etwas gärtlich . . . . .  | 30  | kr. bis 48 |
| ditto Samenpflanzen . . . . .   | 3   | —   | <b>nucifera</b> * . . . . .                                       | —   | 48         |
| <b>Pinsapo</b> , sehr schön, klein . . . . .                            | 48  | —   | <b>procumbens (stricta)</b> . . . . .                             | 1   | 30         |
| <b>Pichta (sibirica)</b> schön . . . . .                                | 2   | —   | <b>recurva</b> . . . . . fl. 1. 30 kr. bis                        | 2   | 30         |
| <b>Tschugatskoi</b> . . . . .   | —   | —   | <b>tardiya (Cephalot. adpressa)</b> ,                             |     |            |
| <b>Menziesii</b> , schönste grau-grüne                                  |     |     | höchst empfehlenswerth . . . . . fl. 1 bis                        | 2   | —          |
| aus Californien 30 kr. bis  | 230 | —   | <b>Thuja</b> , der Lebensbaum.                                    |     |            |
| <b>Cedrus</b> *, Cedar vom Libanon 36 kr. bis                           | 112 | —   | <b>aurca</b> . . . . .  | —   | —          |
| <b>atlantica argentea</b> . . . . .                                     | —   | —   | <b>cupressoides (Cupr. thuyoid.)</b> . . . . .                    | —   | 24         |
| <b>viridis</b> . . . . .  | —   | —   | <b>dolabrata</b> ? * (Cupr. lusit.?) . . . . .                    | 1   | 30         |
| <b>Deodara</b> *, aus Nepal, schön                                      |     |     | <b>intermedia</b> * . . . . . fl. 1 bis                           | 1   | 30         |
| grau-grün . . . . . 36 kr. bis  | 2   | —   | <b>nepalensis</b> (ähnlich der orientalis) . . . . .              | —   | 36         |
| <b>crassifolia</b> , neu fl. 2 bis                                      | 5   | —   | <b>occidentalis</b> . . . . . 12 kr. bis                          | —   | 36         |
| <b>viridis</b> , neu . . . . . 2 "                                      | 330 | —   | <b>orientalis</b> . . . . . 12 . . . . .                          | —   | 36         |
| <b>Larix</b> , die Lerche.  |     |     | <b>argentea var.</b> , neu . . . . .                              | 2   | 30         |
| <b>europaea</b> . . . . . 12 kr. bis                                    | 24  | —   | <b>pendula</b> * . . . . . fl. 1 bis                              | 3   | —          |
| <b>americana</b> . . . . . 48 . . . . .                                 | 112 | —   | <b>plicata</b> , sehr schön . . . . . 48 kr. bis                  | 1   | 112        |
| <b>Griffithi</b> , neu . . . . .  | —   | —   | <b>flagelliformis</b> . . . . .                                   | 1   | 112        |
| <b>horizontalis</b> . . . . .   | 112 | —   | <b>tartarica</b> * . . . . .                                      | —   | 48         |
| <b>pendula</b> . . . . .  | 130 | —   | <b>Wareana</b> . . . . .  | —   | 36         |
| <b>sibirica</b> . . . . .   | —   | —   | <b>Thujopsis borealis</b> . . . . .                               | 10  | —          |

**Zweite Abtheilung.** (Die zarten, und, mit fr. bezeichnet, die halbharten, bis zu 10° Kälte ertragenden species.)

|  | fl. | kr. |   | fl. | kr. |
|--|-----|-----|---|-----|-----|
| <b>Auracaria brasiliensis.</b>               |     |     | <b>Cryptomeria japonica</b> , fr.             |     |     |
| Samenpflanzen . . . . . fl. 2 bis            | 12  | —   | 36 kr. bis                                    | 2   | —   |
| <b>Bidwelliana</b> , Gipfelpflanze . . . . . | 35  | —   | <b>glauca</b> . . . . .                       | —   | —   |
| <b>Cockii</b> , Gipfelpflanze . . . . .      | 40  | —   | <b>nana</b> . . . . . fl. 1 bis               | 3   | —   |
| <b>Cunninghami</b> , Stedflinge . . . . .    | 6   | —   | <b>Lobbiana</b> . . . . .                     | —   | —   |
| <b>excelsa</b> , 2 Fuß hohe Samenpflanzen    | 15  | —   | <b>Cupressus australis (Callitris.)</b>       | 1   | 30  |
| <b>gracilis (elegans)</b> Gipfelpflanze      | 12  | —   | <b>funerbris</b> , fr., neue Trauerpflanze    |     |     |
| ditto ditto stärker . . . . .                | 30  | —   | aus China 48 kr. bis                          | 4   | —   |
| ditto Stedflinge . . . . .                   | 230 | —   | ditto Exemplare mit feingewigelter            |     |     |
| <b>imbricata</b> fr., Samenpflanzen          |     |     | Ausbildung . . . . . fl. 2 bis                | 3   | —   |
| fl. 1. 30 kr. bis                            | 3   | —   | <b>lusitanica elegans</b> . . . . . fl. 1 bis | 2   | 30  |
| <b>Callitris australis (Cupressus.)</b>      | 130 | —   | <b>macrocarpa (Lambertiana)</b> ,             |     |     |
| <b>macrostachya (Frenelia)</b> . . . . .     | 2   | —   | fr. . . . . fl. 1 bis                         | 4   | —   |
| <b>quadrivalvis (Thuja articulata)</b>       | 112 | —   | <b>macrostachya (Callitris)</b> . . . . .     | 2   | —   |



|  | fl.   kr. |   | fl.   kr. |
|--|-----------|---|-----------|
| <b>Cupressus monstrosa</b> . . . . .                     | 2 30      | <b>Pinus apuliensis</b> . . . . .             | 4 —       |
| pendula vera . . . . .                                   | — —       | abchasia . . . . .                            | — —       |
| Reynwardtii . . . . .                                    | — —       | Ayacuahuite . . . . . fl. 2 bis               | 5 —       |
| sempervirens . . . . . 24 kr. bis                        | 1 30      | Benthamiana . . . . .                         | — —       |
| horizontalis . . . . .                                   | 1 —       | californica . . . . .                         | — —       |
| tortuosa . . . . .                                       | 1 —       | canariensis . . . . .                         | 1 —       |
| species ex. Brasil. . . . .                              | 1 30      | cembroides . . . . .                          | — —       |
| torulosa ( <i>lusitan. eleg.?</i> ) . . . . .            | 1 30      | Devoniana . . . . .                           | 4 —       |
| Tournefortii . . . . . 36 kr. bis                        | 1 12      | Edgariana . . . . .                           | — —       |
| Uthdeana . . . . . fl. 1. 30 kr. bis                     | 5 —       | filifolia . . . . . fl. 10 bis                | 25 —      |
| <b>Daerydium cupressinum</b> . . . . .                   | — —       | Gerardiana . . . . .                          | 2 30      |
| fl. 2 bis . . . . .                                      | 8 —       | Hartwegi . . . . .                            | 3 30      |
| Franklini . . . . .                                      | 3 30      | ignota . . . . .                              | 3 30      |
| spicatum ( <i>Podocarpus</i> ) . . . . .                 | 1 —       | leophylla . . . . .                           | 3 —       |
| taxifolium ( <i>fuscum</i> ) fl. 2. bis                  | 8 —       | Lemoniana . . . . .                           | 2 30      |
| <b>Dammara alba</b> . . . . .                            | 10 —      | Lindleyana . . . . .                          | — —       |
| australis . . . . .                                      | 3 —       | longifolia . . . . .                          | — —       |
| <b>Fitzroya patagonia</b> fl. 6 bis                      | 12 —      | macrocarpa . . . . .                          | 5 —       |
| <b>Frenelia</b> , s. <i>Callitris</i> , <i>Cupressus</i> | — —       | macrophylla . . . . .                         | 3 30      |
| und <i>Juniperus</i> .                                   | — —       | Montezuma . . . . . fl. 2 bis                 | 5 —       |
| <b>Juniperus Bedfordiana</b> , fr.                       | — —       | muricata . . . . .                            | — —       |
| 30 kr. bis . . . . .                                     | — 48      | palustris . . . . . fl. 1. 30 kr. bis         | 3 —       |
| aromatica . . . . .                                      | 1 30      | patula . . . . .                              | 3 30      |
| Benthamiana . . . . .                                    | 1 12      | pseudo strobis . . . . .                      | 4 —       |
| Bermudiana . . . . .                                     | — 48      | radiata . . . . . fl. 3 bis                   | 5 —       |
| canescens, schön . . . . .                               | 1 30      | Russeliana . . . . .                          | — —       |
| cinerascens . . . . .                                    | 1 30      | Sabini . . . . .                              | 5 —       |
| dealbata . . . . .                                       | 1 30      | species Ehrenberg . . . . .                   | 5 —       |
| ericoides ( <i>Retinospora</i> ) . . . . .               | — —       | tenuifolia . . . . . fl. 3 bis                | 7 —       |
| 30 kr. bis . . . . .                                     | 2 —       | Teocote . . . . . 2                           | 5 —       |
| excelsa nana ( <i>religiosa?</i> ) . . . . .             | 2 —       | abies Brunoniana, fr. ( <i>du-</i>            | — —       |
| filiformis . . . . .                                     | 1 30      | <i>masa</i> ), sehr schön fl. 1. 30 kr. bis   | 3 30      |
| flaccida . . . . . 36 kr. bis                            | — 48      | grandis . . . . .                             | — —       |
| flagelliformis . . . . .                                 | 1 —       | Jezeensis, neu aus Japan . . . . .            | 12 —      |
| fragrans . . . . .                                       | 1 30      | lanceolata . . . . . 48 kr. bis               | 3 30      |
| Gossainthanea, fr. . . . . 30 kr. bis                    | 1 —       | religiosa, Steddinge . . . . .                | 2 30      |
| Herrmanni . . . . . fl. 1. #                             | 2 —       | spectabilis, Steddinge fl. 1 bis              | 2 30      |
| horizontalis . . . . .                                   | 1 30      | ditto Zamenplanzen                            | — —       |
| mexicana . . . . .                                       | 2 30      | fl. 2. 30 kr. bis                             | 4 —       |
| occidentalis . . . . .                                   | 1 30      | Webbiana, neu . . . . .                       | 3 30      |
| recurva densa . . . . .                                  | 1 30      | <b>Podocarpus Macki</b> , fr., pyra-          | — —       |
| Reevesiana . . . . .                                     | 1 12      | midensförmig . . . . . 30 kr. bis             | 2 —       |
| religiosa . . . . . fl. 1. 30 kr. bis                    | 3 —       | antarctica . . . . .                          | 5 —       |
| Schollii . . . . .                                       | 1 30      | taxifolia ( <i>Torreya Humboldti</i> )        | — —       |
| sphaerica ( <i>China</i> ) . . . . .                     | 4 —       | macrophyllus . . . . .                        | 1 —       |
| squarrosa ( <i>Retinospora</i> ) . . . . .               | 1 12      | <b>Retinospora</b> , s. <i>Juniperus</i>      | — —       |
| Struthiana . . . . .                                     | 1 30      | <b>Saxgothaea conspicua</b> . . . . .         | — —       |
| thurifera ( <i>Mexico</i> ) . . . . .                    | 1 12      | fl. 7 bis                                     | 18 —      |
| <b>Libocedrus (Thuja)</b> .                              | — —       | <b>Seguoia gigantea</b> , s. <i>Taxod.</i>    | — —       |
| chilensis, fr. . . . .                                   | 3 30      | semperv.                                      | — —       |
| excelsa . . . . .  | — —       | <b>Thuja chilensis</b> , s. <i>Libocedrus</i> | — —       |
| Doniana . . . . . fl. 3 bis                              | 6 —       | Doniana, s. <i>Libocedrus</i> .               | — —       |
| <b>Phyllocladus trichomanoides</b>                       | — —       | <b>Taxus Fortunei</b> , mas., neu, sehr schön | 6 —       |
| fl. 1. 30 kr. bis  | 10 —      | nucifera, fr. . . . .                         | — 48      |
| rhomboidalis ( <i>asplenifolius</i> ) . . . . .          | 3 30      | pedunculatus . . . . .                        | 3 —       |

## Ziersträucher in Töpfen und Vasen.

Manche immergrüne, in Töpfen erzogene Ziersträucher eignen sich ungemein wohl zur Dekorirung der Zimmer, Hausgänge und anderer Räumlichkeiten, welche wenig oder gar nicht geheizt werden, weil diese Pflanzen bei schöner Belaubung sowohl Kälte als Hitze und sogar Unregelmäßigkeiten im Begiessen weit besser und länger vertragen als Gewächshauspflanzen.

Unter den Nadelhölzern empfehlen sich zu diesem Zwecke ganz besonders: *Thuja*, *Taxus*, *Cupressus*, *Juniperus* und *Pinus*, unter den immergrünen Laubhölzern: *Prunus lauro Cerasus*, *Mahonia*, *Evonymus jap. fol. var.*, *Evonymus repens*, *Laurus nobilis*, *Viburnum Tinus*, *Aucuba japonica*, alle grüne und buntblättrigte *Ilex*, *Cotoneaster microphylla* und *rotundifolia* mit ihren wunderschönen Beeren, *Crataegus crenulata*, *Rhododendron etc.*

Zu dauerhaften Laubgewinden: die verschiedenen *Ephedra* (*Hedera*), *Vinca major* und *minor*; zu niederen Vasen: alle *Vinca*, *Ruscus*, *Hypericum calycinum*, einige *Juniperus* u. s. w.

## Rosen - Sortiment.

Die theils unbezeichneten, theils mit † bezeichneten Sorten sind überhaupt gepropfte und okulirte Rosen, gleichviel ob auf hohen oder niederen Stämmchen; jene mit \* können auch wurzelicht geliefert werden, jene mit † sind in Töpfen erzogen; und lassen sich daher zu jeder Jahreszeit versenden und verpflanzen.

Die gepropften und okulirten Stämmchen sind meistens von 1 bis 5 Fuss hoch, da sie in dieser Höhe am besten zu Gesichte stehen. Aufträge mit Bestimmung einer gewissen Höhe können nicht immer vollständig ausgeführt werden, wenn uns nicht eine freie Wahl in den Sorten überlassen bleibt.

Bei Aufträgen für mehr als 50 Stück lassen wir gerne eine verhältnissmässige Preisermässigung eintreten, wenn dies der Vermehrungsvorrath gestattet.

Wegen des sehr zeitigen Frühjahrtriebes der Rosen bitten wir um gefällige Aufträge möglichst bis vor Ende Februar.

### *Rosa pimpinellifolia*; Pimpinellblättrige Rose.

|  | fl.       | kr. |
|--|-----------|-----|
| Aurore, ( <i>Verdier</i> 1847), gefüllt, fein hellrosa . . . . .         | —         | 48  |
| Blanche, fast gefüllt, weiß, * . . . . .                                 | 6 kr. bis | 12  |
| Jaune double, fast gefüllt, bläulichgelb, † . . . . .                    | —         | 48  |
| rose, fast gefüllt, rosa, * . . . . .                                    | 6 kr. bis | 12  |
| Stanwell, groß, gefüllt, fleischfarb, öfter blühend, † . . . . .         | —         | 48  |
| picturata, R., gefüllt, carmin, schön schattirt und geadert, * . . . . . | —         | 48  |

### *Rosa lutea* und *bicolor*, gelbe und Kapuziner-Rose (Feuer-Rose.)

|  |            |     |
|--|------------|-----|
| <i>Lutea</i> , einfach, dunkelgelb, schöne Effect-Rose, * . . . . .          | —          | 12  |
| <i>bicolor</i> ( <i>punica</i> ), einfache hochrothe Feuer-Rose, * . . . . . | —          | 24  |
| <i>Harrisonii</i> , fast gefüllt, schön hochgelb, † . . . . .                | —          | 48  |
| <i>Persian yellow</i> , neue, sehr gefüllte, dunkelgelbe, groß, † . . . . .  | 48 kr. bis | 1 — |



**Rosa alba; die weiße Rose.**

|  |  |
|--|--|
| Etoile de la Malmaison, gefüllt, schön gebaut, fleischfarb, weiß gerändert † |  |
| Reine de Danemark, neu, †  |  |
| Madame Audot, gefüllt, zart fleischfarb † *                                  |  |
| Félicité Parmentier, gr., sehr gef., fleischfarb, †                          |  |
| Miranda, gr., gef., rosa, †  |  |
| Sophie de Bavière, gef., schön lebhaft rosa, †                               |  |

a 48 kr.

**Rosa bifera (*R. calendaram*); die öfter blühende oder**

**Perpetuelle-Rose.**

halbhoch und hochstämmig 48 kr. bis fl. 1.

|   |  |
|---|--|
| Antinous, gr., gef., gut gebaut, purpurviolett            |  |
| Bernard, sehr gef., lebhaft zart rosa, †                  |  |
| Elisa Vilmorin, gr., sehr gef., reich fleischfarb-rosa    |  |
| La Favorite, fast weiß, zuweilen gestreift                |  |
| Laurence de Montmorency, gr., gef., rosa-lila, †          |  |
| Ebène, gef., purpurviolett, †                             |  |
| Pourpre royale, gef., violett-purpur                      |  |
| Purpurin ( <i>Margottin</i> ), gef., dunkelcarmoisin      |  |
| Du Roi, gef., lebhaft roth, sehr geschäft                 |  |
| Du Roi a fl. violets, mit violett-rothen Blumen           |  |
| Indigo, gr., doppelt, dunkelviolett, ausgezeichnete Farbe |  |

**Rosa hybrida-bifera (*R. hybride-remontante*), die neue öfter**

**blühende Hybrid- oder Bastard-Rose.**

(Diese stehen theils der Rosa-bifera, theils der Bourbon-Rose sehr nahe, liefern Blumen bis zum Spätherbste, ertragen Winterkälte von 15° bis 18°, ohne Bedeckung und werden deshalb gegenwärtig vorzugsweise geschäft.)

halbhoch und hochstämmig pr. Stück 48 kr. bis fl. 1.  
mit Ausnahme der neuesten Sorten, wobei ein höherer Preis besonders bemerkt ist.

|   |  |
|---|--|
| Adèle Mauze, *, †, gr., gef., rosa  |  |
| Amandine, gr., gef., zart rosa  |  |
| Auberon, gr., gef., lebhaft rosa  |  |
| Baronne Halez de Claparède, gr., gef., Muschelblume, dunkelroth                                 |  |
| Baronne Prévost, sehr gr., gef., lebhaft rosa   |  |
| Blanche de Beaulieu, gef., weiß, leicht rosa schimmernd   |  |
| Blanche de Portemer, weiß, leicht geröthet  |  |
| Blanche Lamouroux, gef., hellrosa   |  |
| Blanche Vibert (neu), gefüllt, weiß, gelblich im Aufblühen * †                                  |  |
| Caroline de Sansal ( <i>Desprez</i> ), gef., hellfleischfarb, herrlicher Centifolien-Bau        |  |
| Casimir Delavigne   |  |
| Charles Boissière, ( <i>Granger</i> ), gr., sehr gef., gewölbt, lebhaft tiefroth                |  |
| Chereau ( <i>Thomas</i> ), gr., gef., firschröth, übergehend in rosa                            |  |
| Clementine Duval, gef., fugelicht, rosa *   |  |
| Collardeau ( <i>Vibert</i> ), rosa incarnat   |  |
| Colonel Foissy ( <i>Margottin</i> ), gef., lebhaft firschröth                                   |  |
| Comte de Bobrinsky ( <i>Marest</i> ), scharlachcarmin, oft klasser, oft sehr feurig, Preisblume |  |
| Comte de Derby, gr., gef., lebhaft rosa   |  |
| Comte de Montalivet, sehr gr., fast gef., fugel., dunkelviol.-rth *, †                          |  |
| Comtesse Bathiany ( <i>Laffay</i> ), weiß-fleischfarb   |  |
| Coquette de Bellevue, gef., lebhaft rosa * †  |  |
| Cornet, gr., zart rosa, mit runden Petalen †  |  |
| Cymedor, gef., dunkelroth   |  |
| d'Assas, ( <i>Vibert</i> ), gef., purpuramaranth, neu   |  |
| Denis Papin ( <i>Laffay</i> ), gr., gef., dunkelcarmoisin, lila gerändert                       |  |

|   | n. | kr. |
|---|----|-----|
| Desgaches ( <i>Lacharme</i> ), carmin-rosa  |    |     |
| Dembrowsky, dunkelviolet und carmoisin  |    |     |
| Docteur Juillard ( <i>Lacharme</i> ), purpur und carmin   |    |     |
| Docteur Arnal ( <i>Röser</i> 1848), gef., ranunkelf., fast hochr., sehr lebh. * †                                       |    |     |
| Docteur Marjolin, rosa-lila   |    |     |
| Docteur Reynaud, gr., gef., rosa, dunkel gesteckt   | 1  | 30  |
| Duc d'Isly, halb doppelt, carmoisi, ganz dunkel schattirt, * †  |    |     |
| Duchesse de Rohan, gr., gef., dunkelrosa * †  |    |     |
| Duplessy Mornay, ( <i>Fibert</i> ), gef., feurig purpur, neu  |    |     |
| Ernestine de Barante, ranunkelf., gef., lebhaft rosa * †  |    |     |
| Etendart du grand homme   | 1  | 12  |
| Etendart de Marengo ( <i>Guillot</i> ), in der Art von Docteur Arnal, sehr feurig                                       |    |     |
| Eugène Sue, lebh. rosa * †  |    |     |
| Géant des batailles, gef., fast hochroth, sehr lebhaft * †  |    |     |
| General Castellane, gr., sehr gef., hochroth  | 1  | 30  |
| General Cavaignac ( <i>Morangez</i> ), gr., sehr gef. Musterblume, lebhaft dunkelrosa                                   |    |     |
| General Changarnier ( <i>Moulin</i> ), gr., gef., violett-purpur  |    |     |
| Génie de Chateaubriand, gr., gef., lebhaft violettroth  |    |     |
| Gigantesque ( <i>Mauguet</i> ), in der Art der Rose la Reine  |    |     |
| Gloire de Rosamène, doppelt, hochroth, *  |    |     |
| Guillot, gr., gef., rosa-purpur * †   |    |     |
| Henriette Laval ( <i>Guillot</i> ), gef., fleischfarb., carmin gesteckt   | 1  | 30  |
| Jaques Laffite, gr., gef., carmin * †   |    |     |
| Jeanne d'Arc, ( <i>Perdier</i> 1848), gr., gef., weiß, innen fleischfarb. †   |    |     |
| Jnermis ( <i>Lacharme</i> ), schalenförmig, rosa, ohne Stacheln   |    |     |
| Joasine Hannet, gef., dunkelpurpurroth  |    |     |
| Krudner, gef. glänzend fleischf. †  |    |     |
| Lady Fordwich, gef., roth, vielblumig,  |    |     |
| Lanc, gef., rosa  |    |     |
| Laure Ramand, ( <i>Lacharme</i> ), Form der Camellia imbricata, lebhaft lichtrosa                                       |    |     |
| La vaillante Bergère, gef., hell oder fleischfarb-rosa * †  |    |     |
| Le lion des Combats ( <i>Lartey</i> ), sehr gr., feurig dunkelroth, prächtig  |    |     |
| L'Enfant du Mont-Carmel, gr., gef., dunkel-purpur-amaranth  | 1  | 30  |
| Leonie Verger, ranunkelf., gef., lebhaft dunkelrosa * †   |    |     |
| L'inflexible, gr., reich gef., glänzend rosa * †  |    |     |
| Louise Aimé, gef., fleischfarb-rosa * †   |    |     |
| Louise Bordillon, gef., rosa  |    |     |
| Louise Peyronny, ( <i>Lacharme</i> ), sehr gr., Form der Rose la Reine, dunkelrosa mit carmin                           |    |     |
| Lucie de Montazon ( <i>Pelissier</i> ), fein hellrosa, centifolienförmig  |    |     |
| Madame Andry ( <i>Verdir</i> ), sehr gr., dunkelrosa  |    |     |
| Madame de Belfort, gr., gef., zartrosa  |    |     |
| Madame Campbell d'Isly, ( <i>Baudry</i> ), oder Triomphe de Valenciennes, eine zuweilen leicht gestreifte Rose la Reine |    |     |
| Madame Clavel, ( <i>Lacharme</i> ), rosa, mit purpur punktirt   |    |     |
| Madame de Consté, gr., fleischfarb  |    |     |
| Madame Flory, centifolienförmig, hell-lila-rosa   | 1  | 12  |
| Madame Hobetz Desgaches, gef., rosa-lila, *   |    |     |
| Madame de Lamoricière ( <i>Portemer</i> ), sehr gef., lebhaft rosa mit hellen Rückseiten                                |    |     |
| Madame Oger, ( <i>Oger</i> ), sehr gef., incarnat-rosa, prächtig centifolienförmig                                      |    |     |
| Marquisa Bocella, gef., schön geb., fleischfarb., * †   |    |     |
| Marquise d'Ailsa, gr., gef., carmin, schattirt  |    |     |
| Melanie Cornu, gr., sehr gef., dunkelroth oder purpur   |    |     |
| Mère de St. Louis ( <i>Lacharme</i> ), gr., fast weiß, leicht fleischfarb   |    |     |
| Montaigne, gef., fugelicht, carminrosa, * †   |    |     |
| Mistriss Elliot, fast gef., rosa-violett  |    |     |
| Olivier de Serre, gr., gef., dunkelrosa   |    |     |
| Palais de Cristal ( <i>Quetier</i> ), sehr gef., lebhaft weiß-fleischfarb   |    |     |
| Paul Dupuy, gr., sehr gef., dunkel-carmoisin  | 2  | —   |
| Philoxène, gef., glänzend carminrosa, neu † *   |    |     |
| Pie IX. ( <i>Fibert</i> ), gef. hellcarmoisin   |    |     |
| Ponctué, gef., dunkelrosa, punktirt   |    |     |



|   | n. | kr. |
|---|----|-----|
| Praire, gef., fein incarnat-rosa, sehr fein                               |    |     |
| Prince Albert, sehr gef., veränderlich rosa, purpur und violett           |    |     |
| Prudence Roeser, gef. rosa  |    |     |
| Queen Victoria ( <i>Paul</i> ), fleischfarbweiß, Form der R. la Reine     | 1  | 12  |
| Reine des fleurs, sehr gr., gefüllt, lila=rosa, * †                       |    |     |
| Reveille, gef., rosa=purpur   |    |     |
| Rose de la Reine, sehr gr. centifoliaf., dunkelrosa * †                   |    |     |
| Rose et blanche ( <i>Oger</i> ), sehr gef., firschröth mit weißem Centrum | 1  | 12  |
| Rosine Margottin ( <i>Margottin</i> ), gef., schön gebaut, fleischfarb    |    |     |
| Rubens ( <i>Laffay</i> ), gr., fast gef., sammet=amaranth                 | 2  | —   |
| Soleil d'Austerlitz, gr., gef., fein, carmin oder hochr. *                |    |     |
| Sr. de la reine des Belges ( <i>de Faux</i> ), gr., leuchtend hoch=carmin |    |     |
| Souvenir de L. Gower ( <i>Guillot</i> ), sehr gr., dunkelrubinroth        | 2  | —   |
| Sydonie, gr., gef., rosa  |    |     |
| Theocrite, gr., gef., feurig rosa   |    |     |
| Triomphe de Paris ( <i>Margottin</i> ), sehr gr., gef., dunkelsammetroth  | 2  | —   |
| William Griffith, gef., rosa=lila   |    |     |

Rosa damascena; Damaſcener-Rose.

|   |  |  |
|---|--|--|
| Madame Hardy, gr., sehr gef., schalenf., rein weiß              |  |  |
| Madame Zoutmann, gr., sehr gef., weiß, sehr leicht geröthet * † |  |  |
| Oeuille parfait, gef., roth und weiß gestreift                  |  |  |
| Pope, sehr gr., dunkelpurpur mit carmoisin                      |  |  |

Rosa centifolia; hundertblättrige oder Bauernrose.

|   |    |     |
|---|----|-----|
| Adrien de Cardoville  |    |     |
| Alain Blanchard   |    |     |
| Cristata, gr., gef., schön geb., rosa, mit fahmarteriger Blumenbede |    |     |
| Domitile Bécar, gr., gef., fein rosa, weiß gestreift                |    |     |
| La Fiancé, gef., zart fleischfarb                                   |    |     |
| Minor, klein, gef., lebhaft rosa *                                  | 12 | kr. |
| Ordinaire, gewöhnliche, gr., gef., dunkelrosa *                     | 12 | kr. |
| Pompon de Bourgogne, kleinste Damen- oder Pfingstrose *             |    |     |
| Pompon de Bourgogne à fl. blanche, ditto, weiß *                    |    |     |
| Unique blanche ( <i>unica</i> ), gef., rein weiß                    |    |     |

Rosa centifolia muscosa; Moosrose.

|   |   |    |
|---|---|----|
| A feuilles luisantes, gef., glänzend hellrosa                 | 1 | —  |
| Aixa, gef., flach, zart rosa                                  | 1 | —  |
| Alice Leroy, gr., rosa=lila                                   | — | 48 |
| Angélique Quétier, zart rosa                                  | — | 48 |
| Aristobule, halbgef., dunkelsammetroth                        | 1 | 12 |
| Baroillet, ( <i>Verdier</i> 1850), fast gef., dunkelcarmoisin | 1 | —  |
| Blanche, gef., weiß   | 1 | —  |
| Blanche unique, gef., rein weiß                               | 1 | —  |
| Carné, gef., fleischfarb                                      | 1 | —  |
| Coelina, gef., die schönste sammetartig dunkelrothe           | 1 | —  |
| Comtesse de Murinais, gr., halbgef., weiß                     | 1 | —  |
| Comtesse de Noé, schön gef., fein carmoisin                   | 1 | —  |
| Comtesse de Segur   | 1 | —  |
| Cramoisie foncé, sammetartig carmoisin                        | 1 | 12 |
| Elizabeth Rowe  | 1 | 30 |
| Etna, doppelt, feurig purpur                                  | 1 | —  |
| General Drouot (remontant), purpur, öfter blühend             | 1 | 12 |

|  | n.         | kr. |
|--|------------|-----|
| Hermann Kegel (remontant), gef., violett mit carmoisin, öfter blühend . . . . .            | 1          | 30  |
| Lane, gr., gef., schön gebaut, feurig rosa=roth, prächtig . . . . .                        | 1          | 30  |
| Lansezeur . . . . .  | 1          | —   |
| Mademoiselle Alboni, ( <i>Ferdier</i> 1850), gef., incarnatrofa . . . . .                  | 1          | 12  |
| Malvina, gr., doppelt, rosa . . . . .  | 1          | —   |
| Obscurité, neu, gr., fast gef., dunkel sammetpurpur . . . . .                              | 1          | 12  |
| Ordinaire, die gewöhnliche, sehr gefüllt, rosa . . . . .                                   | 30 kr. bis | 1   |
| Panaché pleine, gef., weiß, oft rosa gestreift . . . . .                                   | 1          | —   |
| Pompon, klein, gefüllt, rosa . . . . .   | 1          | —   |
| Pompon perpetuelle ( <i>remontant</i> ), klein, gef., dunkelrosa . . . . .                 | 1          | 30  |
| Pourpre de Luxembourg, fast gefüllt, purpur, reichblühend . . . . .                        | 1          | —   |
| Précoce, gef., lebhaft roth . . . . .  | —          | 48  |
| Ponctué, gef., dunkelrosa . . . . .  | —          | 48  |
| Princesse Adelaïde, gef. hellrosa, von kräftigem Wuchse, reichblüh. * 48 kr. bis . . . . . | 1          | —   |
| Princesse royale, gef., fleischfarb-rosa . . . . .   | 1          | —   |
| Purpurea rubra, neu, gr., fast, gef., dunkel sammetpurpur, prächtig . . . . .              | 1          | 12  |
| Rose pale, gef., fleischfarb . . . . .   | 1          | —   |
| St. Susanne, neu, sehr gef., dunkel-rosa . . . . .   | 1          | —   |
| Unique de Provence, rein weiß . . . . .  | 1          | —   |
| Zoë ( <i>mousseuse partout</i> ), fast gef., rosa, mit bemessenen Blättern . . . . .       | 1          | —   |

### Rosa gallica; die französische Rose.

|  |  |  |
|--|--|--|
| André Thouin, doppelt, purpur, marmorirt . . . . .                                       |  |  |
| Assemblage de Beaute, gr., gef., dunkelsammetpurpur . . . . .                            |  |  |
| Astreans ( <i>R.</i> ), hochcarmin, fast gef., Effektrose . . . . .                      |  |  |
| Belle africaine, fl., gef., schwärzlich sammetpurpur . . . . .                           |  |  |
| Belle Eccossaise, gef., dunkel lila=rosa, stark punkirt . . . . .                        |  |  |
| Blondine ( <i>R.</i> ), gef., zart fleischfarb . . . . .                                 |  |  |
| Camayeux, gef., violettroth, weiß gestreift . . . . .                                    |  |  |
| Comte Boula de Nanteuil, gr., gef., dunkelpurpur=carmoisin . . . . .                     |  |  |
| Copiosa ( <i>R.</i> ), sehr gef., dunkelrosa . . . . .                                   |  |  |
| Daguessean, gr., gef., schön gebaut, lebhaft purpurroth . . . . .                        |  |  |
| Diogenes ( <i>R.</i> ), sehr gr., sehr gef., dunkelrosa . . . . .                        |  |  |
| Duc de Treviso, gef., purpurroth . . . . .   |  |  |
| Gutenberg, gr., sehr gef., zart incarnat-rosa . . . . .                                  |  |  |
| Justus Liebig ( <i>R.</i> ), sehr gef., rosacarmin . . . . .                             |  |  |
| Kohlenbrenner ( <i>R.</i> ), fast gef., schwarzbraun schattirt . . . . .                 |  |  |
| L'Amethyste, gef., purpur mit dunkelviolet . . . . .                                     |  |  |
| Louis Philipp, gef., punkelpurpur . . . . .  |  |  |
| Lucille Duplessis, gef., dunkelrosa, punkirt . . . . .                                   |  |  |
| Mecène, gef., weiß, mit rosa . . . . .   |  |  |
| Ohl, gr., gef., purpur mit dunkelcarmoisin . . . . .                                     |  |  |
| Ocillet flammand, gef., weiß mit dunkelrosa gestreift . . . . .                          |  |  |
| Panaché pleine, gef., violett mit weiß gestreift . . . . .                               |  |  |
| Pourpre strié blanc, gef., purpur, mit feinen hellen Streifen . . . . .                  |  |  |
| Salomon Heine ( <i>R.</i> ), sehr gef., sammetartig, dunkelpurpur mit carmin . . . . .   |  |  |
| Schirmacker, gr., gef., dunkelviolet . . . . .   |  |  |
| Silberband ( <i>R.</i> ), gef., schön gebaut, lebhaft zart fleischfarb . . . . .         |  |  |
| Schneeflocke ( <i>R.</i> ), gef., rein weiß . . . . .                                    |  |  |
| Sorgenfrei ( <i>R.</i> ), gef., ranunkelförmig, rosa, fein punkirt . . . . .             |  |  |
| Tricolor, ( <i>belle Alliance</i> ), halbgef., klein, carmoisin, rosa und weiß . . . . . |  |  |
| Tricolor de Flandres, weiß mit rosa, violett gestreift . . . . .                         |  |  |
| Tricolor de Wazemmes, gef., violett, weiß gestreift . . . . .                            |  |  |
| Virginie Zeller, dunkelsammetpurpur . . . . .  |  |  |

Sämmtlich à 36 bis 48 Kr.

### Rosa provincialis; die Gartenrose.

|  |   |    |
|--|---|----|
| Boule de neige, gef., rein weiß . . . . .                            |   |    |
| Coerulescens marmorea, gef., bläulich=roth, weiß marmorirt . . . . . | 1 | 30 |
| Emmerance, sehr gef., gelblich weiß . . . . .                        |   |    |
| Néron, gef., carmoisinviolett, roth punkirt . . . . .                |   |    |



|   |         |
|---|---------|
| Pauline Garcia, gef., gelblich weiß . . . . .         | fl. kr. |
| Princesse Clementine, gr. gef., rein weiß . . . . .   |         |
| Turenne, gr., gef., roth und weiß marmorirt . . . . . | 1 —     |

**Rosa hybrida; die Bastard- oder Hybrid-Rose.**

|   |  |  |
|---|--|--|
| A fleurs blanches, gefüllt, rein weiß . . . . .                   |  |  |
| Belle de Crecy, sehr schön, schwärzlich sammetpurpur              |  |  |
| Callirhoe, neu . . . . .  |  |  |
| Calycanthus (R.), gef., purperviolett, feurig schattirt           |  |  |
| Charles Duval, sehr gr., gef., glänzend roth, schön gebaut        |  |  |
| Chenedolé, gr., gef., feurig firschröth                           |  |  |
| Coupe d'Hébé, gr., gef., prächtig gebaut, lebhaft rosa            |  |  |
| Deuil de Maréchal Mortier, gef., sammetpurpur, mit hellem Centrum |  |  |
| Docteur Billard, gef., hochroth, sehr lebhaft . . . . .           |  |  |
| Frederic II. sehr gr., fast gef., dunkel purpur-violett . . . . . |  |  |
| General Allard, gr., gef., rosa-carmin . . . . .                  |  |  |
| La Dauphine, zart rosa, vielblumig . . . . .                      |  |  |
| Lady Stuart, gr., gef., prächtig fleischfarb-weiß                 |  |  |
| Lamarque, gr., gef., schwarz-purpur . . . . .                     |  |  |
| L'attrayante, gef., fleischfarb-naufin . . . . .                  |  |  |
| Madame Plantier, gef., rein weiß . . . . .                        |  |  |
| Madame Poncey, gr., gef., dunkelpurpur-violett . . . . .          |  |  |
| Madame Rameau, grz. gef., schwärzlich sammetpurpur                |  |  |
| Miralba, gef., schön gebaut, dunkelviolett, schattirt . . . . .   |  |  |
| Madeleine, sehr gef., weiß-fleischfarb . . . . .                  |  |  |
| Malton, fast gef., lebhaft carmin . . . . .                       |  |  |
| Vandael, gr., schön gebaut, sehr dunkel . . . . .                 |  |  |
| Yolande Fontaine, gef., dunkelviolett . . . . .                   |  |  |

Sämmtlich 36 bis 48 kr.

**Rosa capreolata und rubifolia; laufende Zeldrose, Ayrshire-Rose.**

(Mit laufenden Zweigen und Blüthen in großen Büscheln; für Lauben, Spaliere, Mauern, und Pyramiden geeignet.)

|   |            |      |
|---|------------|------|
| Baltimore Belle, milchweiß, sehr gefüllt, schön gebaut, nach Thee duftend, ohne Bedeckung den Winter ausdauernd, * † . . . . .          | 36 kr. bis | 1 —  |
| Beauty of the prairies, sehr gef. schalenförmig, lebhaft dunkelrosa mit hellen Mittelfreisen, ohne Bedeckung ausdauernd, * † 36 kr. bis |            | 1 —  |
| De la Grifferai, gr., gef., purpur-carmin, sehr schäpbar * † . . . . .  | 36 kr. bis | 1 —  |
| Ruga, fast gef., nach Thee duftend, * . . . . .   |            | 30 — |
| Comtesse de Lieven, weiß, halbgefüllt . . . . .   |            |      |
| Rose Angel, weiß, halbgefüllt . . . . .   |            |      |
| Perpetual, * . . . . .  |            |      |
| A fleurs doubles, * . . . . .   |            |      |
| Alice Grey, * . . . . .   |            |      |
| Dundee Rambler, * weiß fleischf., halbgef., reichbl.  |            |      |
| Myrthe-scented, * weiß fleischf., fast gefüllt . . . . .  |            |      |
| Splendens, * . . . . .  |            |      |
| Anna Marie, incarnat-rosa, sehr gef., schön . . . . .   |            |      |
| Perpetual pink, incarnat-rosa, sehr gef., klein, lieblich   |            |      |
| President . . . . .   |            |      |
| Ranunculiflora, silberweiß und incarnat, gef., sehr schön   |            |      |
| Superba . . . . .   |            |      |
| Virginian Lass . . . . .  |            |      |
| Caradori Allan, dunkelroth, doppelt . . . . .   |            |      |
| Linean Hill Beauty . . . . .  |            |      |
| Pride of Washington, fein lilä-rosa, gef., . . . . .  |            |      |
| Queen of de prairies, wie beauty of the prairies . . . . .  |            |      |

Sämmtlich 36 bis 48 kr.

|  |   |     |            |
|--|---|-----|------------|
| Triumphans, dunkelroth und fleischf., gef., sehr schön               |   | fl. | kr.        |
| Sempervirens felicité perpetué, sehr gef., rein weiß, büschelblüthig |   | 36  | bis 48 kr. |
| " Rose de Laffay.  |   |     |            |
| " Adelaïde d'Orleans   |   |     |            |
| " Madame Plantier  | } bedürfen des Schutzes gegen starke Win- |     |            |
| " Princesse Marie  |   |     |            |
| " Prinzeſſe Mathile  |   |     | terfalte.  |
| Manetti, als Unterlage für Theerosen sehr empfohlen.                 |   |     |            |

### Rosa multiflora; Vielblumigte oder Italienische Rose.

|                                     |            |   |    |
|-------------------------------------|------------|---|----|
| Die Gewöhnliche, hellroſa, *        | 30 kr. bis | — | 48 |
| Graulhié, gef., weiß, sehr schön, * | 30 " "     | — | 48 |

### Rosa Banksia; Banks's Rose.

(Mit laufenden Zweigen und sehr kleinen Blüthen in reichen Büscheln; guten Schutz gegen Kälte bedürftend.)

|  |  |   |    |
|--|--|---|----|
| Alba plena, klein gef., wohlriechend, *        |  | — | 24 |
| Lutea plena, klein gef., hochgelb, *           |  | — | 24 |
| Nouvelle de la Chine                           |  | — | 48 |
| Fortuneana, gr., weiß, gef., neu aus China     |  | 1 | —  |
| Fortunes yellow rose, gr., gelb, neu aus China |  | 1 | —  |

### Rosa microphylla und R. bracteata; die kleinblättrige und deckblättrige Rose.

|   |  |   |    |
|---|--|---|----|
| Microphylla, die gewöhnliche, gr., sehr gef., hellpurpur. |  | — | 48 |
| Bracteata Marie Leonide, gr., fast gef., weiß             |  | — | 48 |

### Rosa indica Thea; die Indische immerblühende Thee-Rose.

Alle hierher gehörigen Lapp-Rosen ertragen zwar unsere härteren Winter nicht ohne Schutz; allein es ist bekannt, wie sehr leicht man sich davon im freien Grunde eine dauernde und üppige Blüthe verschaffen kann, sobald man die Pflanzen vor Winter jedesmal sorgfältig ausgräbt und an irgend einen geschützten Ort einschlägt. Im März werden sie wieder wie vorher gepflanzt und leiden dadurch weder empfindliche Unterbrechung im Wachsthum, noch im Blühen.

Die Preise für nachverzeichnete R. Thea, semperflorens, Lawranceana, Noisettiana und Bourbonica verstehen sich für wurzelächte Lapppflanzen. Veredelte Stämmchen kommen je nach Sorte und Stärke pr. Stück 48 kr. bis fl. 1. 12 kr. —

|  |  |   |    |
|--|--|---|----|
| Agathe, sehr gef., lebhaft blaßroſa                    |  | — | 36 |
| Anisette (Guillot), gef., lilä, mit anisett-Geruch     |  | 1 | —  |
| Antherose, groß, gef., weiß-gelblich, vorzüglich †     |  | — | 36 |
| Belle Marguerite, lilä-roſa                            |  | — | 48 |
| Bougère, sehr gr., gef., hellroſa, eine der besten †   |  | — | 24 |
| Buret, gr., gef., roth                                 |  | — | 36 |
| Canary (Guillot), hochgelb, kräftig und reichblühend   |  | 1 | —  |
| Carné, fleischfarb                                     |  | — | 36 |
| Charles Raybaud, gr., gef., zart roſa                  |  | — | 48 |
| Clara Silvain, gef., rein weiß                         |  | — | 24 |
| Comte de Paris, sehr gr., gef., weiß-fleischfarb       |  | — | 48 |
| Devoniensis, gr., sehr gef., gelblich weiß, prächtig † |  | — | 36 |



|  | n. | kr. |
|--|----|-----|
| Diamantina . . . . .   | —  | 36  |
| Elise Mercœur, gef., dunkelrosa vorzüglich † . . . . .   | —  | 30  |
| Elise Sauvage, gef., gelblich . . . . .  | —  | 36  |
| Eugenie Desgaches, gr., gef. licht=rosa . . . . .  | —  | 48  |
| Fanny Duval, gr., gef., weiß . . . . .   | —  | 36  |
| Gigantesque, sehr gr., gef., fleischfarb . . . . .   | —  | 30  |
| Gloire d'Isly . . . . .  | —  | 36  |
| Hamon, fleischfarb . . . . .   | —  | 36  |
| Isidor d'Angers, fleischfarb=weiß . . . . .  | —  | 36  |
| Jules Desmontes, gef., hellrosa . . . . .  | —  | 36  |
| Le Pactole, gef., lebhaft gelb . . . . .   | —  | 36  |
| L'hétéroclite, gr., gef., lebhaft roth, fräftig . . . . .  | —  | 36  |
| Madame Bravy, gef., rein weiß . . . . .  | —  | 36  |
| Madame Le Hardelay ( <i>Oger</i> ), gr., sehr gef., schwefelgelb, fräftig . . . . .  | 2  | —   |
| Madame Roussel, gef. fleischfarb . . . . .   | —  | 36  |
| Madame Jacqueminot, gr., gef., gelb=weiß † . . . . .   | —  | 36  |
| Madame Sylvestre, gr., gef., weiß=gelb . . . . .   | 1  | —   |
| Maréchal Bugeaud, gr., gef., rosa schattirt † . . . . .  | —  | 36  |
| Mélanie Willermoz, ( <i>Lacharme</i> ), † sehr gr., reich gef., weiß, leicht geröthet, starkwüchsig, ausgezeichnet . . . . . | 1  | —   |
| Miranda . . . . .  | —  | 48  |
| Nisida, gef., blaßrothgelb, oder aurorafarbig . . . . .  | —  | 36  |
| Niphetos, gr., rein weiß . . . . .   | —  | 36  |
| Olympe, gr., sehr gef., roth . . . . .   | —  | 36  |
| Pellonia, gr., sehr gef., fleischfarb . . . . .  | —  | 36  |
| Pharaon, gr., gef., hellrosa . . . . .   | —  | 36  |
| Prince Esterhazy, gr., fast gef., schön rosa . . . . .   | —  | 36  |
| Reine des Belges, gr., sehr gef., rein weiß . . . . .  | —  | 48  |
| Safrano, fast gef., glänzend gelb † . . . . .  | —  | 36  |
| Souvenir d'un amie oder Queen Victoria, gr., gef., schön rosa . . . . .  | 1  | —   |
| Surpasse triomphe de Luxemburg, gr., gef., gelb, sehr schön . . . . .  | —  | 48  |
| Triomphe de Luxembourg, sehr gr., gef., roth mit aurora † . . . . .  | —  | 36  |
| Turgot, gef., hell=carmin † . . . . .  | —  | 48  |
| Vicomtesse de Cazes, gef., gelb, schattirt ausgezeichnet schön † . . . . .   | 1  | —   |
| Walter Scott, gr., halbgef., lebhaft roth . . . . .  | —  | 36  |
| Wilhelm II., gr., fleischfarb . . . . .  | —  | 48  |

**Rosa semperflorens (*R. bengalensis*, *chinensis*), die immerblühende bengalische Rose.**

|   |            |   |    |
|---|------------|---|----|
| A cinq couleurs, meistens einfarbig weiß, zuweilen sehr schön gebändert, starkwüchsig . . . . . | 30 kr. bis | 1 | —  |
| Anemoniflora ( <i>de la Chine</i> ), ll., weiß, lang petaligt, sehr eigenthümlich . . . . .     |            | 1 | —  |
| Archiduc Charles, gr., gef., rosa=carmoisin . . . . .   | 24 kr. bis | — | 48 |
| Beau Carmin du Luxembourg, gef., dunkel sammetpurpur . . . . .                                  |            | — | 24 |
| Cramoisie superbe, gef., lebhaft carmoisin . . . . .  |            | — | 30 |
| Fabier, halbgef., blendend roth, fürs freie Land zu Gießgruppen wohl geeignet . . . . .         |            | — | 24 |
| General Lawoestine, gef., lebhaft dunkelroth . . . . .  |            | — | 24 |
| La Victorieuse, gr., gef., weiß . . . . .   |            | — | 30 |
| Louis Philipp, gef., lebhaft carmoisin . . . . .  |            | — | 24 |
| Madame Breon, gr., gef., fein rosa † . . . . .  |            | — | 48 |
| Marjolin, gr., gef., lebhaft dunkelroth . . . . .   |            | — | 24 |
| Prince Charles du Luxembourg, gef., carminroth . . . . .  |            | — | 24 |
| Reine blanche, gef., rein weiß . . . . .  |            | — | 24 |
| Triomphe de Gand, † gr., gef., roth . . . . .   |            | — | 48 |

**Rosa Beng: Lawrancia; kleinste immerblühende Rose.**

|   |   |    |
|---|---|----|
| Pompon, die gewöhnliche, rosa . . . . . | — | 18 |
|---|---|----|

|   |            |   |    |
|---|------------|---|----|
| Atropurpurea, edel Gloire, sehr klein, gef., dunkelpurpur . . . . . | 24 kr. bis | — | 48 |
| La Desirée, klein, gef., rosa, starkwüchsig . . . . .               | 24 kr. bis | — | 36 |
| Pompon Bijou, klein, fast gef., hellrosa . . . . .                  | 24 kr. bis | — | 36 |

### Rosa ind: Noissettiana; die immerblühende Noissette-Rose.

(Starkwüchsig, in großen Büscheln blühend, und sehr geeignet für freie Land-Gruppen.)

|   |            |   |    |
|---|------------|---|----|
| Aimée Vibert, sehr gef., rein weiß, sehr schäubar . . . . .   | 24 kr. bis | — | 36 |
| Caroline Marniesse, (1848), gef., gewölbt, weiß, leicht geröthet, äußerst blüthenreich und ausdauernd † . . . . . | 36 kr. bis | 1 | —  |
| Chromatella, gr., gef., dunkelgelb, mit langen Zweigen † . . . . .  | 30 kr. bis | — | 48 |
| Comtesse de Tolosan, † sehr gr., fast gef., weiß, leicht geröthet † . . . . .                                     |            | — | 48 |
| Desprez, gelblich-rosa . . . . .  |            | — | 48 |
| Eugenie Dubourg . . . . .   |            | — | 48 |
| Felleberg, gr., gef., lebhaft carmin-roth, ausgezeichnet für's freie Land . . . . .                               |            | — | 24 |
| Lamarque, gr., sehr gef., gelblich † . . . . .  |            | — | 36 |
| Hortense Aimé, hellroth, sehr reichblühend . . . . .  |            | — | 48 |
| Jacques Amgöt, lila-rosa . . . . .  |            | — | 48 |
| Madame Deslongchamps (Lévêque), fleischfarb-weiß . . . . .  |            | 1 | —  |
| Miss Glegg, fast gef., weiß-rosa . . . . .  |            | — | 36 |
| Lais, neu, gef., weiß † . . . . .   | 48 kr. bis | 1 | —  |
| Orange incarnat, neu, von China † . . . . .   |            | 1 | —  |
| Ophir, gef., schön geb., knosprig-aurora-gelb, ganz neue Farbe † . . . . .  | 36 kr. bis | 1 | —  |
| Phaloe, gr., gef., weißlich-aurora, neu . . . . .   |            | — | 48 |
| Solfatare, gr., gef., entschieden schwefelgelb † . . . . .  | 36 kr. bis | 1 | —  |
| Triomphe de la Duchère, gr., gef., fleischfarb, neu . . . . .   | 36 " "     | 1 | —  |
| Vicomtesse d'Avesne (1848), gef., rosa, neu † . . . . .   | 36 " "     | 1 | —  |

### Rosa Bourbonica (Iste Bourbon); die immerblühende Bourbon-Rose.

(Sämmtlich stark duftend, wohlgebaut, starkwüchsig, schön belaubt und sehr schäubar für das freie Land, für die Topfkultur und Blumentreiberei.)

|  |            |   |    |
|--|------------|---|----|
| Acidalie, gef., fast weiß, † . . . . .                                     |            | — | 48 |
| Adelaïde Bougère, gef., sammetartig schwarz-purpur . . . . .               |            | 1 | 30 |
| Apolline, gr., gef., zart rosa, schattirt † . . . . .                      | 48 kr. bis | 1 | —  |
| Augusta, (R.), gef., glänzend rosa . . . . .                               |            | — | 48 |
| Aurore du Guide, gef., dunkelroth, violett schattirt † . . . . .           |            | — | 48 |
| Brisague, lebhaft carmin . . . . .   |            | — | 48 |
| Camille Decker, dunkel purpur . . . . .                                    |            | — | 48 |
| Caroline d'Erard, gef., fleischfarb . . . . .                              |            | 1 | —  |
| Cardinal Feretti, gef., dunkelpurpur, starkwüchsig . . . . .               |            | 1 | —  |
| Cesarine Sonchet, gef., zart rosa, mit carmin schattirt † . . . . .        | 48 kr. bis | 1 | —  |
| Comme de Seine et Marne, gef., dunkel violett-roth † . . . . .             |            | — | 48 |
| De Tourville, gef., dunkel-purpur-violett † . . . . .                      |            | — | 48 |
| Docteur Blandin, sehr gef., dunkelrosa † . . . . .                         | 48 kr. bis | 1 | —  |
| Docteur Harduin, sehr gef., fleischfarb-rosa † . . . . .                   | 48 kr. bis | 1 | —  |
| Dr. Leprestre (Oger), gr., gef., lebhaft purpurroth, sammetartig . . . . . |            | 1 | 30 |
| Dr. Roques, gef., violettroth . . . . .                                    |            | — | 48 |
| Dornes, hochroth, sammetartig . . . . .                                    |            | 1 | —  |
| Duc de Chartres, gr., gef., dunkelrosa † . . . . .                         |            | — | 48 |
| Duchesse de Normandie, gef., rosapurpur † . . . . .                        |            | — | 48 |
| Dumont de Courset, sehr gef., glänzend carmin . . . . .                    |            | — | 48 |
| Edouard Desfossé, gef., glänzend rosa, sehr schäubar † . . . . .           | 30 kr. bis | — | 48 |
| Fritz de Cussy, gr., gef., lebhaft firschröth . . . . .                    |            | — | 48 |
| Faustine, blaß fleischfarb . . . . .                                       |            | — | 48 |



|  | fl.        | kr. |
|--|------------|-----|
| General Oudinot, gef., dunkel-purpur-carmoisin . . . . .                                       | 1          | —   |
| General Penker ( <i>Sester</i> ), Seitenstück zu Paul Joseph, vortreflich . . . . .            | 1          | —   |
| General Schaeffer, lebhaft rosa . . . . .  | —          | 48  |
| Georges Cuvier ( <i>Beauté de Versailles</i> ), gef., firſchroth und rosa † . . . . .          | —          | 48  |
| Georges Robin, dunkel-violett . . . . .  | —          | 48  |
| Gloire de Paris, gef., lebhaft dunkel-carmoisin † . . . . .                                    | —          | 48  |
| Guillaume le Conquérant, gr., gef. glänzend rosa . . . . .                                     | —          | 48  |
| Henry Lecoq, gr., gef., roth . . . . .   | —          | 48  |
| Hennequin, gef., glänzend purpur † . . . . .   | —          | 24  |
| Imperatrice Josephine, gef., zart fleischfarb, † . . . . .                                     | —          | 36  |
| Julie de Fontenelle, gef., schön violett-purpur † . . . . .                                    | —          | 48  |
| Jupiter, gef., dunkelviolettroth † . . . . .   | —          | 48  |
| Jury, lebhaft roth und sammet-carmoisin . . . . .  | 1          | 12  |
| La gracieuse, gr., gef., sehr lebhaft rosa † . . . . .   | —          | 48  |
| Lady Canning, gef., lebhaft rosa, veränderlich, schön † . . . . .                              | —          | 36  |
| Lady Stanley, ( <i>Dubos</i> ), gr., gef., prächtig fleischfarb weiß, † . . . . .              | 1          | —   |
| Le Camé, gr., gef., zart rosa, mit dunklerem Herz † . . . . .                                  | 1          | —   |
| Le Grenadier, klein, sehr gef., lebhaft carmoisin, veränderlich, sehr schäbbar † . . . . .     | —          | 48  |
| Leon Leclerc . . . . .   | —          | 36  |
| Léon Oursel, gr., gef., feurig roth † . . . . .  | 1          | —   |
| Lewson Gower, sehr groß, sehr gef., dunkelrosa † . . . . .                                     | 48 kr. bis | 1   |
| Louise Odier ( <i>Margottin</i> ), gr., ganz centifolienartig . . . . .                        | 1          | —   |
| Madame Angelina, gef., weiß mit gelblichrothem Anflug, sehr schön . . . . .                    | 48 kr. bis | 1   |
| Madame Callot, ( <i>Miellez</i> ), sehr gr., schön gebaut, zart rosa, starkwüchsig † . . . . . | 1          | —   |
| Madame Cousin ( <i>Margottin</i> ) zart rosa . . . . .   | —          | 48  |
| Madame Desprez, gef., lilas-rosa † * . . . . .   | —          | 36  |
| Madame Desgaches, gef., glänzend rosa † . . . . .  | 1          | —   |
| Madame Hamon, gef., violettroth † . . . . .  | 1          | —   |
| Madame Hobetz, gef., fein rosa † . . . . .   | —          | 36  |
| Madame Lacharme, fleischfarb . . . . .   | —          | 48  |
| Madame Nerard, gef., zart fleischfarb, sehr schön † . . . . .                                  | 36 kr. bis | —   |
| Marie Desossé, gr., gef., zart fleischfarb . . . . .   | 1          | 12  |
| Marquis d'Ossey, gef., glänzend dunkel-violettroth † . . . . .                                 | 48 kr. bis | 1   |
| Marrast, sehr gef., glänzend rosa . . . . .  | 1          | —   |
| Miroir de perfection, gef., violett-rosa . . . . .   | —          | 48  |
| Missr Bosanquet, fast gef., kugelficht, zart fleischfarb † . . . . .                           | 36 kr. bis | —   |
| Nelly, leicht geröstel weiß . . . . .  | 1          | —   |
| Nicolas Rollin, gef., lebhaft carmin † . . . . .   | 48 kr. bis | 1   |
| Ninon de l'Enclos, gef., dunkelrosa . . . . .  | —          | 36  |
| Oscar Leclerc, gef., lebhaft dunkel-carmoisin † . . . . .                                      | 1          | —   |
| Parquin, gef., violettroth † . . . . .   | —          | 48  |
| Parfait, gef., purpurroth † . . . . .  | —          | 48  |
| Paul Joseph, gef., unübertrefflich reich, dunkel carmoisin-purpur . . . . .                    | 48 kr. bis | 1   |
| Pierre de Saint-Cyr, gef., glänzend rosa, starkwüchsig † . . . . .                             | 30 kr. bis | —   |
| Pigeron ( <i>Berger</i> ), sehr gr., und gef., dunkelpurpurroth . . . . .                      | 1          | —   |
| Pourpre Faisit, gef., dunkelpurpur . . . . .   | —          | 48  |
| Première des Charpennes, rosa, fleischfarb, weiß gerändert † . . . . .                         | 48 kr. bis | 1   |
| Prince de Croi, gef., schön rosa † . . . . .   | 48 kr. bis | 1   |
| Prinzesse Clementine, gef., violettroth . . . . .  | —          | 36  |
| Proserpine, gef., lebhaft gesättigt carmoisin † . . . . .                                      | —          | 48  |
| Reine des Isles Bourbons, gef., schön zart fleischfarb † . . . . .                             | —          | 36  |
| Reine des Vierges, gr., sehr gef., fleischfarb-rosa † . . . . .                                | —          | 48  |
| Scipion Cochet, ( <i>Cochet</i> ), fast gef., feurig purpur carmoisin . . . . .                | 1          | —   |
| Sepintarus, sehr gef., kugelficht, lebhaft fleischfarb † . . . . .                             | —          | 48  |
| Souchet, gef., reich carmin-purpur † . . . . .   | —          | 48  |
| Souvenir de l'Arquebuse, Preisblume . . . . .  | 1          | 12  |
| Souvenir de Dumont d'Urville, gef., kugelficht, firſchroth . . . . .                           | —          | 48  |
| Souvenir de Malmaison, sehr groß, sehr gefüllt, atlasweiß, unübertrefflich † . . . . .         | 36 kr. bis | 1   |
| Souvenir du 4 Mai, gr., schön gebaut, carmin mit gelblichem Schimmer . . . . .                 | 1          | —   |
| Souvenir d'un frère, ( <i>Oger</i> ), schöner als Commiçe de S. et Marne . . . . .             | 1          | —   |
| Surpasse Commiçe de Seine et Marne, hochroth oder sammetrubin . . . . .                        | 1          | 30  |

|   |         |
|---|---------|
| Triomphe d'Oulins, sehr gef., dunkel-purpur-violett † . . . . . | fl. 1 — |
| Vierge de Lemnos, Aehnlichkeit mit Madame Nerard . . . . .      | 1 —     |
| Vorace, gef., lebhaft carmoisin-roth † . . . . .                | 1 12    |
| Vulcanie, gef., dunkelroth † . . . . .                          | — 36    |

In grösseren Parthieen können geliefert werden:

Landrosen zu Gartenanlagen, gewöhnliche ohne Namen, pr. 100 Stück  
fl. 10 - 15. fl. 25.

Sortimentsrosen nach unserer Wahl in den schönsten Sorten, pr. 100 Stück  
fl. 40 bis fl. 60.

Hochstämmige Rosen nach unserer Wahl in den schönsten Sorten  
der Abtheilungen: bifera, centifolia, muscosa, gallica, hybrida,  
hybrida bifera, und Bourbons sämmtlich in 5 bis 5 Fuss hohen  
Kronbäumchen mit Namen pr. 100 Stück fl. 60 bis 80.

## Staudengewächse.

A sind Alpenpflanzen oder verlangen ähnliche Pflege und eignen sich meistens zur Bepflanzung  
von Felsenparthieen.

Die mit \* bedürfen der frostfreien Ueberwinterung.

|  | fl. | kr. |  | fl. | kr. |
|--|-----|-----|--|-----|-----|
| Acanthus niger . . . . .                   | —   | 12  | Antirrhinum majus var. . . . .               | —   | 6   |
| carduifolius . . . . .                     | —   | 18  | Brightii . . . . .                           | —   | 12  |
| Achillea millefolia fl. rubro . . . . .    | —   | 6   | andere neue hochrothe und ge-                |     |     |
| Aconitum bicolor . . . . .                 | —   | 12  | streifte Sorten pr. Stück 18 kr.             | —   | 24  |
| sinense . . . . .                          | —   | 12  | assarinum, schöne Ampelpflanze . .           | —   | 30  |
| Adonis vernalis . . . . .                  | —   | 12  | Anthericum liliago . . . . .                 | —   | 12  |
| Althea rosea, neue gefüllte engl., in meh- |     |     | lilium . . . . .                             | —   | 12  |
| reren Prachtsorten à fl. 1. 30 kr.         |     |     | Apoeynum androsaemifolium . . . .            | —   | 30  |
| Aegopodium podagraria fol. var. . .        | —   | 12  | Aquilegia formosa . . . . .                  | —   | 12  |
| Allium fragrans . . . . .                  | —   | 12  | arctica . . . . .                            | —   | 130 |
| azureum . . . . .                          | —   | 24  | Aralia edulis, träftige Blattpflanze . .     | —   | 30  |
| roseum . . . . .                           | —   | 24  | Arabis cœrulea A . . . . .                   | —   | 18  |
| Amaryllis formosissima * . . . . .         | —   | 12  | alpina A . . . . .                           | —   | 12  |
| Amsonia salicifolia . . . . .              | —   | 12  | Arenaria balearica A . . . . .               | —   | 18  |
| Anchusa bifida . . . . .                   | —   | 24  | cœspitosa A, schöne schnellwüchf. Moosgef. . | —   | 12  |
| Anemone hepatica, fl. cœruleo A . .        | —   | 12  | rubra A . . . . .                            | —   | 12  |
| fl. albo . . . . .                         | —   | 18  | Armeria alpina A . . . . .                   | —   | 18  |
| rubro . . . . .                            | —   | 18  | Artemisia nana A . . . . .                   | —   | 12  |
| fl. rubr. pleno . . . . .                  | —   | 18  | spicata A . . . . .                          | —   | 12  |
| 12 Stück                                   | 3   | —   | Arundo donax . . . . .                       | —   | 24  |
| fl. cœruleo pleno . . . . .                | —   | 30  | fol. var. . . . .                            | —   | 130 |
| pleno major . . . . .                      | —   | 48  | Asarum europæum A . . . . .                  | —   | 12  |
| nemorosa fl. pleno . . . . .               | —   | 12  | Asclepias incarnata, schön . . . . .         | —   | 12  |
| pulsatilla . . . . .                       | —   | 12  | syriaca . . . . .                            | —   | 6   |
| japonica . . . . . 12 kr. bis              | —   | 24  | tuberosa, prächtig für Haide-Grde . .        | —   | 24  |



|  | n. | kr. |   | n. | kr. |
|--|----|-----|---|----|-----|
| Asphodelus luteus . . . . .                      | 24 |     | Cerastium tomentosum, Giesefahna . . . . .  | 24 |     |
| luteus fl. pleno . . . . .                       | 36 |     | pr. 12 Stück . . . . .                      | 24 |     |
| Aster bicolor fl. . . . .                        | 18 |     | Convallaria majalis, Maiblümchen . . . . .  | 6  |     |
| grandiflorus . . . . .                           | 18 |     | fl. rubro, ditto, rosenfarben . . . . .     | 12 |     |
| Reevesii, schön . . . . .                        | 24 |     | fl. pleno ditto, gefülltes . . . . .        | 12 |     |
| roseus, ( <i>atropurpureus</i> ) . . . . .       | 18 |     | fol. var. ditto, buntbl. . . . .            | 12 |     |
| Astilbe rivularis, eine Epiphanieartige groß-    | 36 |     | pr. 12 Stück . . . . .                      | 1  |     |
| blättrige Pflanze von kräftigem Wuchse.          | 36 |     | Convolvulus altheoides * . . . . .          | 24 |     |
| Baptisia caerulea . . . . .                      | 24 |     | Corydalis spectabilis . . . . .             | 18 |     |
| Barbarea vulgaris fol. var. . . . .              | —  |     | eximia . . . . .                            | 24 |     |
| Bellis perennis, . . . . .                       | 6  |     | formosa . . . . .                           | 24 |     |
| ditto 12 Stück in 12 Sorten . . . . .            | 36 |     | Cyclamen europæum fl. . . . .               | 12 |     |
| Highlander, großblühendes neues                  | —  |     | ditto pr. 12 Stück . . . . .                | 2  |     |
| Maßliedchen, mit Blumen von der Größe            | —  |     | Cynoglossum longiflorum . . . . .           | 18 |     |
| eines Zpalers, einer Kolorade gleichend.         | 24 |     | Delphinium Barlowi fl. pleno . . . . .      | 24 |     |
| alba grandiflora . . . . .                       | 12 |     | elatum fl. pleno . . . . .                  | 24 |     |
| Queen Victoria . . . . .                         | 18 |     | perenne . . . . .                           | 12 |     |
| Bocconia cordata . . . . .                       | 30 |     | grandiflorum . . . . .                      | 12 |     |
| Caltha palustris fl. pl., herf. Frühlingsfchmuck | 15 |     | Dianthus alpinus fl. . . . .                | 12 |     |
| pr. 12 Stück . . . . .                           | 24 |     | carioph. Remontants, neue im Winter         | —  |     |
| monstrosa plena . . . . .                        | 24 |     | ter blühende, 9 Sorten, pr. Stck. . . . .   | 18 |     |
| Calystegia pubescens, neue ausdauernde           | —  |     | glacialis fl. . . . .                       | 18 |     |
| Winde aus China mit rosenähnlichen               | —  |     | hybridus fl. pl. . . . .                    | 12 |     |
| gefüllten Blumen in dichten Guirlanden.          | 12 |     | Dictamnus fraxinella . . . . .              | 12 |     |
| ditto pr. 12 Stück . . . . .                     | 2  |     | tauricus . . . . .                          | 2  |     |
| ditto pr. 100 Stück . . . . .                    | 12 |     | Dielytra spectabilis, wunderfchön . . . . . | —  |     |
| Campanula grandiflora ( <i>Wahlenbergia</i> ),   | —  |     | 30 kr. bis . . . . .                        | 1  |     |
| albo pleno . . . . .                             | 24 |     | Digitalis hybrida . . . . .                 | 24 |     |
| nobilis, neu, sehr anfehlend . . . . .           | 36 |     | Dodecatheon Meadea . . . . .                | 18 |     |
| alba . . . . .                                   | 24 |     | pr. 12 Stück . . . . .                      | 3  |     |
| garganica, schöne Ampelpflanze . . . . .         | 48 |     | albicans . . . . .                          | 36 |     |
| grandis . . . . .                                | 12 |     | Dracocephalum Louisianum . . . . .          | 12 |     |
| alba . . . . .                                   | 18 |     | speciosum . . . . .                         | 18 |     |
| glomerata fl. pleno fl. . . . .                  | 24 |     | superbum . . . . .                          | 18 |     |
| muralis, sehr niedrig fl. . . . .                | 24 |     | Echinops ruthenicus, eine sehr schöne blau- | —  |     |
| persicifolia fl. pleno . . . . .                 | 12 |     | blühende bisserartige Pflanze, deren        | —  |     |
| urticaefolia, fl. pleno . . . . .                | 12 |     | Blumen sich auch in getrocknetem            | —  |     |
| pendula ( <i>Symphandra</i> ) . . . . .          | 18 |     | Zustande sehr lange halten . . . . .        | 24 |     |
| barbata fl. . . . .                              | 18 |     | pr. 12 Stück . . . . .                      | 4  |     |
| linifolia fl. . . . .                            | 18 |     | Epimedium macranthum, * schön . . . . .     | 24 |     |
| pusilla fl. . . . .                              | 12 |     | colchicum * . . . . .                       | 30 |     |
| alba ( <i>caespitosa</i> ) fl. . . . .           | 12 |     | pinnatum elegans * . . . . .                | 30 |     |
| speciosa . . . . .                               | 12 |     | violaceum * . . . . .                       | 30 |     |
| pyramidalis . . . . .                            | 12 |     | rubrum * . . . . .                          | 12 |     |
| rhomboidea fl. pleno fl., sehr schön,            | 12 |     | versicolor . . . . .                        | 1  |     |
| eignet sich zu Drahtsalzieren . . . . .          | 24 |     | alpinum fl. . . . .                         | 12 |     |
| Cassia marylandica . . . . .                     | 12 |     | Erigeron alpinum . . . . .                  | 24 |     |
| Chelone barbata * . . . . .                      | 18 |     | grandiflorum . . . . .                      | 24 |     |
| fl. albo * . . . . .                             | 24 |     | Eryngium alpinum . . . . .                  | —  |     |
| fl. carneo * . . . . .                           | 24 |     | bromeliaefolium . . . . .                   | —  |     |
| Chrysanthemum indicum.                           | —  |     | Fritillaria imperialis et var. . . . .      | 12 |     |
| 30 neueste kleinblumige Sorten,                  | —  |     | Fumaria capnoides . . . . .                 | 12 |     |
| Ausgabe von 1852-53 . . . . .                    | —  |     | lutea . . . . .                             | 12 |     |
| pr. Stück 15 kr. . . . .                         | —  |     | Funkia, grandiflora . . . . .               | 1  |     |
| neue großblumige ditto 15 kr. . . . .            | —  |     | andere bei Hemerocallis. . . . .            | —  |     |
| Clematis erecta et var. . . . .                  | 12 |     | Gaillardia picta . . . . .                  | 12 |     |
| integrifolia . . . . .                           | 12 |     | Galanthus nivalis . . . . .                 | 4  |     |
| major . . . . .                                  | 18 |     | Gentiana acaulis fl. . . . .                | 24 |     |
| bicolor * . . . . .                              | 1  |     | asclepiadea . . . . .                       | 24 |     |
| azurea grandiflora * . . . . .                   | 1  |     | alba . . . . .                              | 30 |     |
| tubulosa mongolica . . . . .                     | 24 |     |   |    |     |

|   | fl.                | kr. |  | fl. | kr. |
|---|--------------------|-----|--|-----|-----|
| Gentiana Gebleri . . . . .  | —                  | —   | Iris amœna . . . . .   | —   | 12  |
| pneumonanthe . . . . .  | —                  | 30  | brachycuspis . . . . .   | —   | 18  |
| verna . . . . .   | —                  | 24  | stenogyna . . . . .  | —   | 18  |
| purpurea . . . . .  | —                  | 36  | virginia . . . . .   | —   | 12  |
| Geranium pratense, fl. pleno . . . . .  | —                  | 12  | florentina alba, groß, fast weiß . . . . .   | —   | 12  |
| Gladiolus . . . . .   |                    |     | Apollon . . . . .  | —   | 18  |
| floribundus, . . . . .  | —                  | 24  | Unique . . . . .   | —   | 18  |
| Gandavensis und var. der hochwachsende,<br>feuerroth; die prächtvollen Varietäten<br>ähneln einander und werden deshalb nicht<br>mehr besonders fortsetzt . . . . . | 12 kr. bis         | 30  | Raphael, extra feine Zeichnung . . . . .   | —   | 24  |
| ditto . . . . .   | 12 Stück fl. 2 bis | 3   | Canary, sehr schön hellgelb . . . . .  | —   | 18  |
| ramosus ästiger, fein carmin-rosa . . . . .   | 1                  | —   | Anais . . . . .  | —   | 18  |
| circa 20 Varietäten . . . . .   |                    |     | Alonzo . . . . .   | —   | 18  |
| pr. Stück 36 kr. bis  | 10                 | —   | Arlequin . . . . .   | —   | 18  |
| pr. 12 Stück fl. 6 bis  | 1                  | —   | multicolor, prächtig gelblich . . . . .  | —   | 18  |
| Globularia cordifolia $\Delta$ . . . . .  | —                  | 12  | pulcherrima . . . . .  | —   | 18  |
| nudicaulis $\Delta$ . . . . .   | —                  | 12  | biflora . . . . .  | —   | 18  |
| Glossocomia clematidea * . . . . .  | —                  | 12  | furcata . . . . .  | —   | 18  |
| Glycine Apios . . . . .   | —                  | 12  | hæmatophylla, schönste dunkelblaue . . . . .   | —   | 18  |
| Gnaphalium margaritaceum . . . . .  | —                  | 12  | Bronze Stoffels . . . . .  | —   | 12  |
| Gypsophylla paniculata, sehr fein, auf<br>Rasenplätze passend . . . . .   | —                  | 12  | versicolor . . . . .   | —   | 18  |
| Helleborus abchasius fl. albo $\Delta$ . . . . .  | 1                  | —   | graminea . . . . .   | —   | 12  |
| atrorubens . . . . .  | —                  | 24  | pumila . . . . .   | —   | 6   |
| graveolens . . . . .  | —                  | 24  | albida . . . . .   | —   | —   |
| intermedius . . . . .   | —                  | 24  | intermedia . . . . .   | —   | 18  |
| laxus . . . . .   | —                  | 24  | coerulea . . . . .   | —   | 18  |
| pallidus . . . . .  | —                  | 24  | latea . . . . .  | —   | 12  |
| niger . . . . .   | —                  | 24  | flavescens . . . . .   | —   | 18  |
| purpurascens . . . . .  | —                  | 24  | gracilis . . . . .   | —   | 48  |
| Hemerocallis alba (Funkia) . . . . .  | —                  | 12  | sibirica, äufest hierlich . . . . .  | —   | 12  |
| cœrulea . . . . .   | —                  | 12  | variegata . . . . .  | —   | 12  |
| cucullata fol. var., schöne Dekorations-<br>pflanze . . . . .   | —                  | 36  | Van de Will, sehr groß, goldfarb und<br>carmoisin . . . . .                                      | —   | 18  |
| grandiflora . . . . .   | 30 kr. bis         | 1   | venusta . . . . .  | —   | 12  |
| lancifolia fol. var. . . . .  | —                  | 24  | Zebrina, goldfarb und carmoisin . . . . .  | —   | 18  |
| fl. albo . . . . .  | —                  | 36  | Jeffersonia diphylla $\Delta$ . . . . .  | —   | 48  |
| flava . . . . .   | —                  | 12  | Liatris pumila $\Delta$ . . . . .  | —   | 24  |
| fulva . . . . .   | —                  | 12  | scariosa $\Delta$ . . . . .  | —   | 24  |
| fol. var. . . . .   | —                  | 18  | Leicestera formosa . . . . .   | —   | 24  |
| fl. pleno . . . . .   | —                  | 24  | Lilium atrosanguineum . . . . . fl. 1 bis  | 2   | —   |
| rutilans . . . . .  | —                  | 24  | aurantiacum (venustum) fl. 1 bis   | 2   | —   |
| Sieboldi . . . . .  | —                  | 18  | bulbiferum . . . . .   | —   | 12  |
| alba . . . . .  | —                  | 24  | Brownii . . . . . fl. 2 bis  | 4   | —   |
| undulata, fol. var., prächtige Deko-<br>rationspflanze . . . . .  | —                  | 24  | canadense . . . . .  | 1   | 12  |
| Helianthus multiflorus, fl. pleno . . . . .   | —                  | 24  | Catesbæi . . . . .   | —   | —   |
| Helianthemum coccineum fl. pleno * $\Delta$ . . . . .   | —                  | 24  | candidum . . . . .   | —   | 18  |
| purpureo pleno . . . . .  | —                  | 24  | excelsum (peregrinum, testaceum<br>Isabellinum) hochwachsende weiß-<br>gelbe . . . . . fl. 1 bis | 2   | —   |
| luteo pleno . . . . .   | —                  | 24  | eximium (japonicum) * . . . . .  | 1   | —   |
| Hieracium lanatum? mit sehr großen Blät-<br>tern und Blumenbelden . . . . .   | —                  | 20  | lancifolium album * . . . . . fl. 1 bis  | 3   | —   |
| Hibiscus palustris * . . . . .  | —                  | 12  | punctatum * . . . . . fl. 1  | 4   | —   |
| fl. roseo * . . . . .   | —                  | 24  | speciosum (roseum ru-<br>brum) * . . . . . fl. 1 bis   | 5   | —   |
| Hieracium aurantiacum $\Delta$ . . . . .  | —                  | 6   | sanguinolentum, . . . . .  | —   | —   |
| Humulus Lupulus, Kentschie-Bopfen . . . . .   | —                  | 48  | schönste dunkle Sorte . . . . . fl. 3 bis  | 10  | —   |
| pr. 12 Stück . . . . .  | —                  | 48  | Martagon et var. . . . .   | —   | 24  |
| Indigofera Dosua . . . . .  | —                  | 24  | pomponium . . . . .  | —   | 24  |
|   |                    |     | tigrinum . . . . . 12 kr. bis  | —   | 30  |
|   |                    |     | ditto per 12 Stück fl. 2 bis   | 3   | —   |
|   |                    |     | Linaria reticulata * . . . . .   | —   | 36  |
|   |                    |     | Lathyrus latifolius . . . . .  | —   | 18  |



|  | fl. lkr. |                                      | fl. lkr. |
|--|----------|--------------------------------------|----------|
| Lobelia campanulata, *                     |          | Paeonia odorata (Lemon) . fl. 1 bis  | 2        |
| buntelfgarlach                             |          | plenissima variegata . . . 1 ..      | 3        |
| Comte de Paris * d <sup>o</sup>            |          | prolifera tricolor . . . 1 ..        | 3        |
| sanguinea * d <sup>o</sup>                 | 24       | pulcherrima modesta . . . .          | 2        |
| Agathocles * carm.                         |          | plenissima superba . fl. 1 bis       | 3        |
| Antigone * weif                            |          | speciosa . . . . . 1 ..              | 2        |
| Milleri * blau                             |          | sulphurea . . . . . 1 ..             | 3        |
| Williamsi * purpur                         |          | tricolor . . . . . 1 ..              | 3        |
| Lotus corniculatus, fl. pl. A . . .        | 24       | triomphe du Nord . . . . .           | 2        |
| Lychnis chalconica . . . . .               | 6        | tricolor flavescens . fl. 1 bis      | 3        |
| fl. albo pleno . . . . .                   | 24       | triumphans . . . . . 1 ..            | 2        |
| fl. pl. major . . . . .                    | 30       | triumphans gandavensis               | 3 30     |
| dioica fl. pleno, . . . . .                | 12       | Victoire modeste . fl. 1 bis         | 4        |
| albo pleno major . . . . .                 | 48       | Victoire tricolor . . . 1 ..         | 3        |
| viscaria fl. pl., Bachellette . . .        | 6        | 12 Sorten Paeonia chinensis          |          |
| ditto pr. 12 Stück                         | 1        | nach unserer Wahl . fl. 6 bis        | 18       |
| ditto pr. 100 Stück                        | 6        | 100 Stück in 25 Sorten               | 75       |
| Mandragora officinalis . . . . .           | —        | humilis . . . . .                    | 24       |
| Matricaria Parthenium grandiflorum .       | 12       | fl. pleno . . . . .                  | 30       |
| fistulosa fl. pl. . . . .                  | 12       | nidus avis . . . . .                 | 36       |
| Melissa grandiflora . . . . .              | 18       | hybrida . . . . .                    | 36       |
| Merandera sobulifera . . . . .             | —        | officinalis, fl. pleno . . . . .     | 24       |
| Molinia coerulea, neuer zierlicher Baugras | 12       | carnea striata . . . . .             | 24       |
| Monarda didyma * . . . . .                 | 12       | rosea plena . . . . .                | 24       |
| Mulgedium alpinum A . . . . .              | 24       | anemoneflora . . . . .               | 1        |
| Myosotis palustris . . . . .               | 4        | paradoxa fimbriata plena . . .       | 48       |
| azorica A . . . . .                        | 24       | tenuifolia fl. pl. fl. 1. 30 kr. bis | 4        |
| Nordmannia cordifolia * . . . . .          | 18       | tenuifolia insignis . . . . .        | 1 12     |
| Orobis atropurpureus . . . . .             | 18       | Wittmanniana, gelb . . fl. 2 bis     | 4        |
| vernus purpureus . . . . .                 | 24       | Papayer bracteatum . . . . .         | 12       |
| albus . . . . .                            | 24       | Penstemon gentianoides coccineus, *  | 18       |
| fl. pleno . . . . .                        | 36       | formosus * . . . . .                 | 24       |
| Oxalis elegans atrorubens * . . . .        | 24       | fl. albo * . . . . .                 | 24       |
| Paeonia chinensis odorata, weif 30 kr. bis | 1        | Bucki * . . . . .                    | 24       |
| pr. 12 Stück fl. 5 ..                      | 8        | atrocoeruleus * . . . . .            | 1        |
| edulis, rosa . . . 30 kr. ..               | 1        | grandis * . . . . .                  | 2        |
| pr. 12 Stück fl. 5 ..                      | 8        | azureus * . . . . .                  | 30       |
| fragrans, rosa . . . 30 kr. ..             | 1        | Estheri * . . . . .                  | 30       |
| pr. 12 Stück fl. 5 ..                      | 8        | belle de St. Laurent *               | 48       |
| Pottii, buntelcarm. 48 kr. ..              | 2        | variabilis * . . . . .               | 36       |
| pr. 12 Stück fl. 8 ..                      | 12       | Pellieri * . . . . .                 | 18       |
| Reevesi, hellrosa . 36 kr. ..              | 2        | purp. superb. * . . . .              | 30       |
| pr. 12 Stück fl. 6 ..                      | 12       | glaucus . . . . .                    | 24       |
| ch. anemonefl. flavescens fl. 1 ..         | 3        | latifolius . . . . .                 | 24       |
| striata . . . . . 1 ..                     | 3        | Mackayanus . . . . .                 | 24       |
| bicolor . . . . . 1 ..                     | 3        | pulchellus . . . . .                 | 24       |
| Buykii . . . . . 1 ..                      | 3        | cordifolius . . . . .                | —        |
| Comte de Paris . . . . .                   | 2        | Phlox, nachfolgend besonders ver-    |          |
| Duchesse de Nemours fl. 1 bis              | 3        | zeichnet.                            |          |
| Duchesse d'Orleans . . . . .               | 2        | Plumbago Larpentae . . . . .         | 12       |
| festiva . . . fl. 1. 30 kr. bis            | 3        | Potentilla decora fl. pleno . . .    | 12       |
| festiva maxima . . . . .                   | 7        | Demayi . . . . .                     | 24       |
| globosa . . . . . fl. 1 bis                | 3        | Bainesiana . . . . .                 | 36       |
| Hericartiana . . . . . 1 ..                | 4        | coccinea . . . . .                   | 24       |
| ligulata . . . . . 1 ..                    | 2        | Fintelmanni . . . . .                | 24       |
| lilacina superba . . . . . 1 ..            | 3        | Macnabiana . . . . .                 | 24       |
| lutea plenissima (Buyk), 1 ..              | 3        | Russeliana . . . . .                 | 18       |
| lutea variegata . . . . . 1 ..             | 3        | Smouthi . . . . .                    | 24       |
| lutescens . . . . . 1 ..                   | 3        | Tormentilla Tongii A . . . .         | 24       |
| nec plus ultra . . . . .                   | 7        | bicolor grandiflora . . . . .        | 36       |

|  | fl. | kr. |  | fl. | kr. |
|--|-----|-----|--|-----|-----|
| Primula acaulis luteo pleno . . .  | 18  | —   | Stipa pennata . . .  | 12  | —   |
| lilacino pleno . . .   | 24  | —   | Tiarella cordata <b>A</b> . . .  | 18  | —   |
| fulgens plena . . .  | 48  | —   | Thalictrum aquilegifolium . . .  | 12  | —   |
| auricula, Zäunlinge von Linder Flor-<br>blumen pr. 12 Stück                      | 3   | —   | purpureum . . .  | 12  | —   |
| nigra plena . . .  | 1   | 30  | speciosum . . .  | 24  | —   |
| denticulata . . .  | 48  | —   | tuberosum <b>A</b> . . .   | 24  | —   |
| marginata . . .  | 30  | —   | Thymus parviflorus <b>A</b> . . .  | 12  | —   |
| involucrata . . .  | 30  | —   | corsicus <b>A</b> . . .  | 18  | —   |
| cortusoides . . .  | 18  | —   | Tigridia conchiflora * . . .   | 24  | —   |
| veris nigricans pleno . . .  | 24  | —   | conchiflora minor * . . .  | 36  | —   |
| Pulmonaria virginica, Frühlingsblume   | 24  | —   | pavonia, * . . .   | 4   | —   |
| Ranunculus repens, fl. pleno . . .   | 6   | —   | ditto pr. 100 Stück . . .  | 3   | —   |
| aconitifolius albo pleno . . .   | 24  | —   | pavonia coccinea * . . .   | 36  | —   |
| Rheum Tobolsk, riesenhafte Pflanze   | 24  | —   | fulgens . . .  | 36  | —   |
| Myatt's Queen, engl. Gemüße . . .  | 18  | —   | splendens * . . .  | 36  | —   |
| Rudbeckia columnaris . . .   | 12  | —   | Tradescantia virginia splendens . . .  | 24  | —   |
| fulgida . . .  | 12  | —   | rubro pleno . . .  | 24  | —   |
| purpurea . . .   | 24  | —   | Trollius aconitifolius . . .   | 18  | —   |
| speciosa . . .   | 24  | —   | americanus . . .   | 24  | —   |
| serotina . . .   | 24  | —   | asiaticus . . .  | 18  | —   |
| Rhodiola rosea <b>A</b> . . .  | 24  | —   | Trollius atrebatensis . . .  | 24  | —   |
| Salvia officinalis tricolor, sehr schön  | 24  | —   | Demayanus . . .  | 24  | —   |
| sclarea, vortrefflich zur Wein- und Essig-<br>fabrication                        | 18  | —   | giganteus . . .  | 36  | —   |
| Sanguinaria canadensis . . .   | 6   | —   | europaeus albidus . . .  | 18  | —   |
| Saxifraga, mehrere zu Gruppierungen in Steinen<br>geignete Sorten <b>A</b> . . . | 12  | —   | hybridus . . .   | 18  | —   |
| Scutellaria macrantha . . .  | 24  | —   | napellifolius . . .  | 18  | —   |
| Seylla sibirica, schöne blaue Frühlingsblume                                     | 6   | —   | Smouthii . . .   | 24  | —   |
| ditto . . . pr. 12 Stück   | 4   | —   | Tussilago petasites . . .  | 12  | —   |
| campanulata . . .  | 4   | —   | fragrans * . . .   | 12  | —   |
| hyacinthoides . . .  | 4   | —   | alba . . .   | 12  | —   |
| Sedum, in circa 12 Sorten pr. Stck.  | 12  | —   | Valeriana rubra . . .  | 6   | —   |
| Sempervivum in mehr. Sort. <b>A</b> . . .  | 12  | —   | Veronica gentianoides . . .  | 6   | —   |
| Silene maritima fl. pleno <b>A</b> . . .   | 18  | —   | corymbosa . . .  | 30  | —   |
| alpestris <b>A</b> . . .   | 18  | —   | longifolia . . .   | 6   | —   |
| orientalis . . .   | 24  | —   | paniculata . . .   | 6   | —   |
| Saxifraga <b>A</b> . . .   | 12  | —   | aphylla . . .  | 12  | —   |
| Syrtoria europaea, Ampelpflanze  | 24  | —   | repanda . . .  | 12  | —   |
| Sisyrinchium anceps . . .  | 12  | —   | Veratrum nigrum . . .  | 24  | —   |
| album grandiflorum . . .   | 12  | —   | Viola altaica, großblühende Stiefmütterchen                                      | 6   | —   |
| convolutum . . .   | 12  | —   | 12 sehr schöne Sorten . . .  | 2   | —   |
| Sabini . . .   | 12  | —   | gewöhnliche ältere pr. 12 Stück  | 12  | —   |
| Soldanella alpina <b>A</b> . . .   | 24  | —   | obliqua flo. striato . . .   | 12  | —   |
| asarifolia <b>A</b> . . .  | 12  | —   | odorata albo pleno . . .   | 12  | —   |
| Clusii . . .   | 24  | —   | rubro plenissimo . . .   | 12  | —   |
| minima <b>A</b> . . .  | 24  | —   | caeruleo pleno . . .   | 6   | —   |
| montana <b>A</b> . . .   | 24  | —   | Florine . . .  | 18  | —   |
| Spirea filipendula fl. pl. sehr schön  | 18  | —   | de Parme . . .   | 12  | —   |
| japonica ( <i>Houteia</i> ) * . . .  | 24  | —   | pyrolaeiflora . . .  | 1   | 30  |
| ulmaria, fl. pl. . . .   | 24  | —   | Wahlenbergia grandiflora <b>A</b> . . .  | 24  | —   |
| fl. rubro ( <i>venusta</i> ) . . .   | 30  | —   | albo pleno <b>A</b> . . .  | 36  | —   |
| Aruncus fol. var. . . .  | 30  | —   | Wulfenia carinthiaca <b>A</b> . . .  | 24  | —   |
| Humboldti . . .  | 24  | —   | Amherstiae . . .   | 1   | —   |
| Stenactis speciosa . . .   | 12  | —   | Yucca flaccida, eine frei ausfallende Pracht-<br>pflanze . . . fl. 1. 30 kr. bis | 3   | —   |
|  |     |     | filamentosa . . . fl. 1. 30 kr. bis  | 3   | —   |

Von vielen obigen Staudengewächsen können grössere Parthieen zur Anlage von Gruppen zu sehr mässigen Preisen abgegeben werden.



# Neue Phlox.

Durch Kreuzung der *Phlox decussata* mit *P. suffruticosa* ist ein Sortiment gewonnen worden, welches die ausdauernde Natur der Einen mit den Vorzügen der Anderen in sich vereinigt. Diese neuen Hybriden zeichnen sich aus durch Farbe, Form und Größe der Blumen, durch schöne Stellung und Reichthum der Blumenbouquets, durch niedrigen, gedrängten Wuchs, und endlich durch ihre Genügsamkeit mit dem gewöhnlichen Gartenboden, während die reinen *P. suffruticosa* in Bezug hierauf oft sehr empfindlich sich zeigen. Die Vermehrung für diesen Herbst ist noch sehr beschränkt; dagegen werden wir allen geneigten Aufträgen für das Frühjahr 1854 entsprechen können.

|   |  | n. kr.         |                                 |  | n. kr.         |
|---|--|----------------|---------------------------------|--|----------------|
| a.) <i>Phlox decussata</i> , und deren Hybriden |  |                | Lilacina albicans               |  |                |
| M. Domage, (Lierval),                           |  |                | Madame Anette                   |  |                |
| Docteur Andry, (L.)                             |  |                | " Boucharlet                    |  |                |
| Fanny Adam, (L.)                                |  |                | " Coursel                       |  |                |
| President Decaisne, (L.)                        |  |                | " G. St. Cyr                    |  |                |
| Madame de Vetry, (L.)                           |  |                | " Guillot                       |  |                |
| Charles Rouillard, (L.)                         |  |                | " Henderson                     |  |                |
| Madame Pescatore, (L.)                          |  |                | Marie Bellanger                 |  | pr. Stück — 30 |
| Madame Basseville, (L.)                         |  |                | Paon                            |  |                |
| Madame Corbay, (L.)                             |  |                | Purpurea striata                |  | pr. 12 St. 5 — |
| Madame Veillard, (L.)                           |  |                | Rève d'amour                    |  |                |
| Madame Milleret, (L.)                           |  | pr. Stück — 48 | Sallier                         |  |                |
| Amiral de Linois (Fontaine.)                    |  | pr. 12 St. 8 — | Stella matutina                 |  |                |
| Elisa (F.)                                      |  |                | Striata                         |  |                |
| General Bréa, (F.)                              |  |                | Striata superbissima            |  |                |
| Mr. Bréchon, (F.)                               |  |                | Villaret joyeuse                |  |                |
| Madame Bréchon, (F.)                            |  |                | Vicepräsident Adam              |  |                |
| General Castellane, (F.)                        |  |                | (b. <i>Phlox suffruticosa</i> . |  |                |
| Célestine, (F.)                                 |  |                | Bachus                          |  |                |
| Madame Thomann, (F.)                            |  |                | Belle de Nancy                  |  |                |
| Emilie Rousselle (F.)                           |  |                | Captivation                     |  |                |
| Mr. Thomann, (F.)                               |  |                | Cyanea                          |  |                |
| ferner:   |  |                | Hébé                            |  |                |
| 30 noch unbekannte <i>Phlox</i> (Lierval.)      |  | a — 48         | Imbricata                       |  | pr. Stück — 30 |
| Alba pumila                                     |  |                | Lambert Loirie                  |  |                |
| Alboni  |  |                | Madmoiselle d'Angri             |  | pr. 12 St. 5 — |
| Armand d'Artois                                 |  |                | Madame le Grand                 |  |                |
| Alicé Allain                                    |  |                | " Recamier                      |  |                |
| Comte de Chambord                               |  |                | Roi Leopold                     |  | fl. 1.         |
| Comtesse de Chambord                            |  | pr. Stück — 30 | Van Houttei                     |  |                |
| Deuil de la Cesse de Marnes                     |  | pr. 12 St. 5 — | c.) <i>Phlox Drummondii</i> *.  |  |                |
| Docteur Guerzent                                |  |                | Mayi variegata . . . . .        |  | — 36           |
| Etoile  |  |                | Radetzky . . . . .              |  | — 48           |
| Etendart  |  |                | Thompsoni . . . . .             |  | — 48           |
| Ferrand   |  |                | Depressa Criterion . . . . .    |  | 2 —            |
| Foudroyant                                      |  |                | d.) <i>Phlox scutacea</i> *.    |  |                |
|   |  |                | Nelsoni . . . . .               |  | — 24           |

## Neue Verbenen.

pr. Stück 20 kr. bis 30 kr.

Admiration, schön blau.  
Anacreon, dunkelblau.  
Aste, violett, fleischf. und carmoisin gestreift.  
Beauté de Vignely, lila, violett u. rosa, gltr.  
Beauté suprême, lila-violett, gestreift  
Céline Mallet, rein weiß.  
Charmante Zoë, fleischfarb mit carmin.  
Emma, purpur und carmoisin.  
Empereur de la Chine, scharlach-carmoisin.  
Euphrosine, fleischfarb und carmin.  
Frédéric, rosa mit scharlach.  
General Drouot, dunkelcarmoisin mit purpur.  
Heroine, lila-blau.  
John Salter, zimmer-scharlach.  
Junon, carmin.  
La Purpurine, groß, dunkelscharlach.  
l'ardoisée, dunkelblau.

Leopold, purpur und weiß gestreift.  
Madame de Gournay, incarnat gestreift.  
Madame François, hellzinnober.  
Madame Mallet, amaranth-carmoisin.  
Madame Rattier, fleischfarb mit carmin.  
Mathilde Humann, dunkelblau.  
Morphé, dunkelblau.  
Marie Lierval, violettroth und carmoisin.  
Mr. Julien, hochscharlach.  
Nigricans, dunkelcarmoisin.  
Niobé, weiß mit carmin.  
Parfum de Madeleine, weiß, blau gestreift.  
Rachel, fleischfarb, lila und carmoisin.  
Scarlet defiance, zimmer-scharlach.  
Valentine de Saveuse, dunkelblau.  
Virginus, blau

## Gewächshaus-Pflanzen.

Die hierher gehörigen Azalea indica, Camellien, Rhododendron und Warmhauspflanzen sind nächstfolgend besonders verzeichnet.

|   | fl.   kr.       |   | fl.   kr. |
|---|-----------------|---|-----------|
| Abelia triflora . . . . .                       | 24 kr. bis — 48 | Acacia impressa, ( <i>hispidula</i> ) 30 kr. bis      | 1 30      |
| Abutilon striatum . . . . .                     | — 24            | Hägeli . . . . .                                      | 1 —       |
| insigne . . . . . fl. 1 bis                     | 2 30            | lineata . . . . . 30 kr bis                           | 1 30      |
| venosum . . . . .                               | — 30            | ditto . . . . . pr. 12 Stück                          | 6 —       |
| floribundum . . . . .                           | — 36            | longifolia trinerva . . . fl. 1 bis                   | 2 —       |
| Acacia affinis . . . . .                        | 1 —             | longissima ( <i>lorifolia</i> ) . . . . .             | 1 —       |
| armata ( <i>paradoxa</i> ) . . . . .            | — 24            | mimosoides . . . . .                                  | 1 —       |
| asparagoides ( <i>Brownii</i> ) 48 kr. bis      | 1 —             | oleifolia elegans . . . . .                           | 2 —       |
| biloba . . . . .                                | — —             | Pawlikowskiana . . . . .                              | 3 30      |
| calamifolia . . . . . fl. 1 bis                 | 2 —             | pentadenia . . . . .                                  | 1 —       |
| cavenia . . . . .                               | — —             | platiptera . . . . . fl. 1 bis                        | 2 —       |
| ciliaris . . . . . 30 kr. bis                   | 1 —             | præcox . . . . . „ 1 „                                | 2 —       |
| conspicua ( <i>vestita</i> ) . . . fl. 1 bis    | 2 —             | pubescens . . . . .                                   | 2 —       |
| ditto . . . . . pr. 12 Stück                    | 12 —            | pulchella major . . . 30 kr. bis                      | 2 —       |
| cordifolia . . . . . 30 kr. bis                 | 1 —             | ditto . . . . . pr. 12 Stück                          | 6 —       |
| Cunninghami ( <i>petiolaris</i> <i>Lehm.</i> )  | 3 30            | pulchella spectabilis . . . . .                       | — —       |
| dealbata ( <i>Esterhaziana</i> ) fl. 1 bis      | 3 —             | polymorpha ( <i>ratifolia</i> ) „ 1 bis               | 2 —       |
| decora . . . . .                                | 7 —             | rotundifolia . . . . .                                | 2 —       |
| Doneana . . . . .                               | — —             | salicifolia . . . . . fl. 1 bis                       | 2 —       |
| Drumondi . . . . .                              | — —             | sulcata . . . . . fl. 1 bis                           | 2 —       |
| floribunda . . . . . fl. 1. 30 kr. bis          | 3 —             | scolopendrioides ( <i>ensata</i> ) . . . . .          | 2 —       |
| glaucescens ( <i>candicans</i> , <i>glauco-</i> | — —             | stricta multiflora . . . . .                          | — 30      |
| <i>philla</i> , <i>cultriformis</i> ) fl. 1 bis | 3 —             | thegonocarpa . . . . .                                | 1 12      |
| ditto . . . . . pr. 12 Stück                    | 12 —            | triangularis . . . . .                                | 1 12      |
| grandis . . . . .                               | — —             | variabilis ( <i>Hügel</i> N <sup>o</sup> 2) . . . . . | 1 12      |



|  | fl. | kr.  |  | fl. | kr.  |
|--|-----|------|--|-----|------|
| Adenandra ciliata ( <i>Diosma</i> ) . . . . .      | —   | —    | Berberis leucantha ( <i>Mahonia</i> ) . . . . .      | —   | —    |
| grandiflora . . . . .                              | —   | —    | trifoliata ( <i>Mahonia</i> ) . . . . .              | —   | —    |
| ovata . . . . .                                    | —   | —    | floribunda . . . . .                                 | —   | 1 12 |
| speciosa . . . . .                                 | —   | —    | Darwini . . . . .                                    | —   | 5 —  |
| trifoliata . . . . .                               | —   | —    | Jamesoni . . . . .                                   | —   | 1 30 |
| uniflora grandiflora . . . . .                     | —   | —    | macrophylla . . . . .                                | —   | 1 30 |
| Agathosma ciliaris . . . . .                       | —   | —    | tenuifolia ( <i>Mahonia</i> ) fl. 1 bis              | —   | 5 —  |
| Ageratum caelestinum novum . . . . .               | —   | 24   | trifoliata . . . . .                                 | —   | 1 4  |
| Agnostus sinuatus, prachtvolle Proteacea           | —   | —    | vitellina . . . . .                                  | —   | 2 30 |
| mit orangefarbenen Blumen und großen               | —   | —    | andere mehr unter den Gehölzen.                      | —   | —    |
| eichenlaubförmigen Blättern fl. 7 bis              | 25  | —    | Beschornesia yuccoides                               | —   | —    |
| integrifolius . . . . . fl. 7. bis                 | 15  | —    | ( <i>Lindley</i> ) flein . . . . .                   | —   | —    |
| Agapanthus umbellatus albiflorus . . . . .         | —   | 36   | Bignonia Carolinae . . . . .                         | —   | 48   |
| striatus . . . . .                                 | —   | 36   | crucigera . . . . . 24 kr. bis                       | —   | 48   |
| maximus . . . . . fl. 2 bis                        | 5   | —    | capreolata . . . . . 24 „ „                          | —   | 36   |
| Akebia quinata, fr., Schlingpflanze . . . . .      | —   | 1 30 | coccinea grandiflora ( <i>Siebold</i> ) . . . . .    | —   | 5 —  |
| Alona caelestis . . . . . 30 kr. bis               | 1   | —    | grandiflora . . . . . 48 kr. „                       | —   | 1 30 |
| Aloysia citriodora . . . . .                       | —   | 24   | jasminoides . . . . . 30 „ „                         | —   | 1 —  |
| Anagallis caerulea grandifl. . . . .               | —   | 24   | floribunda . . . . . 30 „ „                          | —   | 1 —  |
| Andromeda Drumondi . . . . .                       | —   | 1 12 | rosea . . . . . 30 „ „                               | —   | 1 —  |
| buxifolia . . . . .                                | —   | 30   | australis . . . . . 30 „ „                           | —   | 1 —  |
| phylliraeifolia . . . . .                          | —   | 2 —  | major . . . . . 30 „ „                               | —   | 1 —  |
| formosa, eine sehr empfehlenswerthe prächt-        | —   | —    | sempervirens . . . . . 30 „ „                        | —   | 1 —  |
| tige Pflanze . . . . .                             | —   | 2 —  | speciosa ( <i>picta</i> , <i>Lindley</i> ) . . . . . | —   | 30   |
| floribunda . . . . .                               | —   | —    | Tweediana . . . . .                                  | —   | 1 —  |
| Anemone japonica fr. . . . . 12 kr. bis            | —   | 24   | venusta . . . . .                                    | —   | 48   |
| Angophora, f. Metrosideros.                        | —   | —    | Alle Bignonien gehören zu den schönst-               | —   | —    |
| Anomatheca cruenta . . . . . pr. 12 Stück          | —   | 48   | blühenden Schlingpflanzen.                           | —   | —    |
| Anopteris glandulosa . . . . .                     | —   | —    | Billardiera purpurea, eine schöne Schling-           | —   | —    |
| Auracaria, bei den Coniferen besonders ver-        | —   | —    | pflanze mit glänzend dunkelblauen                    | —   | —    |
| zeichnet.  | —   | —    | Blüthen . . . . . 30 kr. bis                         | —   | 48   |
| Aralia crassifolia . . . . .                       | —   | 5 —  | Blandfordia nobilis . . . . .                        | —   | 3 —  |
| trifoliata . . . . .                               | —   | 5 —  | flammea . . . . .                                    | —   | 6 —  |
| sambucina . . . . .                                | —   | 1 30 | Boronia anemonefolia ( <i>Fraserii</i> )             | —   | —    |
| andere bei den Warmhauspflanzen.                   | —   | —    | fl. 1 bis  | —   | 2 30 |
| Aotus ferrugineus . . . . .                        | —   | 30   | crenulata . . . . . „ 1 „                            | —   | 2 30 |
| Arbutus nepalensis . . . . .                       | —   | 2 —  | denticulata . . . . . 30 kr. bis                     | —   | 2 —  |
| procera . . . . .                                  | —   | 2 —  | Drumondi . . . . .                                   | —   | 12 — |
| discolor . . . . .                                 | —   | 1 30 | ledifolia . . . . .                                  | —   | 3 —  |
| Andrachne . . . . . fl. 2 bis                      | —   | 5 —  | microphylla ( <i>tetrandra</i> ) . . . . .           | —   | 3 30 |
| Croomii . . . . .                                  | —   | —    | pinnata . . . . .                                    | —   | 2 —  |
| magnifica . . . . .                                | —   | —    | polygalaeifolia . . . . . fl. 1 bis                  | —   | 2 —  |
| Aristaea capitata . . . . .                        | —   | 36   | serullata . . . . .                                  | —   | —    |
| Arundinacea falcata, Blattspitze . . . . .         | —   | 24   | triphylla . . . . .                                  | —   | 5 —  |
| Azalea indica, besonders variegirt.                | —   | —    | viminea . . . . . 30 kr. bis                         | —   | 1 —  |
| Baeckea pendula, sehr niedrig 30 kr. bis           | —   | 1 —  | floribunda . . . . .                                 | —   | 2 —  |
| Banksia aemula . . . . .                           | —   | 2 30 | Bouvardia splendens . . . . .                        | —   | 30   |
| ericaeifolia . . . . . fl. 1 bis                   | —   | 5 —  | leiantha, prächtige Winterblum. 24kr. bis            | —   | 1 —  |
| Hügelii . . . . . „ 2 „                            | —   | 8 —  | Bossiaea plumosa disticha . . . . .                  | —   | 2 —  |
| philicaefolia . . . . . 2 „                        | —   | 5 —  | microphylla vera . . . . .                           | —   | 2 —  |
| spinulosa . . . . . „ 1 „                          | —   | 5 —  | pauciflora . . . . .                                 | —   | —    |
| Baufortia splendens . . . . .                      | —   | 1 —  | Brachysema species . . . . .                         | —   | 1 30 |
| sparsa . . . . .                                   | —   | 1 12 | Brugmansia candida ( <i>Datura</i> ) 30 kr. bis      | —   | 1 —  |
| purpurea . . . . .                                 | —   | 1 30 | Knigthi . . . . .                                    | —   | 1 —  |
| villosa . . . . .                                  | —   | 1 —  | sanguinea . . . . .                                  | —   | 48   |
| Bejaria glauca . . . . .                           | —   | 4 —  | Brunia imbricata . . . . .                           | —   | 30   |
| Berberis Ehrenbergii ( <i>Mahonia</i> ), fl. 5 bis | —   | 15 — | lanuginosa . . . . .                                 | —   | 30   |
| Fortunei ( <i>Mahonia</i> ) . . . . . fl. 1. „     | —   | 2 30 | Budlea Lindleyana . . . . .                          | —   | 24   |
| actinacantha . . . . . „ 1. „                      | —   | 2 —  | Burchellia capensis . . . . .                        | —   | 1 —  |
| Knigthii . . . . .                                 | —   | 1 30 | Bursaria spinosa . . . . . 36 kr. bis                | —   | 1 12 |
| gracilis ( <i>Mahonia</i> ) . . . . .              | —   | —    | Drumondi ( <i>Citriobatus multifl.</i> )             | —   | 48   |





|  | fl. kr. |  | fl. kr.    |
|--|---------|--|------------|
| Coriaria nepalensis . . . . .  | 24      | Ecremocarpus scaber . . . . .                | 24         |
| Crotalaria purpurea . . . . .  | 24      | Edgeworthia chrysantha . . . . .             | 5          |
| Crowea latifolia ( <i>Eriostemon</i> ) 48 kr. bis  | 2       | Elichrysum proliferum . . . . .              | 36 kr. bis |
| major . . . . . fl. 1 bis  | 2 30    | prolif. Barnesii . . . . .                   | 1 30       |
| Cryptomeria, f. bei den Coniferen.   |         | spectabile . . . . .                         | 36 # #     |
| Cunonia capensis . . . . .   | 2       | grandiflorum . . . . .                       | 48         |
| Cuphea platycendra . . . . .   | 24      | purpureum, flart 36 kr. bis                  | 2          |
| Cupressus, f. bei den Coniferen.   |         | Elaeocarpus cyaneus . . . . .                | 2          |
| Cyclamen persicum . . . . . 36 kr. bis   | 1       | Embothrium speciosissimum ( <i>Telopea</i> ) |            |
| fl. pleno . . . . .  |         | Enkianthus quinqueflorus fl. 1. 30 kr. bis   | 7          |
| Cytisus canariensis . . . . .  | 48      | Epacris campanulata . . . . .                | 48 kr. bis |
| Attleyanus . . . . .   | 48      | alba . . . . .                               | 48 kr. bis |
| Bergmanni . . . . .  | 1 30    | maxima . . . . .                             | 2          |
| filipes, sehr sichtlich 36 kr. bis   | 1       | atrosanguinea . . . . .                      | 1 30       |
| fragrans . . . . .   | 1 30    | aurantia . . . . .                           | 1 30       |
| nubigenus . . . . . fl. 1. 30 kr. bis  | 3       | bicolor . . . . .                            | 2          |
| speciosus . . . . .  | 30      | Carminca ( <i>R.</i> ) . . . . .             | 1          |
| racemosus . . . . .  | 36      | miniata . . . . . fl. 1. 30 kr. bis          | 5          |
| latifolius . . . . . 30 kr. bis  | 2       | grandiflora . . . . .                        | 4          |
| Dacrydium, f. bei den Coniferen.   |         | splendens . . . . .                          | 4          |
| Dammara, f. bei den Coniferen.   |         | Copelandi . . . . . fl. 1 bis                | 2          |
| Daphne Dauphin . . . . . # 1 #   | 3       | coccinea . . . . .                           | 1 30       |
| Delahayana . . . . .   | 1 30    | delicata . . . . .                           | 2 30       |
| Fortuneana . . . . .   |         | densiflora . . . . .                         | 2 30       |
| indica . . . . . fl. 1 bis   | 2       | grandiflora . . . . . 48 kr. bis             | 2          |
| rubra, schöne fl. 1. 30 kr. bis  | 5       | rubra . . . . .                              | 3          |
| japonica . . . . . 48 # #  | 1 12    | heteronema ( <i>mucronata</i> ) . . . . .    | 48         |
| Datura arborea . . . . . 30 # #  | 1       | hyacinthifol. candidissima . . . . .         | 3          |
| Knighti fl. pl. . . . .  | 1       | impressa . . . . . 48 kr. bis                | 2          |
| sanguinea . . . . .  | 1       | alba ( <i>R.</i> ) . . . . .                 | 1 30       |
| Daviesia corymbosa . . . . . fl. 1 bis   | 1 30    | ardens ( <i>R.</i> ) . . . . .               | 1 30       |
| latifolia floribunda . . . . .   | 2       | superba ( <i>R.</i> ) . . . . .              | 1 30       |
| longifolia . . . . .   | 1 30    | Kinghorni . . . . .                          | 3 30       |
| intermedia . . . . .   | 1 30    | longiflora splendens fl. 1 bis               | 2          |
| cornuta ( <i>prionoïdes</i> ) . . . . . fl. 1 bis  | 2       | alba ( <i>R.</i> ) . . . . .                 | 1 30       |
| ulicina . . . . . 48 kr. bis   | 1 30    | incarnata ( <i>R.</i> ) . . . . .            | 1 30       |
| Dielytra spectabilis ( <i>Dicentra</i> ), neu, wunder-<br>schön, im Freien ausdauernd 30 kr. bis | 1       | magnifica . . . . .                          |            |
| Dietes bicolor . . . . .   | 1 30    | sanguinea . . . . .                          | 1 30       |
| Dillwynia cinerascens . . . . .  | 1       | Tauntoniana . . . . .                        | 1 30       |
| coronata . . . . .   | 3       | mirabilis ( <i>R.</i> ) . . . . .            | 1 30       |
| filifolia . . . . .  |         | pulchella . . . . .                          | 1          |
| glycinefolia . . . . .   | 2 30    | microphylla . . . . . fl. 1 bis              | 2          |
| Hügelii . . . . . fl. 1 bis  | 2       | paludosa . . . . . 48 kr. bis                | 2          |
| phylloïdes ( <i>rudis sang.</i> ) # 1 #  | 2       | pungens . . . . . fl. 1 bis                  | 2          |
| Henckmani, ( <i>Pultenaea Brownii</i> )<br>sehr schön . . . . . fl. 1. 30 kr. bis                | 3       | autumnalis . . . . .                         |            |
| speciosa . . . . . fl. 1 bis   | 2       | incarnata grandiflora                        |            |
| pendula . . . . . # 1 #  | 2       | Attleyana                                    |            |
| Dioeclea glycyoïdes ( <i>Kennedy splendens</i> ) . . . . . 30 kr. bis                            | 1 12    | Venus Victrix                                |            |
| Diosma ambigua . . . . .   | 30      | Hügelii                                      |            |
| brunioides . . . . .   | 48      | diaphana                                     |            |
| capitata . . . . .   | 48      | resplendens                                  |            |
| fragrans ( <i>speciosa</i> ) . . . . .   | 48      | amabilis fl. 1 bis                           | 2          |
| Disandra prostrata, für Hängewäfen . . . . .   | 24      | ornata                                       |            |
| Dracaena australis ( <i>Cordylina</i> ) . . . . .  | 2       | venusta                                      |            |
| congesta . . . . .   | 1 12    | rosea brevifolia                             |            |
| Dracophyllum floribundum . . . . .   |         | elongata                                     |            |
| Dryandra formosa . . . . .   | 6       | floribunda                                   |            |
| falcata . . . . .  | 3 30    | rubra grandiflora                            |            |
| Drymis Winteri . . . . .   | 3       | 12 verschiedene Sorten . . . . . fl. 8 bis   | 12         |

|                                      | fl. | kr. |                                       | fl. | kr. |
|--------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------|-----|-----|
| Epacris-Sämlinge in allen Jar-       |     |     | Erica metakeflora . . . . .           |     |     |
| ben, schöne Kulturpflanzen           |     |     | mirabilis . . . . .                   |     |     |
| von 1 $\frac{1}{2}$ Fuß Höhe, 1 Fuß  |     |     | montana . . . . .                     |     |     |
| Durchmesser pr. Stück fl. 1          |     |     | mutabilis . . . . .                   |     |     |
| pr. 12 Stück fl. 10                  |     |     | Neillii . . . . .                     |     |     |
| pr. 100 Stück fl. 75                 |     |     | nidularis . . . . .                   |     |     |
| Epimedium, bei den Staudengewächsen. |     |     | nigrita . . . . .                     |     |     |
| Erica acuminata . . . . .            |     |     | nitens . . . . .                      |     |     |
| Aitonii . . . . .                    |     |     | Patersonia . . . . .                  |     |     |
| albena . . . . .                     |     |     | pellucida . . . . .                   |     |     |
| ambigua . . . . . 30 kr. bis         |     |     | persoluta . . . . .                   |     |     |
| ampullacea vittata . . . . .         |     |     | perspicua . . . . .                   |     |     |
| arborea . . . . . 24 kr. bis         |     |     | politrachifolia . . . . .             |     |     |
| aspera . . . . .                     |     |     | pubescens . . . . .                   |     |     |
| assurgens . . . . .                  |     |     | minima . . . . .                      |     |     |
| australis . . . . . 30 kr. bis       |     |     | propendens . . . . .                  |     |     |
| blanda . . . . .                     |     |     | purpurea . . . . .                    |     |     |
| Bowena . . . . . 48 kr. bis          |     |     | purpurea . . . . .                    |     |     |
| cavendishi . . . . .                 |     |     | pyramidalis . . . . .                 |     |     |
| cerinthoides . . . . .               |     |     | vernalis . . . . .                    |     |     |
| colorans . . . . .                   |     |     | refulgens . . . . .                   |     |     |
| magna . . . . .                      |     |     | regerminans . . . . .                 |     |     |
| cinerea . . . . .                    |     |     | retorta . . . . .                     |     |     |
| albida . . . . .                     |     |     | Ritschelliana albida . . . . .        |     |     |
| ciliaris . . . . .                   |     |     | rosea . . . . .                       |     |     |
| coccinea . . . . .                   |     |     | ruber calyx . . . . . fl. 1 bis       |     |     |
| colorans . . . . .                   |     |     | Savillea . . . . .                    |     |     |
| comosa alba . . . . .                |     |     | Schanonia . . . . .                   |     |     |
| caffra . . . . .                     |     |     | Sebana . . . . . fl. 1 bis            |     |     |
| cruenta . . . . .                    |     |     | sparsa . . . . . 36 kr. bis           |     |     |
| cubica minor . . . . .               |     |     | speciosa . . . . . fl. 1 "            |     |     |
| major . . . . .                      |     |     | Sprengelii vera . . . . .             |     |     |
| cupressina . . . . .                 |     |     | spurea . . . . .                      |     |     |
| curviflora . . . . .                 |     |     | Steffatschecki . . . . .              |     |     |
| rubra (flammea) . . . . .            |     |     | taxifolia . . . . .                   |     |     |
| Dabecia . . . . .                    |     |     | tenella . . . . .                     |     |     |
| alba . . . . .                       |     |     | transparent . . . . . 30 kr. bis      |     |     |
| declinata . . . . .                  |     |     | tricolor . . . . . fl. 1 bis          |     |     |
| densa . . . . .                      |     |     | tricolor elegans . . . . .            |     |     |
| discolor . . . . .                   |     |     | dumosa . . . . .                      |     |     |
| Endlicherii . . . . .                |     |     | multiflora . . . . .                  |     |     |
| eximia . . . . .                     |     |     | superba . . . . .                     |     |     |
| exurgens coccinea . . . . .          |     |     | tubiflora purpurea . . . . .          |     |     |
| gemmifera . . . . .                  |     |     | Uhria . . . . . 30 kr. bis            |     |     |
| globosa . . . . .                    |     |     | pillosa . . . . .                     |     |     |
| gracilis . . . . .                   |     |     | speciosa . . . . .                    |     |     |
| Hartuelli . . . . .                  |     |     | undulata (Westfalinga) . . . . .      |     |     |
| hiemalis . . . . . 30 kr. bis        |     |     | ventricosa . . . . .                  |     |     |
| hybrida . . . . .                    |     |     | ventricosa stellifera . . . . .       |     |     |
| imbecilla . . . . .                  |     |     | purpurea . . . . . fl. 1 bis          |     |     |
| incarnata . . . . .                  |     |     | vernix longiflora . . . . .           |     |     |
| jubata . . . . .                     |     |     | coccinea . . . . .                    |     |     |
| Lambertia rosea . . . . .            |     |     | versicolor nova . . . . .             |     |     |
| linæoides . . . . . 30 kr. bis       |     |     | verticillata vera . . . . .           |     |     |
| longiflora . . . . .                 |     |     | vestita coccinea . . . . . fl. 1 bis  |     |     |
| Mac-Nabeana . . . . .                |     |     | fulgens . . . . . 7 1 "               |     |     |
| mamosa coccinea . . . . .            |     |     | var. . . . . " 1 "                    |     |     |
| purpurea . . . . .                   |     |     | Willmoriana . . . . . 48 kr. bis      |     |     |
| Massonia . . . . .                   |     |     | Winkleri . . . . .                    |     |     |
| melanthera . . . . . 30 kr. bis      |     |     | Eriostemon buxifolium, eine sehr erle |     |     |
| mediteranea hibernica 24 " "         |     |     | schönblühende Pflanze fl. 2 bis       |     |     |
|                                      |     |     | cuspidatum . . . . . " 2 "            |     |     |



|  | fl.   kr. |   | fl.   kr.       |
|--|-----------|---|-----------------|
| Eriostemon linifolium . . . . .                | 5 —       | Gardenia florida plena . . . . .            | 36 kr. bis 1 12 |
| intermedium . . . . . fl. 3 bis                | 5 —       | Fortuneana . . . . .                        | 1 —             |
| neriifolium . . . . . # 3 #                    | 5 —       | Gardouia Hookeri . . . . .                  | 48 —            |
| myoporoides . . . . . # 2 #                    | 3 30      | Gaultheria leucocarpa . . . . .             | 2 —             |
| pulchellum . . . . .                           | 5 —       | Gastrolobium bilobum . . . . .              | 48 —            |
| scabrum, schöne Pflanzen fl. 3 bis             | 5 —       | calycinum . . . . .                         | 3 —             |
| salignum (Crowea) . . . . . fl. 1 bis          | 2 —       | cuneatum . . . . .                          | 2 30            |
| Erythrina crista Galli . . . . . 48 kr. bis    | 3 —       | Leakeanum . . . . .                         | 3 —             |
| Humaci . . . . .                               | 1 —       | retusum . . . . .                           | 48 —            |
| Escalonia grandiflora . . . . . 36 kr. bis     | 1 —       | Genethylis tulipiflora . . . . .            | —               |
| arbutifolia . . . . .                          | 2 —       | Genista alba . . . . .                      | 30 —            |
| macrantha . . . . . fl. 1. 30 kr. bis          | —         | Barclayana . . . . .                        | 48 —            |
| montevidensis . . . . .                        | 48 —      | canariensis . . . . .                       | 48 —            |
| organiensis . . . . .                          | 48 —      | fragrans (Cytisus) . . . . .                | 1 30            |
| Eurybia ilicifolia . . . . . fl. 1. 30 kr. bis | 3 —       | sericea . . . . .                           | 36 —            |
| Eutaxia Baxteri . . . . .                      | 1 —       | Gladiolus, bei den Staudengewächsen.        | —               |
| myrtifolia . . . . .                           | 24 —      | Glycine Backhousiana (Wistaria) . . . . .   | 1 30            |
| Evonymus fimbriatus . . . . . 36 kr. bis       | 1 12      | Gnidia radiata . . . . .                    | 48 —            |
| Fabiana imbricata . . . . .                    | 24 —      | pinifolia, sehr schön . . . . . fl. 1 bis   | 2 —             |
| Fagus Cunninghami . . . . .                    | —         | Gompholobium splendens . . . . .            | 1 30            |
| Forsythia viridissima fr. . . . .              | 24 —      | barbigerum . . . . .                        | 3 30            |
| Fragaria indica, für Hängevase . . . . .       | 18 —      | polymorphum . . . . .                       | —               |
| Froebelia fasciculiflora . . . . . fl. 1. bis  | 2 —       | virgatum . . . . .                          | —               |
| Fuchsia, NB. hiervon verzeichnen wir nur       |           | Gordonia javanica . . . . .                 | 2 —             |
| die schönsten neueren als:                     |           | Grevillea bipinnatifida . . . . . fl. 3 bis | 5 —             |
| Abbé Bourgois . . . . .                        |           | flexuosa . . . . .                          | —               |
| Agnes . . . . .                                |           | longifolia . . . . .                        | 2 30            |
| Alfred Salter . . . . .                        |           | Manglesii . . . . . 30 kr. bis              | 1 —             |
| Belle étoile . . . . .                         |           | robusta . . . . .                           | 2 30            |
| Clapton hero . . . . .                         |           | sericea . . . . .                           | 1 30            |
| cerasiformis . . . . .                         |           | Thelemaniana . . . . . 24 kr. bis           | 1 —             |
| Diadem of Flora . . . . .                      |           | Habrothamnus elegans . . . . .              | 30 —            |
| Expansion . . . . .                            |           | speciosus . . . . .                         | 30 —            |
| Gem (Turville) . . . . .                       |           | Hackea petrophyllloides . . . . .           | 1 30            |
| General Changarnier . . . . .                  |           | Victoria, neu, ausgezeichnet fl. 2 bis      | 5 —             |
| General Oudinot . . . . .                      |           | Heliotropium peruv. Vol-                    |                 |
| Hébé . . . . .                                 |           | taireanum . . . . .                         |                 |
| Hendersoni . . . . .                           |           | corymbosum . . . . .                        |                 |
| Lady Darmonth . . . . .                        |           | Gem . . . . .                               |                 |
| Leon Leguay . . . . .                          |           | Gloire de Bordeaux . . . . .                |                 |
| Louis Lelandais . . . . .                      |           | Louis Napoleon . . . . .                    |                 |
| Madame Lemichez . . . . . 24 kr. bis           | 36 —      | Pericles . . . . .                          |                 |
| Madame Haquin . . . . .                        |           | paniculatum . . . . . 24 kr. bis            | 36 —            |
| Madame Lebois . . . . .                        |           | perfection . . . . .                        |                 |
| Madame Sonntag . . . . .                       |           | reptans . . . . .                           |                 |
| Mazeppa . . . . .                              |           | triomphe du Faubourg . . . . .              |                 |
| Nonpareille . . . . .                          |           | triomphe de Liège . . . . .                 |                 |
| Nil desparandum . . . . .                      |           | Souvenir de Liège . . . . .                 |                 |
| ochroleuca . . . . .                           |           | Immortalité de M. Louise . . . . .          |                 |
| Orion . . . . .                                |           | species sub Moletta . . . . .               |                 |
| Princeps . . . . .                             |           | riesenhaft.                                 |                 |
| Queen Turville . . . . .                       |           | Hemiandra pungens . . . . .                 | 2 —             |
| Roi des fuchsias . . . . .                     |           | Hibiscus Franciscanus . . . . .             | 1 —             |
| seratifolia alba . . . . .                     |           | Weldenii . . . . .                          | 1 —             |
| Snowball . . . . .                             |           | Hovea Celsii latifolia . . . . .            | 1 30            |
| syringiflora . . . . .                         |           | ilicifolia . . . . .                        | 3 30            |
| splendidissima . . . . .                       |           | linearis . . . . .                          | 1 30            |
| Volteiguer . . . . .                           |           | longifolia . . . . .                        | 1 —             |
| viele ältere Sorten . . . . . 18 kr. bis       | 12 —      | pungens major . . . . .                     | 2 —             |
| ditto . . . . . pr. 12 Stück                   | 3 —       | purpurea . . . . . 24 kr. bis               | 1 12            |

|  | n. | kr. |   | n.  | kr. |
|--|----|-----|---|-----|-----|
| Hydrangea altissima . . . . .            | —  | 24  | Lechnautia oblata . . . . .                 | —   | 30  |
| involucrata . . . . .                    | 1  | 30  | biloba, blaublühend . . . . .               | —   | 30  |
| japonica . . . . . 24 kr. bis            | —  | 48  | grandiflora . . . . .                       | —   | 36  |
| fol. var. . . . .                        | 1  | —   | multicolor . . . . . 36 kr. bis             | 1   | —   |
| pubescens, neu . . . . . 48              | —  | 130 | splendens . . . . . 36 „ „                  | 1   | —   |
| Hypericum japonicum . . . . .            | —  | 36  | Leptospermum persiciflorum, schön . . . . . | —   | 30  |
| Hypocalymna Cuninghamsi . . . . .        | —  | —   | Leucopogon Cuninghamsi, sehr schöne         | —   | —   |
| Ilex latifolia . . . . . fl. 1 bis       | 3  | —   | Winterblume . . . . .                       | 130 | —   |
| microcarpa . . . . .                     | 3  | 30  | affinis . . . . .                           | 2   | —   |
| cornuta . . . . .                        | 7  | —   | Drummondi . . . . .                         | —   | —   |
| furcata . . . . .                        | 7  | —   | floribundum . . . . .                       | —   | —   |
| Perado . . . . . „ 1 „                   | 2  | —   | Ligustrum ovalifolium . . . . .             | —   | 36  |
| Tarajo . . . . . „ 1 „                   | 3  | —   | Lilium, s. Staudengewächse.                 | —   | —   |
| Imatophyllum (f. Clivia) . . . . .       | —  | —   | Liparia hirsuta . . . . . 36 kr. bis        | 1   | 30  |
| Indigofera australis . . . . .           | —  | 30  | Loasa volubilis, Schlingpflanze . . . . .   | —   | 24  |
| speciosa . . . . . 30 kr. bis            | 1  | —   | Lobelia erinoides hybr. . . . .             | —   | 24  |
| decora, neu, vorzüglich 36 „ „           | 1  | —   | Erinus grandiflora . . . . .                | —   | 24  |
| Dosua, ausdauernd, sehr schön . . . . .  | —  | 24  | Thapsaidea (nicotianaeifolia) . . . . .     | 1   | —   |
| incana . . . . .                         | —  | 24  | angulata, Ampelpflanze . . . . .            | —   | 24  |
| Isopogon sp. . . . .                     | 1  | 12  | picta, niedrig . . . . .                    | 1   | 12  |
| Jachlia fuchsioides . . . . . 36 kr. bis | 1  | —   | andere bei den Staudengewächsen.            | —   | —   |
| Jacksonia trifurcata . . . . .           | —  | —   | Lomatia ilicifolia . . . . . fl. 1 bis      | 2   | —   |
| Jasminum triumphans . . . . .            | —  | 24  | longifolia . . . . .                        | 1   | 12  |
| affine . . . . .                         | —  | 24  | Lophospermum striatum . . . . .             | —   | 24  |
| arbusculum . . . . .                     | —  | 36  | Luculia gratissima . . . . .                | —   | —   |
| Bidwellianum, sehr fein . . . . .        | —  | 48  | Pineana . . . . .                           | 3   | —   |
| caudatum, großblättrig . . . . .         | 1  | —   | Luxemburgia ciliosa . . . . .               | 5   | —   |
| dianthifolium, neu . . . . .             | —  | 36  | Maclaena cordata . . . . .                  | 3   | —   |
| grandiflorum . . . . .                   | —  | 30  | Mahonia, s. Berberis.                       | —   | —   |
| nudiflorum, Winterblume . . . . .        | —  | 36  | Magnolia fuscata . . . . . fl. 1 bis        | 2   | —   |
| Poiteau, sehr empfehlenswerth . . . . .  | —  | 36  | grandiflora . . . . . 30 kr. bis            | 2   | —   |
| simplicifolium . . . . .                 | —  | 36  | praecox . . . . . fl. 2 bis                 | 8   | —   |
| Juniperus, bei den Coniferen.            | —  | —   | duplex . . . . .                            | 2   | 30  |
| Kadsura japonica, windend 24 kr. bis     | —  | 48  | rotundifolia . . . . . fl. 2 bis            | 4   | —   |
| Kennedyia bimaculata . . . . .           | —  | 24  | Hartwisi . . . . . „ 2 „                    | 5   | —   |
| alba . . . . . fl. 1 bis                 | 2  | —   | Mandevillea suaveolens, Schlingpflanze      | —   | 36  |
| fol. varieg. . . . .                     | 1  | 12  | Maurandia Barclayana, ditto . . . . .       | —   | 24  |
| latifolia . . . . .                      | —  | 24  | Melaleuca acrotrichoides . . . . .          | 2   | —   |
| Baumanni . . . . . 24 kr. bis            | —  | 48  | violacea . . . . .                          | 2   | —   |
| longiracemosa . . . . .                  | —  | 30  | Merandera sobilifera . . . . .              | 1   | 30  |
| macrophylla . . . . . 30 kr. bis         | 1  | 30  | Metrosideros semperflorens fl. 1 bis        | 1   | 30  |
| Lindleyana . . . . .                     | 1  | 30  | speciosus, stark . . . . .                  | 2   | —   |
| eximia . . . . . 30 kr. bis              | 1  | —   | crassifolia . . . . .                       | 5   | —   |
| rotundifolia . . . . . 30 „ „            | 1  | —   | albicans (Angophora) . fl. 1 bis            | 2   | —   |
| splendens (Dioclea) 30 „ „               | 1  | 12  | florida (Angophora) . „ 1 „                 | 2   | —   |
| andere unter Zichia.                     | —  | —   | buxifolia . . . . .                         | 1   | —   |
| Lachnaea purpurea . . . . .              | 2  | —   | Die drei Letzteren sind vorzügliche Decora- | —   | —   |
| Lagerstromia indica . . . . . 48 kr. bis | 1  | 30  | tionspflanzen.                              | —   | —   |
| Lalage ornata . . . . .                  | —  | —   | Mimosa prostrata, Schlingpflanze . . . . .  | —   | 36  |
| hoveaeifolia . . . . .                   | 4  | —   | Mirbelia Baxteri . . . . . 48 kr. bis       | 1   | 12  |
| Lantana aurantia . . . . .               | —  | 24  | grandiflora . . . . .                       | 2   | 30  |
| delicatissima . . . . .                  | —  | 24  | ilicifolia . . . . . fl. 2 bis              | 3   | —   |
| Meleni . . . . .                         | —  | 36  | reticulata, (triternata) . . . . .          | —   | 48  |
| Youngii . . . . .                        | —  | 24  | Mitraria coccinea . 30 kr. bis              | 1   | —   |
| crocea . . . . .                         | —  | 24  | Moniera crotalaroides . . . . .             | —   | 30  |
| purpurea . . . . .                       | —  | 36  | Myosotis azorica . . . . .                  | —   | 24  |
| multiflora . . . . .                     | —  | 36  | Myrtus lusitanica et var . . . . .          | —   | 24  |
| excelsa . . . . .                        | —  | 36  | fl. pleno . . . . .                         | —   | 30  |
| Lapageria rosea . . . . .                | —  | —   | costa Ricensis . . . . .                    | 1   | 30  |
| Lassiopetalum grandiflorum 30 kr. bis    | 1  | —   | tenuifolia (Hügel) . . . . .                | —   | 30  |
| pulchellum, sehr schön . . fl. 1 bis     | 2  | —   | buxifolia (Metrosideros) . . . . .          | 1   | —   |



|  | fl.        | kr.  |  | fl.               | kr.  |
|--|------------|------|--|-------------------|------|
| <i>Neillia thyrsiflora</i> . . . . .   | fl. 1 bis  | 2 30 | <i>Primula undulata</i> , neu . . . . .                                    |                   | 48   |
| <i>Nerium Oleander</i> , in verschiednen, weißen,<br>dunkelrothen und gefärbten Sorten | 30 kr. bis | 2 —  | <i>denticulata</i> . . . . .   |                   | 48   |
| <i>luteum</i> fl. pleno . . . . .  |            | 2 —  | <i>chinensis albo pleno</i> . . . . .                                      | fl. 1 bis         | 1 30 |
| <i>Oerionmyrthus floribundus</i> . . . . .   |            | 1 30 | <i>rubro pleno</i> . . . . .   |                   | 30   |
| <i>Olea excelsa (Jlex)</i> . . . . .   |            | 1 12 | <i>marginata</i> . . . . .   |                   | 30   |
| <i>Oxalis elegans atrorubens</i> . . . . .   |            | — 36 | <i>involverata</i> . . . . .   |                   | 30   |
| <i>Ottomis</i> . . . . .   |            | — 36 | <i>Pronaya elegans</i> . . . . .   | fl. 1 bis         | 2 —  |
| <i>Oxilobium buxifolium</i> . . . . .  |            | 1 30 | <i>Prostranthera grandiflora</i> . . . . .                                 | 30 kr. bis        | 1 —  |
| <i>cordifolium</i> . . . . .   |            | — 30 | <i>Lassianthus</i> . . . . .   |                   | 1 —  |
| <i>Pultenaea</i> . . . . .   |            | 1 30 | <i>violacea</i> . . . . .  |                   | 30   |
| <i>pupureum</i> . . . . .  |            | 2 —  | <i>Podocarpus</i> , bei den Coniferen.                                     |                   |      |
| <i>Origanum sibilium</i> . . . . .   |            | — 24 | <i>Pultenaea biloba</i> . . . . .  |                   | 1 30 |
| <i>Paeonia</i> , s. Gehölze.   |            |      | <i>Paxtoni</i> . . . . .   |                   | 4 —  |
| <i>Panax arboreum (aust.)</i> . . . . .  |            | 2 —  | <i>speciosa</i> . . . . .  |                   | 4 —  |
| <i>Parsonsia heterophylla</i> . . . . .  |            | 1 —  | <i>acutifolia</i> . . . . .  |                   | 4 —  |
| <i>Passiflora caerulea</i> . . . . .   |            | — 24 | <i>tenuifolia</i> . . . . .  |                   | 2 —  |
| <i>onichyna</i> . . . . .  |            | — 30 | <i>subumbellata</i> . . . . .  | 24 kr. bis        | 36   |
| <i>Shropeana</i> . . . . .   |            | — 30 | <i>Punica granatum</i> . . . . .   | fl. 1 #           | 3 —  |
| <i>Pavia californica</i> . . . . .   | fl. 3 bis  | 10 — | <i>albo pleno (vera)</i> . . . . .   | fl. 1, 30 kr. bis | 3 30 |
| <i>Pelargonium</i> , besonders verzeichnet.  |            |      | <i>fl. pleno</i> . . . . .   | fl. 1 #           | 5 —  |
| <i>Penstemon</i> , s. Staudengewächse.   |            |      | <i>nana</i> , Kronbäumchen . . . . .                                       |                   | 5 —  |
| <i>Pernetia phyllaeifolia</i> . . . . .  | 30 kr. bis | 1 —  | <i>schöne große Drangerie-Bäume von</i> . . . . .                          | fl. 15 bis        | 33 — |
| <i>ciliaris</i> . . . . .  |            | 1 —  | <i>Quercus lanuginosa</i> . . . . .  |                   | 2 —  |
| <i>species nova</i> . . . . .  |            | 1 —  | <i>Rhododendron</i> , nachfolg. besonders verzeichnet.                     |                   |      |
| <i>Petunia</i> , schöne neue Sorten und Sämlinge                                       | 12 kr. bis | — 24 | <i>Rhodolea Championi</i> , sehr ge-<br>rühmte Neuheit . . . . .           |                   | —    |
| <i>Philadelphus mexicanus</i> . . . . .  | 30 # #     | 1 —  | <i>Rhyncospermum jasminoides</i> , schöne<br>neue Schlingpflanze . . . . . |                   | 1 30 |
| <i>Phlox Drummondii et var.</i> . . . . .  |            | — 24 | <i>Rochea falcata</i> . . . . .  |                   | 48   |
| <i>Phormium tenax</i> . . . . .  | 30 kr. bis | 2 —  | <i>Roella ciliaris</i> . . . . .   |                   | 36   |
| <i>Phrisia peduncularis</i> . . . . .  |            | 1 —  | <i>Russelia juncea</i> . . . . .   | 24 kr. bis        | 2 —  |
| <i>Phylica ericoïdes</i> . . . . .   |            | — 24 | <i>multiflora</i> . . . . .  |                   | 1 —  |
| <i>Phylodadus</i> bei den Coniferen.   |            |      | <i>Salvia Lilleana</i> . . . . .   |                   | 1 30 |
| <i>Physianthus undulaefolius</i> . . . . .   |            | — 48 | <i>Scutellaria ventenata</i> . . . . .                                     |                   | 48   |
| <i>Pinella decussata</i> . . . . .   | 24 kr. bis | 1 —  | <i>canescens</i> . . . . .   |                   | 48   |
| <i>Hendersonii</i> . . . . .   | fl. 1 bis  | 2 —  | <i>Skimmia japonica</i> . . . . .  |                   | 12 — |
| <i>arenaria</i> . . . . .  |            | 1 12 | <i>Silene orientalis</i> . . . . .   |                   | 24   |
| <i>Gnidia</i> . . . . .  |            | 5 —  | <i>Solanum Meyeri</i> , Schlingpflanze . . . . .                           |                   | 1 —  |
| <i>Lorainiana</i> . . . . .  |            | 5 —  | <i>Sollya heterophylla</i> , bitte . . . . .                               | 24 kr. bis        | 48   |
| <i>Neippergii</i> . . . . .  |            | 1 30 | <i>salicifolia</i> . . . . .   |                   | 48   |
| <i>lineoides</i> . . . . .   |            | 1 12 | <i>Drummondii</i> . . . . .  |                   | 1 30 |
| <i>macrocephala</i> . . . . .  |            | 2 —  | <i>Stadtmanii australis</i> . . . . .                                      |                   | 3 30 |
| <i>spectabilis</i> . . . . .   | fl. 1. bis | 3 —  | <i>Stylidium fasciculatum</i> . . . . .                                    |                   | 30   |
| <i>Verschaffeltii</i> . . . . .  |            | 1 —  | <i>Armeria</i> . . . . .   |                   | 1 30 |
| <i>Pinus</i> , bei den Coniferen.  |            |      | <i>Styphelia tubiflora</i> . . . . .                                       |                   | 3 —  |
| <i>Pittosporum Tobira (chinense)</i> . . . . .   |            |      | <i>splendens</i> . . . . .   |                   | 12 — |
| <i>fol. var.</i> . . . . .   | 30 kr. bis | 1 30 | <i>Swainsonia purpurea</i> . . . . .                                       |                   | 30   |
| <i>Platilobium parviflorum?</i> . . . . .  | fl. 1 bis  | 2 —  | <i>Greyana</i> . . . . .   |                   | 1 —  |
| <i>Plumbago capensis (caerulea)</i> . . . . .  |            | — 30 | <i>Swanerdamia antenaria</i> . . . . .                                     |                   | 7 —  |
| <i>Larpenae</i> , neu . . . . .  | 18 kr. bis | — 36 | <i>Syphocampylus bicolor</i> . . . . .                                     |                   | 24   |
| <i>Podolobium staurophyllum</i> . . . . .  | fl. 1 #    | 2 —  | <i>betulaefolius</i> . . . . .   |                   | 12   |
| <i>berberifolium</i> . . . . .   |            | — 2  | <i>nitidus</i> . . . . .   | 48 kr. bis        | 1 —  |
| <i>Polygala Dalmaisiana</i> . . . . .  |            | — 30 | <i>Syptoropia europaea</i> , schöne Ampelpflanze . . . . .                 |                   | 24   |
| <i>borboniaefolia</i> . . . . .  |            | 1 —  | <i>Tacsonia Helleri</i> . . . . .  |                   | 1 —  |
| <i>Polygonum rotundifolium</i> , hirtige   |            |      | <i>splendens</i> . . . . .   |                   | 1 30 |
| <i>Schlingpflanze</i> . . . . .  | 24 kr. bis | 1 —  | <i>Tägelia bituminosa</i> . . . . .  |                   | 1 30 |
| <i>adpressum</i> . . . . .   |            | — 24 | <i>Taxodium</i> , bei den Coniferen.                                       |                   |      |
| <i>viviparoides</i> . . . . .  |            | — 24 | <i>Templetonia glauca</i> . . . . .  |                   | 1 30 |
| <i>vaccinifolium</i> . . . . .   |            | — 24 | <i>retusa</i> . . . . .  | 36 kr. bis        | 3 —  |

|   | fl. kr. |   | fl. kr. |
|---|---------|---|---------|
| <i>Thea asamica</i> . . . . .                       | 1 30    | <i>Veronica formosa</i> . . . . .                   | — 30    |
| <i>bohea maxima</i> . . . . .                       | 1 12    | <i>speciosa</i> . . . . . 30 kr. bis                | 1 30    |
| <i>viridis</i> . . . . .                            | 1 —     | <i>Andersoni</i> . . . . . 30 kr. bis               | 1 30    |
| <i>Tetranema japonica</i> . . . . .                 | 1 —     | <i>Liabaudi</i> . . . . .                           | 1 30    |
| <i>Thibaudaea glabra</i> . . . . . fl. 2 bis        | 5 —     | <i>Vesalia</i> , f. <i>Abelia</i> . . . . .         | —       |
| <i>setigera</i> . . . . . " 2 "                     | 5 —     | <i>Viburnum</i> , bei den Gehölzen.                 | —       |
| <i>Thunbergia alata</i> und variet. pr. Stck.       | — 24    | <i>macrocephalum</i> , ächt. . . . .                | 5 —     |
| <i>Tigridia conchiflora</i> . . . . .               | — 24    | <i>grandiflorum</i> . . . . .                       | 2 30    |
| <i>minor</i> . . . . .                              | — 36    | <i>nepalense</i> . . . . .                          | —       |
| <i>pavonia coccinea</i> . . . . .                   | — 36    | <i>plicatum</i> , ächt. . . . .                     | 3 —     |
| <i>fulgens</i> . . . . .                            | — 36    | <i>suspensum</i> , neu . . . . .                    | 1 12    |
| <i>splendens</i> . . . . .                          | — 36    | <i>Vinca arb. et var.</i> . . . .                   | — 24    |
| <i>Tremandra verticillata</i> ( <i>Tetralthea</i> ) | —       | <i>Volkameria japonica</i> . . . . . 30 kr. bis     | 1 —     |
| 30 kr. bis  | 2 —     | fl. rubr. simplex 30 " "                            | 1 —     |
| <i>Tritonia aurea</i> , neu, prächtig               | 2 —     | <i>Westringia longifolia</i> . . . . . 30 " "       | 1 12    |
| <i>Tropaeolum Lobbianum</i> . . . . .               | — 30    | <i>Witzenia corymbosa</i> . . . . .                 | 1 —     |
| <i>Hocki</i> . . . . .                              | — 30    | <i>Xanthorhea intermedia</i> . . . . .              | 5 —     |
| <i>Caroline Schmidt</i> . . . . .                   | — 30    | <i>Xanthosia rotundifolia</i> . . . . . 30 kr. bis  | 1 —     |
| <i>Lili Schmidt</i> . . . . .                       | — 30    | <i>Yucca Draconis</i> fol. var. . . . .             | 2 30    |
| <i>Schenkii</i> . . . . .                           | 1 —     | <i>californica</i> . . . . .                        | —       |
| <i>Triomphe de Gand</i> . . . . .                   | — 30    | <i>filamentosa</i> fol. var. . . . .                | —       |
| <i>minus fl. pleno</i> . . . . .                    | — 24    | <i>pendula</i> ( <i>pecurva</i> ) fl. 1. 30 kr. bis | 5 —     |
| <i>tricolorum</i> . . . . .                         | 1 12    | <i>flaccida</i> . . . . . fl. 1. 30 kr. bis         | 5 —     |
| <i>Tussilago Sieboldi</i> . . . . . fl. 1 bis       | 2 —     | <i>Ziera laevigata</i> . . . . . 30 kr. bis         | 1 —     |
| <i>Twedea cœrulea</i> . . . . .                     | — 30    | <i>macrophylla</i> . . . . .                        | —       |
| <i>Ulex stricta</i> . . . . .                       | — 24    | <i>Zichya Hügelii</i> . . . . .                     | 1 30    |
| <i>europæus fl. pleno</i> . . . . .                 | — 24    | <i>Molly</i> . . . . .                              | 1 30    |
| <i>Ungnadia speciosa</i> . . . . .                  | —       | <i>pannosa</i> . . . . . fl. 1. 30 kr. bis          | 2 —     |
| <i>Vallota purpurea</i> . . . . .                   | 1 —     | <i>rotundifolia</i> . . . . . 30 " "                | 1 30    |
| <i>Veltheimia uvaria</i> . . . . . 24 kr. bis       | 1 —     | <i>tricolor</i> . . . . .                           | 1 30    |
| <i>Verbena</i> , vorangehend besonders vergleicht.  | —       | <i>Zauschneria californica</i> , . . . . .          | — 24    |

## Pelargonium,

neue grossblumigte, Fantasie- und Scarlet.

|  | fl. kr. |   | fl. kr. |
|--|---------|---|---------|
| a. Grossblumigte neueste Varietäten: von Mr. Odier.            |         | b. Grossblumigte Varietäten:                  |         |
| Originalpflanzen pr. Stück netto                               | 5 —     | <i>Ajax</i> ( <i>Hoyle</i> ) . . . . .        | 1 —     |
| Vermehrung im Frühjahr, so weit sie reicht . . . . . pr. Stück | 2 30    | <i>Aspasie</i> . . . . .                      | 1 —     |
| <i>Auguste Mieliez</i> . . . . .                               | —       | <i>Beauty of Clapham</i> . . . . .            | — 30    |
| <i>Colonel Foissy</i> . . . . .                                | —       | <i>Beauty of Montpellier</i> . . . . .        | 1 —     |
| <i>Elise Mieliez</i> . . . . .                                 | —       | <i>Brilliant</i> ( <i>Topping</i> ) . . . . . | 1 —     |
| <i>Etoile des jardins</i> . . . . .                            | —       | <i>Cameleon</i> ( <i>Demay</i> ) . . . . .    | 1 —     |
| <i>Gen. E. Cavaignac</i> . . . . .                             | —       | <i>Cassandra</i> ( <i>Beck</i> ) . . . . .    | — 30    |
| <i>Gloire de Bellevue</i> . . . . .                            | —       | <i>Centurion</i> ( <i>Beck</i> ) . . . . .    | — 30    |
| <i>Gustave Odier</i> . . . . .                                 | —       | <i>Choix d'un amateur</i> . . . . .           | — 30    |
| <i>James Odier</i> . . . . .                                   | —       | <i>Clarinda</i> . . . . .                     | — 30    |
| <i>Mad. de Lamoricière</i> . . . . .                           | —       | <i>Comte Dutertre</i> . . . . .               | 1 —     |
| <i>Triomphe de Latour</i> . . . . .                            | —       | <i>Constance</i> ( <i>Foster</i> ) . . . . .  | 1 —     |
|  |         | <i>Crusader</i> ( <i>Hoyle</i> ) . . . . .    | — 30    |
|  |         | <i>Desiré Le Mire</i> . . . . .               | 1 —     |
|  |         | <i>Fénélon</i> ( <i>Bataille</i> ) . . . . .  | 1 —     |



|   | fl. | kr. |  | fl. | kr. |
|---|-----|-----|--|-----|-----|
| Fireball . . .                          | 1   | —   | Hébé ( <i>Chauvière</i> ) . . .              | 30  | —   |
| Fulminans, <i>R.</i> . . .              | 30  | —   | Henriette Le Mire . . .                      | 1   | —   |
| Generalissimo . . .                     | 1   | —   | Itolinsky . . .                              | 30  | —   |
| Guilma ( <i>Beck</i> ) . . .            | 30  | —   | Julie Beauval . . .                          | 30  | —   |
| Jenny Lind ( <i>Foster</i> ) . . .      | 30  | —   | Lady Flora . . .                             | 30  | —   |
| Jenny Lind ( <i>Lyne</i> ) . . .        | 30  | —   | La Pensée ( <i>Belperche</i> ) . . .         | 1   | —   |
| Jupiter ( <i>Demay</i> ) . . .          | 1   | —   | Little Wonder ( <i>Sheppard</i> ) . . .      | 1   | —   |
| Lightning ( <i>Gaines</i> ) . . .       | 30  | —   | Lorenzo . . .                                | 1   | —   |
| Magnificent ( <i>Foquet</i> ) . . .     | 1   | —   | Madame Boucharlat ( <i>Chauvière</i> ) . . . | 30  | —   |
| Malvina . . .                           | 1   | —   | Madame Bourgeois ( <i>Beck</i> ) . . .       | 1   | —   |
| Marquis de Niana . . .                  | 1   | —   | Marie ( <i>Chauvière</i> ) . . .             | 30  | —   |
| May-Quen ( <i>Hoyle</i> ) . . .         | 1   | —   | Marion . . .                                 | 1   | —   |
| Model ( <i>Gaines</i> ) . . .           | 30  | —   | Mazeppa superb . . .                         | 30  | —   |
| Nepaulese Prince . . .                  | 1   | —   | Miniature . . .                              | 30  | —   |
| Nonsuch ( <i>Henderson</i> ) . . .      | 1   | —   | Moricaud ( <i>Demay</i> ) . . .              | 1   | —   |
| Norah ( <i>Foster</i> ) . . .           | 30  | —   | Mulatto . . .                                | 30  | —   |
| Orion ( <i>Foster</i> ) . . .           | 30  | —   | Petit bijou . . .                            | 30  | —   |
| Painter . . .                           | 1   | —   | Pictum ( <i>Gaines</i> ) . . .               | 30  | —   |
| Pie IX. ( <i>Demay</i> ) . . .          | 1   | —   | Princesse Marie Gallizin . . .               | 30  | —   |
| Prince of Orange ( <i>Hoyle</i> ) . . . | 1   | —   | Proserpine . . .                             | 30  | —   |
| Princesse royale . . .                  | 1   | —   | Rosalie ( <i>Dufoy</i> ) . . .               | 1   | —   |
| Pulcherie ( <i>Chauvière</i> ) . . .    | 1   | —   | Silène . . .                                 | 30  | —   |
| Purple standart . . .                   | 1   | —   | Tousant l'Ouverture . . .                    | 30  | —   |
| Rosamund ( <i>Beck</i> ) . . .          | 30  | —   | Victor Sydenham . . .                        | 30  | —   |
| Roweanum ( <i>Turner</i> ) . . .        | 1   | —   | Zoë . . .                                    | 30  | —   |
| Rosy Girl . . .                         | 30  | —   |  |     |     |
| Salamander ( <i>Gaines</i> ) . . .      | 30  | —   |  |     |     |
| Star ( <i>Beck</i> ) . . .              | 1   | —   |  |     |     |
| Star of the West ( <i>Lyne</i> ) . . .  | 30  | —   |  |     |     |
| Sully ( <i>Demay</i> ) . . .            | 1   | —   |  |     |     |
| The Peri ( <i>Lyne</i> ) . . .          | 30  | —   |  |     |     |
| Victory ( <i>Foster</i> ) . . .         | 30  | —   |  |     |     |

c. Fantasie-Pelargonium:

|                                    |    |   |
|------------------------------------|----|---|
| Amélie . . .                       | 30 | — |
| Anais perfectum . . .              | 1  | — |
| Beauté Belperche . . .             | 1  | — |
| Beauty of Winchester . . .         | 30 | — |
| Clown ( <i>Beck</i> ) . . .        | 1  | — |
| Curiosity ( <i>Ivery</i> ) . . .   | 30 | — |
| Delicatum ( <i>Ambrose</i> ) . . . | 1  | — |
| Duchesse de Praslin . . .          | 30 | — |
| Elien ( <i>Chauvière</i> ) . . .   | 1  | — |
| Fanny . . .                        | 1  | — |
| Gaiety ( <i>Ambrose</i> ) . . .    | 1  | — |
| Galathé ( <i>Demay</i> ) . . .     | 1  | — |
| Harlequin ( <i>Beck</i> ) . . .    | 30 | — |

d. Scarlet-Pelargonien:

pr. Stück 24 kr. bis 36 kr.

|                              |    |   |
|------------------------------|----|---|
| Amazone . . .                | 30 | — |
| Beauté de Passy . . .        | 30 | — |
| Beauty of the Parterre . . . | 30 | — |
| Commandeur en Chef . . .     | 30 | — |
| Fair Ellen . . .             | 30 | — |
| Fireball . . .               | 30 | — |
| Flower of the day . . .      | 30 | — |
| General Tom Tumb . . .       | 30 | — |
| Hydrangeæflorum . . .        | 30 | — |
| Lady Hastings . . .          | 30 | — |
| Le Titien . . .              | 30 | — |
| Lord Harkaway . . .          | 30 | — |
| Queen of Summer . . .        | 30 | — |
| Queen of Scarlet . . .       | 30 | — |
| Queen superb . . .           | 30 | — |
| Scarlet defiance . . .       | 30 | — |
| Tom Thums Master . . .       | 30 | — |

# Einige Warmhauspflanzen.

|   | fl. kr.    |   | fl. kr.    |
|---|------------|---|------------|
| Achymenes. Hier von verzeichnen wir nur die Neueren, als: |            |   |            |
| A Severin.  |            | Asclepias carnosa (Hoya)  | 30         |
| Boothii variegata   |            | pieta (variegata) fl. 3 bis   | 6          |
| Carl Wohlfahrt  |            | Barbacenia Rogieri  | 48         |
| Coelestina  |            | Bambusa arundinacea   | 48         |
| Cuprea  |            | Begonia albo-coccinea   | 1          |
| Caspar Schintz  |            | coccinea  | 30 kr. bis |
| François Cardinau   |            | manicata hydrocotilifolia   | 30         |
| Freund Moschkowitz  |            | cinnabarina   | 1          |
| Freund Schwabe  |            | maxima  | 1 30       |
| Lilacina  |            | princeps  | 1 30       |
| Louis Van Houtte  |            | stigmosa  | 1          |
| Majör Füssli  | pr. Stück  | Bletia Tankervillae (Orch.)   | 1          |
| Madame Rendatler  | 24         | verecunda   | 30         |
| Mr. de Parpart  |            | Bignonia Carolinae  | 1 12       |
| Mr. de Rougemont  |            | Chamberlaini  | 1 12       |
| Mackoyi   |            | Bonapartia juncea, fast   | 7          |
| Napoleon Rossi  |            | Bouvardia leiantha, blühet im Winter  | 1          |
| pulchella   |            | (im Sommer auspflanzen)   | 24 kr. bis |
| Theodor Fröbel  |            | longiflora  | 1          |
| Sir T. Thomas   |            | Bromelia humilis  | 1          |
| longiflora alba   |            | Brownea grandiceps  | 15         |
| nana  |            | Brugmansia floribunda (Joanullos)   | 1          |
| latifrons   |            | Caladium bicolor  | 1 30       |
| Margarethae   |            | bicolor picturatum  | 3          |
| viele ältere Sorten a.                                    | 12         | hamatosigmon  | 2          |
| Aechmea fulgens (Tillandsia)                              | 1 30       | macrophyllum  | 1 30       |
| discolor  | 1 30       | nymphaefolium   | 2          |
| miniata discolor  | 2          | seguinum pictum (Diefenb.)  | —          |
| Aerides crispum (Orch.)                                   | 20         | versicolor  | 48         |
| Aeschynanthus, diverse                                    | 30 kr. bis | NB. Mehrere dieser Caladien ertragen die Auspflanzung im Sommer, und sind dann als prächtige Blütpflanzen von bedeutendem Effect. |            |
| pulchellus albus  | 1          | Campylobotrys discolor  | 1 30       |
| Agalmyla-staminea   | 1          | Canna, bei den Gewächshauspflanzen.   | —          |
| Agave filifera  | 7          | Capanea grandiflora   | 1          |
| Allamanda cathartica                                      | 1          | Carludowica humilis   | —          |
| neriifolia  | 2          | Cattleya crispa (Orch.)   | 10         |
| parensis  | 1 12       | Centradenia divaricata  | 30         |
| Schottii  | 1 12       | Chamaedorea concolor (Palme)  | 8          |
| Alopectus Schlimm   | 5          | clatior   | —          |
| speciosus   | 1          | Schideana   | 4          |
| Alpinia sp. scarlet, (China)                              | 3 30       | Chamaerops humilis (Palme)  | 4          |
| Anthurium Galleottianum                                   | 1          | Palmetto  | 5          |
| Ottomanum   | 1          | sinensis (arborescens)  | 7          |
| Aphelandra micans   | 2          | Chirita Moonii  | 48         |
| Porteana  | 2          | Walkeri   | 48         |
| Aralia capitata   | 3          | Chysis bractescens (Orch.)  | 10         |
| elegans   | 2 30       | Clerodendron Devonianum   | 1 30       |
| nymphaefolia  | 7          | fallax superbum   | 2          |
| palmata   | 7          | fetidum   | 6          |
| quinquefolia  | 7          | glaucom   | 48         |
| Ardisia grenulata   | 30 kr. bis | volubile  | 30         |
| Areca rubra (Palme)                                       | 2 30       | paniculatum   | 48         |
| Artocarpus imperialis                                     | 5          | speciosissimum  | 1 30       |
|   |            | Chirita Zeylanica   | 24         |



|  | fl. | kr. |   | fl. | kr. |
|--|-----|-----|---|-----|-----|
| <i>Cissus discolor</i> , prächtig bauchblättrig . . .  | 1   | 30  | <i>Franciscæa angusta</i> . . .                   | 1   | 30  |
| <i>vitigenus</i> . . .                                 |     |     | <i>llopecana</i> . . . 48 kr. bis                 | 1   | 30  |
| <i>Combretum macrophyllum</i> fl. 2 bis                | 3   | —   | <i>hydrangæformis (macrophylla)</i>               | 1   | 30  |
| <i>Conoclinium janthinum</i> . . .                     | 1   | 12  | <i>eximia</i> . . .                               | 1   | 30  |
| <i>Cordylina australis (Dracaena)</i> . . .            | 2   | —   | <i>villosa</i> . . .                              | 1   | 12  |
| <i>spectabilis</i> . . .                               | 2   | 30  | <i>Gardenia Stanleyana</i> . . .                  | 2   | —   |
| <i>rubra</i> . . .                                     | 1   | 30  | <i>Geissomeria longiflora</i> , schöne Winterblau | 1   | 12  |
| <i>congesta</i> . . .                                  | 1   | 12  | <i>Gesneria Geroltiana</i> . . .                  | 1   | —   |
| <i>Costus speciosus</i> . . .                          | 30  | —   | <i>discolor</i> . . .                             | 1   | —   |
| <i>Curculigo recurvata</i> . . .                       | 1   | 12  | <i>Leopoldi</i> . . .                             | 5   | —   |
| <i>Cymbidium aloëfolium (Orch.)</i> . . .              | 1   | —   | <i>macrantha</i> . . .                            | 48  | —   |
| <i>ensifolium</i> . . .                                | 1   | —   | <i>sp. de Perdrigo</i> . . .                      | 1   | 30  |
| <i>Cyperus papyrus</i> . . .                           | 2   | —   | <i>Zehrina splendens</i> . . .                    | 1   | —   |
| <i>alternifolius</i> . . .                             | 1   | 12  | <i>Gloxinia Marie Van Houtte</i> . . .            | 1   | —   |
| <i>Cyrtoceras reflexa</i> . . .                        | 1   | 12  | <i>viele andere, schöne Sorten a</i> . . .        | 30  | —   |
| <i>Dasilyrion angustifolium</i> . . .                  | 5   | —   | <i>Griffinia speciosa</i> . . .                   | 5   | —   |
| <i>juncum</i> . . . fl. 3 bis                          | 15  | —   | <i>Heliconia farinosa</i> . . .                   | 1   | —   |
| <i>Dendrobium densiflorum (Orch.)</i> . . .            | 7   | —   | <i>discolor</i> . . .                             | 1   | 30  |
| <i>speciosum</i> . . . fl. 2 bis                       | 3   | —   | <i>Heterocentron roseum</i> . . .                 | 30  | —   |
| <i>Dichondra sericea</i> , für Hängevase . . .         | 30  | —   | <i>Hexacentris mysorensis</i> fl. 5 bis           | 12  | —   |
| <i>Dichorisandra ovalifolia</i> , sehr schön fl. 1 bis | 2   | —   | <i>Hedichium coronarium</i> . . .                 | 30  | —   |
| <i>discolor nana</i> . . .                             | 3   | 30  | <i>Hindsia longiflora</i> . . .                   | 1   | —   |
| <i>violacea</i> . . .                                  | 2   | —   | <i>violacea</i> . . .                             | 1   | 30  |
| <i>alba</i> . . .                                      | 3   | 30  | <i>Hibiscus ros. sin. luteo pleno</i> . . .       | 1   | —   |
| <i>Diefenbachia costata</i> . . .                      | 5   | —   | <i>aurantia plena</i> . . .                       | 1   | —   |
| <i>Dioscorea bulbifera</i> . . .                       | 48  | —   | <i>punicus</i> . . .                              | 1   | —   |
| <i>discolor variegata</i> . . .                        | 2   | 30  | <i>Hoya bella</i> . . . fl. 1 bis                 | 2   | 30  |
| <i>Dracaena australis (Cordylina)</i> . . .            | 2   | —   | <i>imperialis</i> . . .                           | 2   | —   |
| <i>arborea (paniculata)</i> . . .                      | 1   | 30  | <i>variegata (Asclepias)</i> fl. 3 bis            | 6   | —   |
| <i>arborea vera</i> . . .                              | 1   | 30  | <i>Inga Harissii</i> . . . fl. 1, 30 bis          | 3   | 30  |
| <i>brasiliensis</i> . . .                              | 1   | 30  | <i>Ipomæa gossipifolia</i> . . .                  | 1   | —   |
| <i>Draco</i> . . .                                     | 1   | 30  | <i>Isolepis pygmæa</i> , für Ampel . . .          | 24  | —   |
| <i>fragrans</i> . . .                                  | 2   | —   | <i>Jaccaranda grandiflora</i> . . .               | 1   | —   |
| <i>ferrea</i> . . . fl. 1 bis                          | 1   | 30  | <i>Jasminum Maid of Orleans</i> . . .             | 1   | —   |
| <i>versicolor</i> . . . fl. 1 bis                      | 1   | 30  | <i>Justitia carnea superba</i> 30 kr. bis         | 1   | —   |
| <i>congesta (Cordylina)</i> . . . fl. 1 bis            | 3   | —   | <i>Kempferia galanga</i> . . .                    | 30  | —   |
| <i>nobilis</i> . . .                                   | 5   | —   | <i>Klugia zeylanica</i> . . .                     | 1   | 30  |
| <i>marginata</i> . . .                                 | 1   | 30  | <i>Lapageria rosea</i> . . .                      | 1   | —   |
| <i>latifolia</i> . . .                                 | 3   | —   | <i>Latania Borbonia (Palme)</i> . . .             | 10  | —   |
| <i>reflexa</i> . . .                                   | 1   | 30  | <i>Levistonia Borbonia (Palme)</i> . . .          | 1   | —   |
| <i>rubra (Cordylina)</i> . . .                         | 1   | 30  | <i>Laurus Canella</i> . . .                       | 1   | 30  |
| <i>spectabilis (Cordylina)</i> . . .                   | 2   | 30  | <i>cinnamomea</i> . . .                           | 1   | 30  |
| <i>stricta</i> . . .                                   | 1   | 30  | <i>Lycopodium apus</i> . . .                      | 18  | —   |
| <i>Duranta Bonardi</i> . . .                           | 30  | —   | <i>apoda</i> . . .                                | 18  | —   |
| <i>Elisii</i> . . .                                    | 24  | —   | <i>cæsum</i> . . .                                | 24  | —   |
| <i>Echites Melaleuca</i> . . .                         | 1   | 30  | <i>arboresum</i> . . .                            | 1   | 30  |
| <i>nutans</i> . . .                                    | 1   | 30  | <i>cordifolium</i> . . .                          | 1   | —   |
| <i>Epidendrum cinnabarinum (Orch.)</i> . . .           | 5   | —   | <i>cuspidatum</i> . . .                           | 1   | —   |
| <i>Epiphyllum truncatum bicolor</i> . . .              | 30  | —   | <i>monstrosum</i> . . .                           | 1   | —   |
| <i>elegans</i> . . .                                   | 1   | —   | <i>alatum</i> . . .                               | 1   | —   |
| <i>Russelianum</i> . . .                               | 30  | —   | <i>diffusum</i> . . .                             | 1   | —   |
| <i>Salmonæum</i> . . .                                 | 1   | —   | <i>denticulatum</i> . . .                         | 18  | —   |
| <i>Euphorbia splendens</i> . . . 30 kr. bis            | 1   | 12  | <i>Galeottæum</i> . . .                           | 24  | —   |
| <i>pulcherrima</i> . . .                               | 1   | 12  | <i>Schottii</i> . . .                             | 30  | —   |
| <i>Erionema aenea</i> . . .                            | 36  | —   | <i>stellatum</i> . . .                            | 24  | —   |
| <i>Ficus barbata</i> . . .                             | 1   | 30  | <i>stoloniferum</i> . . .                         | 24  | —   |
| <i>australis</i> . . .                                 | 1   | —   | <i>tumbrosum</i> . . .                            | 1   | —   |
| <i>Murrayana</i> . . .                                 | 2   | —   | <i>viticulosus</i> . . .                          | 1   | —   |
| <i>elastica, Gummibaum</i> . . . fl. 1 bis             | 3   | 30  | <i>Wildenowii</i> . . .                           | 1   | —   |
| <i>pergaminea</i> . . .                                | 2   | —   | <i>Magnolia pumila</i> . . .                      | 1   | 30  |
| <i>spuria</i> . . .                                    | 2   | —   | <i>Mauretia miniata</i> . . .                     | 1   | —   |
| <i>sub panduræformis</i> . . .                         | 1   | 30  |   |     |     |

|  | fl. | kr. |  | fl. | kr. |
|--|-----|-----|--|-----|-----|
| Marantha arundinacea . . . . .             | 48  | —   | Pitcarnea coccinea . . . . .                 | 1   | —   |
| bicolor . . . . .                          | 48  | —   | punicea . . . . .                            | 1   | —   |
| albo-lineata . . . . .                     | —   | —   | Plectogyne variegata . . . . .               | 30  | —   |
| roseo-lineata . . . . .                    | —   | —   | Plectranthes concolor pictus fl. 1 bis       | 2   | —   |
| sanguinea . . . . . fl. 1 bis              | 2   | —   | Pothos scolopendrifolius . . . . .           | 230 | —   |
| Selowi . . . . .                           | 130 | —   | Puya Altensteinii . . . . .                  | 112 | —   |
| truncata . . . . .                         | 230 | —   | Rondeletia speciosa . . . . .                | 112 | —   |
| vittata . . . . .                          | 6   | —   | Rogiera cordata (Rondeletia) . . . . .       | 130 | —   |
| Maximiliana regia (Palme) . . . . .        | 4   | —   | Roezli alba . . . . .                        | 130 | —   |
| Medinella magnifica . . . . .              | 5   | —   | Rhopala corcovadensis . . . . .              | 15  | —   |
| Musa Cavendishiana . . . . .               | 2   | —   | organensis nova . . . . .                    | 25  | —   |
| Zebrina . . . . .                          | 15  | —   | Russelia juncea . . . . . 30 kr. bis         | 1   | —   |
| Mussandra frondosa . . . . .               | 130 | —   | multiflora . . . . . 30 # #                  | 1   | —   |
| macrophylla . . . . .                      | 2   | —   | verticillata . . . . .                       | 1   | —   |
| Myrtus pimenta . . . . .                   | 130 | —   | Saurauja macrophylla . . . . .               | 112 | —   |
| Napoleonca Whitefieldi . . . . .           | 5   | —   | Sabal umbraculifera (Palme) . . . . .        | —   | —   |
| Nepenthes destillatoria . . . . .          | —   | —   | Sacharum officinarum . . . . .               | 48  | —   |
| Nemathanthus longipes . . . . .            | 48  | —   | Schweigeria microphylla . . . . .            | 1   | —   |
| splendens . . . . .                        | 1   | —   | pauciflora . . . . .                         | 30  | —   |
| Oncidium pulvinatum (Orch.) fl. 3 bis      | 6   | —   | Stephanotis floribunda . . . . .             | 130 | —   |
| Oreodoxia regia . . . . .                  | 2   | —   | Thouarsii . . . . .                          | 130 | —   |
| Pandanus amaryllidifolius . . . . .        | 5   | —   | Stanhoepa insignis (Orch.) fl. 2 bis         | 5   | —   |
| graminifolius . . . . .                    | 1   | —   | oculata . . . . . 2 #                        | 5   | —   |
| javanicus variegatus . . . . .             | 15  | —   | tigrina . . . . .                            | 7   | —   |
| Passiflora Beloti . . . . .                | 1   | —   | Stiftia chrysantha . . . . .                 | 1   | —   |
| Comte Kisseleff . . . . . 30 kr. bis       | 1   | —   | Sobralia macrantha (Orch.) fl. 4 bis         | 8   | —   |
| Loudoni . . . . . 30 # #                   | 1   | —   | Tacsonia Helleri . . . . .                   | 1   | —   |
| Loweii . . . . . fl. 1 #                   | 2   | —   | splendens . . . . .                          | 130 | —   |
| Medusae . . . . . 30 kr. #                 | 1   | —   | sanguinea . . . . .                          | 2   | —   |
| Myriadenia . . . . .                       | 1   | —   | Theophrasta latifolia . . . . .              | 230 | —   |
| quadrangulata . . . . .                    | 1   | —   | Thunbergia coccinea . . . . .                | 30  | —   |
| Philodendron crinipes . . . . .            | 3   | —   | alata n. variet. . . . .                     | 24  | —   |
| giganteum . . . . .                        | —   | —   | Tillandsia acaulis virid. . . . . fl. 1. bis | 2   | —   |
| perdusum . . . . . fl. 3 bis               | 5   | —   | bruncea . . . . . # 1. #                     | 2   | —   |
| pinnatifidum . . . . .                     | 7   | —   | species . . . . .                            | 130 | —   |
| quericifolium . . . . .                    | 230 | —   | Torenia asiatica . . . . .                   | 30  | —   |
| repens . . . . .                           | 130 | —   | Tradescantia Deckeriana . . . . .            | 112 | —   |
| Phoenix dactylifera, Dattelpalme . . . . . | 5   | —   | picta . . . . .                              | 1   | —   |
| Leonensis . . . . .                        | 10  | —   | variegata . . . . .                          | 130 | —   |
| farinifera . . . . .                       | 20  | —   | Zebrina . . . . .                            | 24  | —   |
| Phrynium setosum . . . . .                 | 2   | —   | Xanthochymus ovalifolius . . . . .           | 3   | —   |
| Pincenectia glauca . . . . .               | 12  | —   | Yucca Draconis fol. var. . . . .             | —   | —   |
| Pilea muscosa . . . . .                    | 24  | —   | aloëfolia . . . . .                          | 112 | —   |
| Pitcarnea sp. . . . .                      | 112 | —   | Zamia horrida femina . . . . .               | 7   | —   |
| fulgens aurantia . . . . .                 | 130 | —   | Zingiber officinale . . . . .                | 1   | —   |
|  |     |     | Zygopetalum Mackai (Orch.) fl. 2 bis         | 5   | —   |

## Einige Wasserpflanzen.

|                                 | fl. | kr. |                               | fl. | kr. |
|---------------------------------|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|
| Aponogeton distachyon . . . . . | 1   | —   | Nymphaea rubra . . . . .      | —   | —   |
| Cyperus papyrus . . . . .       | 2   | —   | poecilla . . . . .            | —   | —   |
| Euryale ferox . . . . .         | 12  | —   | thermalis . . . . .           | 130 | —   |
| Nymphaea corulea . . . . .      | 130 | —   | Pistia stratiotes . . . . .   | 1   | —   |
| dentata . . . . .               | 130 | —   | Saururus cernuus . . . . .    | 1   | —   |
| Lotus . . . . .                 | 230 | —   | Valisneria spiralis . . . . . | 1   | —   |
| Ortgiescana rubra . . . . .     | 12  | —   | Victoria regia . . . . .      | —   | —   |



# Ein kleines Sortiment Farrenkräuter

wird ebenfalls cultivirt.

## Azalea indica. \*)

Die indischen Azaleen, wegen ihres ungewöhnlich reichen Blüthenschmuckes längst allgemein bekannt, haben in den letzten Jahren an Mannigfaltigkeit und Glanz der Farben, Vollkommenheit der Formen und Willigkeit im Blühen auffallend gewonnen, und werden wohl von keiner andern Blumengattung an Pracht übertroffen. Die natürliche Blüthezeit beginnt in dem Augenblicke, wenn die Camellien im Abblühen begriffen sind; allein die Frühsorten lassen sich schon im Januar sehr leicht treiben, während die Spätsorten bis zu Anfang Juni dauern.

Da, wo kein anderer Preis bemerkt ist, kommen:

junge kräftige Pflanzen . . . . . pr. Stück 30 kr. bis 48 kr.

mittlere, meistens 1 bis 2 Fuß hohe blübbare " " 48 " " fl. 2.

starke Pflanzen von 2 bis 4 Fuß Höhe . . . " fl. 1. 12 " fl. 5.

Die mit \* bezeichneten, meistens neueste Sorten, können nur in jungen Vermehrungen geliefert werden.

Hierbei dürfte bemerkt werden, dafs, obwohl der Vorrath in Tausenden besteht, nicht immer jede Sorte in jeder Gröfse abgehlich fein kann; jedenfalls aber glauben wir im Stande zu sein, allen billigen Ansprüchen vollkommen zu genügen.

Bei Uebernahme von Parthieen werden verhältnismäfsig billigere Preise gestellt.

Gute ältere Sorten zum Treiben mit Blüthknospen pr. 12 Stück fl. 6 bis fl. 18.

NB. *S.* bezeichnet die Sämlinge von Herrn Scheuermann, *R.* diejenigen aus unserer eigenen Samenzucht.

Alba (*ledifolia*) die bekannte weifßblühende.

cassata, zuweilen gestreift, Art der Gled-  
stanesii, oft gefüllt.

distincta (*R.*) fl. 1. 30 kr.

liliiflora, großblühende weifße.

limbriata, oft gefranzt.

Fielders white, größtblühende, von voll-  
kommenster runder Form.

insignis, schönste rein weifße, vollkommenste  
Form.

\* magna fl. 1. 30 kr.

multiflora (*Dresden*), mit violett ge-  
streift, schön.

perfecta.

pulchella, kleine, niedrigstehende, voll-  
blühende, *S.*

semiplena (*R.*) fl. 2.

striata, zuweilen gestreift, schöne Form.

Adelaide, tief rosa carmin, stark punkirt,  
verbesserte speciosa.

Adolphi fl. pleno, gut gefüllt, schön violett-  
roth, vielblühend.

Alexandra (*Adam*), dunkelrosacarmin  
fl. 1. 30 kr.

Amaranthina, beste glänzend dunkelpurpur-  
farbene, wie phoenicea splendens

fl. 1. 30 kr.

\* Amoena (*Standish*), aus Nord-China,  
sehr eigenthümlich mit rosa=pur-  
purfarbenen doppelten Blumen-  
kronen; reichblühend. fl. 3. 30 bis fl. 10.

\* Amoma (*Adam*), zart lila, große gute  
Form fl. 1. 30 kr.

Apeiromegatha (*Adam*), scharlach=hellroth,  
groß fl. 2. bis fl. 3.

\*) Die überaus prachtvolle Ausstellung am 1. April 1852 glänzte hauptsächlich durch ihren unübertrefflichen Reichthum an dieser Blumengattung, bei welcher Gelegenheit unsere Sammlung für die sechs schönsten Neuheiten mit der grossen Medaille gekrönt wurde. Seitdem sind wieder manche vortreffliche Erzeugnisse hinzugefügt worden.

Ascesdens (*Knight et P.*), feurig charlach fl. 1 bis 5.  
 \* Atrosanguinea (*R.*) fl. 2. 30 kr.  
 Astica (*Adam*) carmin groß fl. 1 bis 3.  
 Audiberti, hellcarmin, vorzüglich.  
 Augustissima, hochscharlach, groß, extra fl. 1. 30 kr.  
 Aurantia congesta, leuchtend orange-scharlach, spätestblühende, vorzüglich.  
 Aurantia splendens, sehr groß, eine der besten orangefarbigsten, *S.*  
 Barbata, blaß lila, fast die größtblühende, willig.  
 Baron v. Pronay, sehr groß, dunkelviolet und braunroth, vorzüglich, *R.*  
 Beauty of Ryegate fl. 2. 30 kr.  
 Bellerophon, groß, leuchtend carmin, sehr schön, *R.*  
 alba, weiß, *R.*  
 coccinea, hochroth, *R.*  
 incarnata, blaßrosa, *R.* sehr willig.  
 phoenicea, *R.* halbgefüllt sehr willig.  
 Benno, sehr groß, matt orange, stark gezeichnet, *R.*  
 Bianca (*Standisch*), weiß fl. 1. 30 bis 3.  
 Borbonia, orange, groß rund, vielblühend, von niederem Wuchse.  
 Borbonia cerise, derselben ähnlich, heller.  
 Brilliant (*Scheuermann 1831*), gesättigt tief scharlach, unstreitig die vorzüglichste neben illustris und anderen fl. 2 bis fl. 7.  
 Cardinalis nova, glänzend salmroth.  
 Carminea praecox, frühblühend, zum Früh-treiben, *R.*  
 Calypso, fein carmin.  
 Cerisa pallida, salmroth mit carmin Zeichnung  
 Chelsoni (*Knight et P.*), hochscharlach fl. 1 bis 5.  
 China lancifolia, blaßlila, sehr kleine Blume reichblühend, zum Früh-treiben unvergleichlich fl. 1. 30 kr.  
 Cleopatra (*Adam*), kupferfarben mit violett.  
 Clotilde, dunkelrosa, halbgefüllt.  
 Coccinea (*Smith*), äußerst willig und frühblühend, groß.  
 grandiflora, ziegelroth, groß.  
 Coccinea superba, hochroth, sehr schön.  
 Colorans, violettcarmin, dunkle Zeichnung  
 Concordia, glänzend tiefcarmin, vollkommene Form  
 Coronata, glänzend tief carmin.  
 Coquette de Flandres, fein carmin, halbgefüllt fl. 1. 30 kr.  
 Correcta (*R. 1851.*), eine große, verbesserte, dunklere prästantissima mit sehr reicher Zeichnung fl. 2 bis 5.  
 Coruscans, lebhaft orange, groß, vorzügl. *S.*  
 Cuprea elegans (*Dresden*), dunkelfurperroth.  
 Cuprea splendens, einerlei mit aurantia spl.  
 Cuprea violacea, kupferroth mit violett, *S.*

\* Cyrilla (*R.*) fl. 1. 30 kr.  
 Dawsoni (*Knight et P.*), glänzend scharlach fl. 1. bis 5.  
 Decora (*Knight*), hellcarmin, groß, rund.  
 Diana, tief salmroth, in der Art der Comosa.  
 Distincta, tiefcarmin.  
 Delecta, blaß salmroth.  
 \* Delicata (*M.*) fl. 1. 30 kr.  
 Diamantina (*R.*) fl. 1. 30 kr.  
 Duc de Brabant, groß, ziegelroth, vorzüglich rund fl. 1. 30 kr.  
 Duke of Wellington, groß, ziegelroth, vorzüglich rund fl. 1. 30 kr.  
 \* Dulcis major (*M.*) fl. 2.  
 Elata fl. pleno, scharlach, stark gefüllt, fast wie Granatblüthen.  
 Elegantissima (*M.*) fl. 3. 30 kr.  
 Elisa Mieliez fl. 1. 30 kr.  
 Elisabetha (*Adam*), fl. 2.  
 Elegans venusta, mattscharlach, schön.  
 Eliza, blaß ziegelroth, schön.  
 Emma (*Adam*), trüb hell-scharlach fl. 1. 30 kr.  
 \* Emperor fl. 1. 30 kr.  
 Erzherzog Johann (*Sch.*), sehr lebhaft kupferf. mit Stahlglanz, groß fl. 2.  
 Excellens (*excelsa*), groß, zimber-scharlach.  
 Eximia, glänzend hochscharlach, oft halbgefüllt.  
 Eximia pallida, ähnlich der prästantissima.  
 Exquisita (*Knight*), blaß-fleischfarb, dunkle Zeichnung, vollblühend, vorzüglich.  
 Extranei (*Knight et P.*), fein carminrosa fl. 2 bis 5.  
 Fantasie (*R.*) fl. 1. 30 kr.  
 Flammea, *R.* neu, übertrifft die resurgens. fl. 2.  
 Flora (*S.*) leuchtend hochroth wie illustris fl. 1. 30 kr. bis fl. 3.  
 Formosa aurantia, dunkelscharlach; meistens halbgefüllt.  
 Fortunata (*R. 1851*), dunkelfilla, große vorzügliche Zeichnung fl. 2.  
 Friderich August (*Dresden*), wie prästantissima. — fl. 1. 30 kr.  
 Fulgens, hochscharlach.  
 Fulgens superba, hochscharlach.  
 \* General Peuker (*S.*) fl. 3.  
 Gledstanessii, weiß, oft schon gekreist, gr. rund excelsa, lebhaft dunkelrosa.  
 \* Glory of Sunning Hill, gefüllte Rosen-ähnliche Blumen, fl. 2. 30 kr.  
 Gracilis, zimber-scharlach mit carmin.  
 Graciosa (*Mardner*), purpur, größer als phoenicea.  
 Gloria Gandavensis, tief carmin.  
 \* Gräfin Thun (*S.*) fl. 3.  
 Grandiflora rosea, scharlach-carmin, groß.  
 Grata (*R. 1851*), zart hell-scharlach, von besser Form und unvergleichl. leb. Zeichnung fl. 2. 30 kr.  
 Illustris (*Mardner*), neu, leuchtend hochroth, dunkle Zeichnung, beste Form, reichblühend, fl. 1. 30 bis fl. 5.  
 Inocenza (*R.*), fein weiß fl. 2. 30 kr.



- \* Jveryana, rein weiß, vorzüglich.  
fl. 1. 30 kr. bis fl. 3. 30 kr.  
King, lebhaft orange.  
Königin Marie (*Dresden*) leb. fupferfcharl.,  
dunkel gezeichnet fl. 1. 30 kr.  
\* Lactea floribunda (*Dresden*), weiß mit vio-  
letten Streifen. fl. 1. 30 kr.  
Lactitia (*R.* 1851), roth mit blau-vio-  
letter Zeichnung und Glanz, sehr  
freundlich fl. 1. 30 kr.  
Lateritia, ziegelroth, groß, rund, spätblühend.  
alba, einerlei mit Gledstonesii.  
angusta aurantia, blaß zimmeber.  
grandiflora, leuchtend orange-scharlach.  
Lateritia elegans, dunkelscharlach.  
Lehmanni, lilapurpur.  
Lehmanni (*Dresden*), lebhaft lila, groß,  
schön gerundet fl. 1. 30 kr.  
Leodora (*R.*) fl. 2. 30 kr.  
Lepida, lebhaft carmin.  
Longifolia, lebhaft ziegelroth, violett gezeichnet.  
Leda, dunkelcarmin, sehr reich fl. 1. 30 kr.  
Lilacina striata, fl. 1. 30 kr.  
\* Louis Napoleon fl. 1. 30 kr.  
Macrantha rubra, sehr groß, purpuroviolett, rund.  
Magnifica, gebrochen carmin.  
Magniflora, orange-scharlach, sehr schön.  
Marie Louise, hoch-carmin, eine der größt-  
blühenden.  
Mileendi, glänzend dunkelrosa, groß, rund.  
Minerva, orange-scharlach, vorzüglich. fl. 1. 30 kr.  
\* Miniata (*M.*) fl. 3.  
Miranda (*R.*) fl. 2. 30 kr.  
Modesta (*R.* 1851.) orange scharlach, sehr  
edel fl. 2.  
Multiflora, klein, hellrosa, äußerst reichblühend,  
von ganz niederem Wuchse.  
Murrayana, sehr groß, vollkommenste Form,  
salmrosa. fl. 1. 30 kr.  
Nanquin, blaß nanquin-orange. fl. 1. 30 kr.  
Nivea (*Mardner*), weiß, groß.  
Nivea fl. pleno (*Mardner*), weiß, gut ge-  
füllt, sehr empfehlenswerth, neu.  
fl. 1. bis fl. 3.  
Neumannii, gr. tief carmin, vortrefl. fl. 1. 30 kr.  
\* Obscura (*M.*) fl. 4.  
Ovata (*China*) sehr klein, scharlach fl. 1. 30 kr.  
Optima, orange-scharlach, prächtig.  
Orange Pink, blaß ziegelroth.  
Ornata (*Dresden*), lebhaft blaßzimmeber.  
Ornatissima, glänzend hellcarmin.  
Oscar, (*R.* 1851.) blaß ziegelroth, große  
starke Zeichnung fl. 2. bis fl. 3.  
\* Pelargoniae flora fl. 1. 30 kr.  
Perfecta elegans fl. 2.  
Perryana, groß, feurig orange-scharlach, runde  
beste Form. fl. 1. 30 kr. bis fl. 5.  
Phoenicea, groß, purpuroth.  
alba (*Low*), sehr groß, rein weiß.  
alba (*R.*) groß, rein weiß.  
\* Phoenicea elegans (*R.*) fl. 1. 30 kr.  
splendens, lebhaft dunkelpurpur, wie  
Amaranthina. fl. 1. 30 kr.

- Phoenix, groß, hellfcharlach.  
Pluto (*Dresden*), dunkelbraunroth mit violett.  
Praeclara, hell fcharlachcarmin.  
Praestans, lebhaft dunkelpurpur mit carmin,  
nieder reichblühend, vorzüglich  
Praestantissima (*Knight*), dunkelziegelroth,  
prächtig gezeichnet. fl. 1. 30 bis fl. 4.  
Prince Albert, tief scharlach, groß, vorzüglich.  
Prinz Camill v. Rohan (*Dresden*), gr., hell-  
fupfercarmin.  
\* Prinz von Nassau (*M.*) fl. 4.  
Princeps (*Dresden*), zimmeber-carmin, sehr fein  
Pulchella nova, fein hellfcharlach-carmin.  
Punctata (*Smith*) fl. 1. 12 kr.  
Purpurea grandiflora (*large purple*), pur-  
pur, sehr groß.  
\* Purpurea perfecta (*Smith*), fl. 1. 12 kr.  
Queen perfection, carmin, schön gezeichnet,  
gut gefärbt. fl. 1. 30 kr.  
Queen of Portugal, groß, rund, leb. rosa carm.  
Reddingii, dunkelscharlach, sehr gr. fl. 1. 30 kr.  
Refulgens, glänz. scharl., verz. fl. 1. 30 kr.  
Regina, hellzimmeber, großblumigt.  
Reine des Belges, lebhaft tiefcarmin, zuwei-  
len halb gefüllt.  
Resplendens, feurig tiefcarmin. fl. 1. 30 kr.  
\* Rinziana (*Sch.*), leb. scharl. fl. 1. 30 kr.  
\* Rinzii (*Adam*), ziegelr., ein Hybrid von  
Land-Azaleen, soll im Freien aus-  
dauern fl. 2. 30 kr.  
Robusta, gr., dunkelscharl., verz. fl. 1. 30 kr.  
Rosalia, lebhaft dunkelrosa, sehr groß, gut  
geban. *R.* fl. 1. 30 kr.  
Rosaeiflora alba (*R.*) weiß gefüllt fl. 5.  
purpurea (*R.*) gefüllt fl. 5.  
Rosamunde, hellrosa, sehr groß. *S.*  
Rosea aurantia, feurig ziegelroth.  
amabilis, lebhaft glänzend rosa, sehr  
schön, *R.* fl. 1. 30 kr.  
elegans (*Leery*), glänzend tief rosa, groß,  
rund fl. 1. 30 kr.  
maculata, rosa.  
punctata, blaß rosa, scharlach.  
triumphans, lebhaft salmrosa.  
purpurea, tief carmin, etwas heller als  
decora.  
superba, tief salmroth, groß.  
Rubra superba, in der Art der lateritia.  
aurantia, fein zimmeber, vorzüglich.  
Salopensis, größer als Pr. Albert fl. 1. 30 kr.  
\* Sanguinea fl. 1. 30 kr.  
Scheuermanni, leuchtend orange, vorzüglich. *S.*  
Seideliana (*Dresden*), glänzend scharlach, vor-  
züglich fl. 1. 30 kr.  
Sinensis, groß, gelb. fl. 1. 30 kr.  
alba fl. 2.  
coccinea, orange-scharlach, hält im Freien  
aus fl. 2.  
crocea, rothgelb, neu. fl. 2. 30 kr.  
Smithi grandiflora, groß, lila, frühblühend.  
Sophia v. Schönborn (*Mardner*), fl. 1. 30 kr.  
Speciosa, groß, dunkelrosa, mit carmin.  
Splendida (*Knight*), lichtcarmin.

Squammata (*China*), bläufila., frühblühend  
Standishi zart salmroth, vorzüglich.  
Striata calamistrata, fast wie prästantissima.  
Striata formosissima, weiß mit violetten  
Streifen. fl. 1. 30 kr.  
Suavissima, hell-lila, wie durchsichtig.  
Sultana, dunkelfupferfarb.  
Surpasse phœnicea, purpurroth, sehr willig  
und frühblühend.  
Sylph, carminrosa, sehr groß, früh und reich-  
blühend. *R.*  
\* Symetry (*Kinghorn*) scharlach salm-  
roth, als prächtig empfohlen  
fl. 3. bis 6.  
Thelemanni fl. 1. 30 kr.  
Theresiae, (*Adam*), prächtig, scharlach,  
feuriger als optima  
fl. 2. bis fl. 3. 30 kr.  
Tinctoria, in der Art der speciosa.  
\* Toilette de Flore fl. 1. 30 kr.  
Transparens fl. 1.  
Triumphans (*Selm.*), lebh. dunkelrosa, starke  
Zeichnung fl. 1. 30 kr.  
francosurtensis, reich orange. *S.* fl. 1. 30.  
gandavensis, lebhaft carmin.  
Trotteriana fl. 2.

Umbellata (*R.*) fl. 2.  
Valeriana (*R.* 1851.), lebh. ziegelroth, schön  
haltgefüllt fl. 2. 30 kr. bis fl. 4.  
Variegata, weiß mit ziegelroth durchzogen, oft  
gebändert.  
Venusta (*Sm.*), fl. 1. 30. kr.  
Verschaffelti, groß, bläufigegelroth.  
Versicolor, fupferroth mit weißlichen Flecken,  
groß, neu. *R.* fl. 1. 30 kr.  
Vesta (*S.*) feurig orange-scharlach, groß,  
rund fl. 3.  
\* Vesta (*Lucoube*) fl. 3. 30 kr.  
\* Vesta (*M.*) fl. 5.  
Vestita, hochroth, schön.  
Victor Jacqueminot, licht scharlach.  
\* Violacea elegans (*M.*) fl. 4.  
\* Vittata (*China*) soll prächtig geüffnet  
blühen, ganz neu fl. 15.  
\* Vittata Fortuneana fl. 3. 30 kr.  
\* punctata fl. 3. 30 kr.  
\* rosea fl. 3. 30. kr.  
Vulcan, bräunl. dunkel, mit violett, vorzügl. *S.*  
Vivicans, tief carmin, in der Art der Calipso  
und decora.  
\* Wooleri (*Sm.*), dunkelcarmoisin fl. 1. 30 kr.

## Rhododendron für das Gewächshaus. \*)

Wenn gegen diese ungemein pomphaste Pflanzengattung deren gewöhnlich spar-  
sames Ansetzen von Blüthenknospen, so wie das nicht unbedeutende Raumerforderniss  
eingewendet wird, so wollen wir diese Uebelstände für beschränkte Räume keineswegs  
in Abrede stellen; allein Niemand wird auch den unbeschreiblichen Eindruck eines Ge-  
wächshauses mit reichblühenden Rhododendron in allen Farbentönen und Zeichnungen  
von Weiss, Lila, Rosa, Scharlach, Blutroth, Purpur, Violett, Schwarzbraun und Gelb  
bestreiten wollen, sobald nur der reichlichere Knospenansatz durch aufmerksame Kul-  
tur gelang. Ausserdem ertragen viele Sorten bis zu 10°, unsere prächtigen R. Cam-  
panulatum-Hybriden sogar bis zu 20° Kälte, wodurch die Ueberwinterung vermittelt  
einfacher Bedachungen ermöglicht wird.

Da, wo kein anderer Preis bemerkt ist, kommen:

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| junge gepropfte Pflanzen              | fl. 2 bis fl. 3. |
| vorjährige 1—2 Fuss hohe und stärkere | " 2 " " 4.       |
| aussergewöhnlich starke Exemplare     | " 4 " " 10.      |

### a) Reine Grundformen (*Species*).

|   |         |
|---|---------|
| Arboreum, gr., glockenförmig, dunkelscharlach | fl. kr. |
| roseum, ditto rosa                            |         |
| Aromaticum                                    |         |
| Cinnamomum, gr., glockenförmig, fast weiß     |         |
| Gibsoni, gr., rachenförmig, weiß              |         |

\*) Unsere Rhododendron haben bei den meisten Ausstellungen Preise gewonnen.



|   |                        | n. | kr |
|---|------------------------|----|----|
| Javanicum, ganz neu, sehr groß, orangegelb und carmin . . . . .   | fl. 5 bis              | 15 | —  |
| Rubicaule, gr., glockenf., lebhaft lichtrosa, sehr schön . . . . .  |                        |    |    |
| Strictum, groß, glockenf., weiß . . . . .   |                        |    |    |
| Rubicaule hybridum, viel versprechende, sehr empfehlenswerthe, fräftige Sämlinge von circa 1/2 Fuß Höhe . . . . . | pr. Stück fl. 2        |    |    |
|   | pr. 12 Stück fl. 20    |    |    |
| Strictum hybridum, . . . . .  | desgl. pr. Stück fl. 2 |    |    |
|   | pr. 12 Stück fl. 20    |    |    |
| Zeylanicum, im Buche dem R. cinnamomum gleichend . . . . .  |                        |    |    |
| Aeruginosum (neue Himalaya-Rhod.) . . . . .   | fl. 3 bis              | 7  | —  |
| Alpine Schrubby ditto . . . . .   |                        | 3  | 30 |
| Alpine red. ditto . . . . .   |                        | 3  | 30 |
| Calycatum ditto . . . . .   | fl. 3 bis              | 7  | —  |
| Campylocarpum ditto . . . . .   | fl. 3                  | 7  | —  |
| Ciliatum ditto . . . . .  | fl. 2. 30 kr. bis      | 15 | —  |
| Cinnabarinum verum ditto . . . . .  |                        | 5  | —  |
| Dalbousianum ditto . . . . .  | fl. 5 bis              | 15 | —  |
| Edgeworthii ditto . . . . .   | fl. 3                  | 7  | —  |
| Falconeri ditto . . . . .   | fl. 5                  | 7  | —  |
| Fol. cordatis ditto . . . . .   | fl. 3 bis              | 7  | —  |
| Fulgens ditto . . . . .   | fl. 3                  | 5  | —  |
| Glaucum ditto . . . . .   | fl. 3                  | 7  | —  |
| lanceifolium ditto . . . . .  |                        | 5  | —  |
| Niveum ditto . . . . .  | fl. 3 bis              | 7  | —  |
| Sp. 14000 feet ditto . . . . .  | fl. 3                  | 7  | —  |
| Sp. Woolly calyx ditto . . . . .  | fl. 3                  | 7  | —  |
| Wallichii ditto . . . . .   | fl. 3                  | 5  | —  |

### b) Hybriden von R. arboreum.

|   |                      |     |   |
|---|----------------------|-----|---|
| Bodaerteum, blaß scharlach . . . . .  |                      |     |   |
| Delicatum (Smith), weiß mit scharlach . . . . .   |                      |     |   |
| Gloria Gandavensis, weiß . . . . .  |                      |     |   |
| Graf Alfred v. Neipperg, dunkelblutroth, schwarz punktiert . . . . .                    |                      |     |   |
| Guido Görres, fein zinnober-scharlach, groß, prächtig . . . . .                         |                      |     |   |
| Halleri, hochscharlach, schön . . . . .   |                      |     |   |
| Kosziusko, dunkelrosa, stark schwarz punktiert, vorzüglich . . . . .                    |                      |     |   |
| Kronebergianum, fast weiß, stark punktiert, groß . . . . .                              |                      |     |   |
| Othello, schwarzbraunroth, ganz neue Farbe, prachtvoll, vorjährige Vermehrung . . . . . |                      | 10  | — |
| ditto junge Vermehrung, im nächsten Mai . . . . .                                       |                      | 5   | — |
| Radezki, dunkelscharlach, Glockenform . . . . .   |                      |     |   |
| Rüppelianum, lebhaft dunkelcarmoisin, schwarz punktiert . . . . .                       |                      |     |   |
| Schuberti, dunkelbraunscharlach, innen hell . . . . .                                   |                      |     |   |
| Tigrinum, roth, stark punktiert . . . . .   |                      |     |   |
| Tricolor, lilz-carmin, schwarz und carmoisin gezeichnet . . . . .                       |                      |     |   |
| Victoria, schwärzlich violett, schön schattirt . . . . .                                |                      |     |   |
| Saemlinge in verschiedenen Grössen von . . . . .  | fl. 1 bis            | 4   | — |
| ditto ditto . . . . .   | pr. 12 Stück fl. 6   | 12  | — |
| ditto ditto . . . . .   | pr. 100 Stück fl. 50 | 100 | — |

### c) Hybriden von R. campanulatum.

Diese aus unserer Saamenzucht stammenden Hybriden wachsen baumartig, wie R. arboreum, bringen sehr große glockenförmige, meistens weiße, fleischfarbene oder rosenrothe Blumen mit starker Zeichnung, und haben mit R. catawbiense bereits 20° Kälte ohne Bedeckung ausgehalten. Unsere Flor gegen Ende April, kurz nach 6° Kälte, war bewunderungswürdig, und, weil im freien Lande, überraschend neu! —

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Albertine Stern, centifolien-rosa, großglockigt, ausgezeichnet . . . . . |  |  |  |
| Carneum, fleischfar-rosa . . . . .                                       |  |  |  |
| Exquisitum, fein hellrosa, punktiert, groß . . . . .                     |  |  |  |

|   | n.                | kr. |
|---|-------------------|-----|
| formosum  |                   |     |
| Herbertii, zart tiefschwarz, fein punktiert, beste Glockenform, schwerlich ausdauernd                         | fl. 3 bis 4       | 4   |
| Johann Stern, weiß, mit leichtem lilä. Hauche, wundervoll schwarz punktiert, ein Muster in Form und Zeichnung | fl. 4 bis 18      | —   |
| Maculatum, weiß, schwarz punktiert, ausgezeichnet schön   | fl. 4 "           | 8   |
| Roseum, schön lichtrosa   | fl. 3 bis 5       | —   |
| Stollbergianum  |                   | 3   |
| Turneri, ähnlich dem Herbertii, schwerlich ausdauernd   |                   |     |
| Saemlinge, die noch nicht geblühet haben  | pr. Stück # 2     | 10  |
| ditto ditto   | pr. 12 Stück # 18 | 36  |
| ditto, große Exemplare von 5 bis 8 Fuß Höhe   | pr. Stück # 12    | 30  |

#### d) Hybriden von *R. ponticum*, *Catawbiense* und *maximum*.

Darunter die *R. caucasicum* als f. g. 3 Zwergformen, vollkommen ausdauernd, zu Anfang Mai blühend, die *R. catawbiense* und *ponticum*, bis Ende Mai blühend, und *R. maximum* (Sternianum, Smithi album) bis Ende Juni blühend.

|   |                     |      |
|---|---------------------|------|
| Caucasicum magnificum, sehr groß, milchweiß, prachtvoll                                   | fl. 4 bis 10        |      |
| Caucasicum hybridum, niedrig, reichblühend, Sämlinge in meistens weißer oder heller Farbe | fl. 1. bis 3        |      |
| ditto einjährige Sämlinge   | pr. 12 Stück        | 1 30 |
| Fastuosum fl. pleno, dunkel-lila, gefüllt, groß   | fl. 1. 30 kr. bis 6 |      |
| Hyacinthiflorum, hell-lila, gefüllt   | fl. 1. 30 " "       | 4    |
| Lowii, weiß, stark braun gezeichnet, sehr schön   | fl. 1. 30 " "       | 3    |
| Multimaculatum, weiß, braun gezeichnet  | fl. 1. 30 " "       | 4    |
| Pardoloton, groß, dunkelviolett   |                     | 2 30 |
| Smithi album  |                     | 2    |
| Vervaeianum fl. pleno, lilä, schön gefüllt  | fl. 1. 30 kr. bis 5 |      |

Andere bei den Ziersträuchern.

#### e) Hybriden durch Azaleen.

|   |             |  |
|---|-------------|--|
| Norbitonense, sehr groß, als Knospe rötlich, beim Ausblühen rosa-gelb, dann prächtig orange-gelb, wurzelächte Exemplare |             |  |
| Bernemense, rosa und gelbroth   |             |  |
| Aureum, rein schwefelgelb   |             |  |
| Aureum superbum (Smith)   |             |  |
| Burlingtoni   |             |  |
| Broughtonianum  |             |  |
| Flavum  | fl. 3 bis 6 |  |
| Lindleyanum   |             |  |
| Carneum elegantissimum  |             |  |
| Decorum, strohgelb  |             |  |
| Chrysolectum, strohgelb, groß   |             |  |
| Ochroleucum, schwefelgelb   |             |  |
| Spectabile grandiflorum, orange-gelb, sehr groß   |             |  |
| Torlonianum   |             |  |



## Camellien. \*)

Auf die Kultur der Camellien verwenden wir seit vielen Jahren besondere Sorgfalt, wie dies die Ueppigkeit unserer Pflanzen und die Ausstellungen in der Blüthezeit bezeugen. Sorten ohne anerkannte Vorzüge, ob alt oder neu, kostbar oder nicht kostbar, werden entfernt oder wenigstens nicht angepriesen, sobald wir ein Urtheil darüber zu fällen vermögen; denn wir beabsichtigen nicht die grösste Anzahl, sondern vielmehr die höchste Vollkommenheit der Varietäten zu erzielen.

Die Preise bestimmen sich nach der Neuheit und Stärke der Pflanzen.

Im Allgemeinen kommen:

- a) junge Pflanzen oder diessjährige Vermehrung von 1 — 3 Blättern 48 kr. bis fl. 1. 30 kr.
- b) Einjährig veredelte Pflanzen von etwa 1 Fuss Höhe fl. 1 bis fl. 2.
- c) Mehrjährig veredelte Pflanzen von etwa 2 Fuss Höhe fl. 1. 30 kr. bis fl. 4.
- d) Starke Pflanzen von 3 bis 7 Fuss Höhe fl. 3 bis fl. 20. In grösseren Partitheen nach Verhältniss billiger.
- e) 100 Stück Camellien nach unserer Wahl fl. 75 bis fl. 300.
- f) Da wo diese Ansätze nicht eingehalten werden können, finden sich besondere Preise angemerk, welche für junge oder einjährige Vermehrung gelten.

Für den Fall, dass in einer vorgeschriebenen Grösse Pflanzen nicht vorrätig wären, bitten wir, wo möglich, um erweiternde Bestimmungen.

Die mit \* Bezeichneten sind nur in diesjährigen Occulationen, daher erst im May nach vollendetem Triebe lieferbar. Ausserdem besitzen wir einen mässigen Vorrath von wurzelächten Pflanzen in den besseren Sorten. —

Abate Branzii, beschriebene als regelmässig dunkelcarmin fl. 2. bis 4.

Adelaide, regelm., fein carmin, große Aehnlichkeit mit magnifica perfecta, Traversi, und Prince Albert von einigen.

Adonidea, eine Ausweichung in rosa von imbricata alba.

Adrien Lebrün, ein Seitenstück zu Saccoi nova, nicht so willig.

Afranie, fl. 2. 30 kr.

Alba Casoretti, regelm., rein weiss, sehr willig blühend.

Alba elegans, rein we., pompösförmig, große schöne Blume.

Alba Elysiana. fl. 1. 30 kr.

Alba eximia, R. regelm., rein weiss, sehr schön. fl. 3 — 6.

Alba grandiflora, dichtgefüllt, rahmwe., willigbl., fugelblüthig.

Alba illustrata, fast regelm., rein we., einerlei mit Waltonensis.

Alba imbricata (Low), neu, schön abgebildet. fl. 2 — 10.

Alba Iondinensis, fugelblüthig, rein we., hochwachsend.

Alba plena, regelm., rein we., allgemein bekannt.

\*) Unsere Sammlung gewann bei der Blumenausstellung 1852 sowohl den Neuheits- als den Kulturpreis. Als schönste neue Sorten wurden gekrönt: Irise, Cenerentola und Alba plena Dunlop; — besonderer Erwähnung würdig befunden: alba eximia aus eigener Samenzucht. In diesem Jahre wurden gekrönt: Camiesse Callini, Pio IX., Duc de Bretagne und Caryophyllödes.

Alba plena Dunlop, reiche, regelmäßige, rein weiße Blume vom ersten Range fl. 2 bis 15.

Albertus, we. und rosa gebändert, oft in Roth übergehend, vorzüglich.

Alexina, regelm. geröthet we., punktiert, sehr schön.

Alsatica, fugebl., dicht und gekräuselt, schön rosa, empfehlenswerth.

Altheaflora, anemonenförmig, dunkelscharl., sehr schön und willig.

Amadryas di Cussano fl. 2.

Amalia Croff, weiß rosa, punktiert und gestreift. fl. 2. bis fl. 7.

Amalthea, fast regelm., feurig dunkelr., unreitig eine der größten vorzüglichsten Blumen.

Ambrosii, beschr. als regelm., glänzend rosa, oft gestreift. fl. 2. 30 kr.

Anemoneflora alba (Chandler), fugeblüth., we., oft gestreift.

mutabilis, dieselbe in rosa.

Appiani fl. 3.

Archiduchesse Augusta (Corsi), blutroth, weiß gerüst, bläulich schattirt, regelm. fl. 1. 30 — 4.

Archiduchesse Augusta (Puccini), beschr. als regelm. rosa-amaranth. fl. 1. 30 kr.

Archinto, fast regelmässig hochscharlach, schön.

Armida, regelm., scharl., empfehlenswerth.

Augusta, pomponbl., corallenroth.

Aulica, regelm. weiß, punktiert.

Aurelia, fast regelm., rosenf., scharl., sehr schön.

Aurora (Guicciardini), pomponbl., we. mit stark gelblichem Schimmer, in nächster Verwandtschaft mit Duchesse de Litta

Aurora (Mariani), übertrifft durch Farbe, Rundung und schönen Wuchs die herrliche Clowesiana.

Ayez, beschrieben als ganz regelm., reich gefüllt, rosa.

Barchi, lebhaft rosa, weiß gerichtet, regelmässig. fl. 2 — 4.

Baltimorea (Feast's), sehr gr., schalenf., halbgef., alabasterwe. mit rosa.

Baron S. de Pronay (Bauman), sehr gr., Form d. triumphans, zart rahmwe. in fleisch, übergehend.

Baronne d'Udekem, regelm., dunkelcarmin.

Baumanniana nova (Casoretti), fugeblüthig, dunkel-braunroth.

Beccaria, zart rosa, fleischfarb in der Mitte, gr. regelm. fl. 2 — 4.

Bella di Giorno, rosa-fleischfarb, weiß gestreift, regelm., vorzüglich. fl. 4.

Bettegno, ganz regelm., reich gef., lebhaft carmin mit we. gestreift fl. 2 — 6.

Biflora, dichtgefüllt, gleichwie von zwei Blumen vereinigt, gewöhnlich roth.

Bijou de la Garça, rosa, weiß und carmin, rannkelt, vorzüglich. fl. 2 — 4.

Binneyi, sehr regelm., carmoisin, sehr schön.

Bostonia (Floy), eine der größten regelm. dunkelrothen Blumen.

Briantea (Casoretti), fast regelm., gelbl. rein we., groß, vorzüglich fl. 2 — 6.

Brocki, regelm., schön carmin, wurde oft für Marchioness of Exeter ausgegeben.

Bronte. fl. 1. 30 kr.

Brozzoni, regelmässig, fleischfarb. od. incarnat rosa, sehr fein, klein.

Bruceana, eine große, regelm., carminrothe Blume, sehr empfehlenswerth.

\* Camille Brozzoni. fl. 2.

Campo Melendino, pomponblüth., gelblich weiß.

Candidissima, ganz regelm., eine der vorzüglichsten rein weißen Blumen.

\* Candor. fl. 1. 30 kr.

Cantoniana, gedrängt pomponbl., dunkelcarmin, vortreffliche Sorte.

Caragnini. fl. 1. 30 kr.

Carbonara, volle runde Pomponform, glühend dunkelcarmoisin, eine ganz neue sehr reiche Färbung fl. 2 — 6.

Cardinal Antonielli. fl. 3.

Cariophylloides (Low), prächtig nelfenartig gestreift. fl. 3.

Carracioli, ganz regelm., reich, glänzend tief-rosa, ein Seitenstück zu Saccoci nova, weit vorzüglicher als Comte und Comtesse Carracioli.

Caroline Smith, sehr gr., regelm., prächtig rosa.

Carswelliana, regelm., hellcarmin mit weißlichen Streifen, langwüchsig, werthvoll.

Carswelliana alba, fast regelm., reich gef., wellenförm., we. mit rosa, sehr edel.

Castiglioni, fast regelm., dicht gef., rein we.

Catherine Longhi, eine der vorzüglichsten Blumen in nächster Verwandtschaft mit Saccoci nova.

Chalmers perfecta (Americ), ganz regelm., rosa schattirt, sehr angerühmt.

Cenerentola, ganz regelm., carminroth, hell schattirt.

Centifolia (Low), ganz regelm., carmoisin.



- Cesar Arici. fl. 1. 30 kr.  
 Chandleri, anemonenförmig, reich dunkelscharl., oft we. gefleckt, vortrefl.  
 Chandleri rosea, große Aehnlichkeit mit pulcherrima striata und pendula oder elata; verfügbar.  
 Cible, in der Art der altheaeflora.  
 Clowesiana, pomponbl. geröthet we. mit einzelnen rosafarbenen Streifen.  
 Cocki vera, sehr gr., dunkelr. wie Derbeyana.  
 Cælestina, wie Hendersoni.  
 Coletti tigrina, anemonenf., reich gef., kirchr., we. gefleckt, sehr werthvoll.  
 Comensa, ganz regelm. dunkelcarm.  
 Composita, regelm., lebhaft rosa, spätbl.  
 Comte Carini.  
 Comte de Paris, eine Ausweichung in rosa von Duchesse d'Orleans.  
 Comtessa Alleimagna, beschrieben als rein weiß, rosenförmig, vorzüglich. fl. 2 — 6.  
 Comtesse Bethelam (Croff.) fl. 5.  
 Contessa Callini, rein weiß rosenförmig, vortreflich, fl. 4.  
 Comtesse Castellbarco, regelm., hellcarminrosa mit hellen Mittelstreifen fl. 1. 30 kr. — 4.  
 Comtesse del Maino. fl. 2. 30 kr.  
 Comtesse Negri, in der Art der Madeleine. fl. 1. 30 kr. — 4.  
 Comtesse Nencini (Pechiolina), ganz regelm., weiß mit rosa gestreift.  
 Comtesse Spauer, beschr. als mit roth und we. getheilten Petalen.  
 Comte de Flandres.  
 Congesta americana, regelm., dunkelrothbraun, helle Mittelstreifen, neu fl. 2. — 10.  
 Conspicua, unregelm., sehr gr. und imponirend, rosacarmin.  
 Coopei (America), ganz regelm., fein hell-scharlach, schön.  
 Coquetti, unstreitig eine der besten regelm. Blumen in hochr.  
 Coronata crispa alba, große Aehnlichkeit mit der unübertrefflichen Monteroni.  
 — candida, desgleichen.  
 — miniata, doppelt anemonenblüthig, zimberartig roth.  
 — rosea (rubra).  
 Crista Galli, anemonenf., reich gef., dunkelr.  
 Crucata, eine der werthvollsten carminr., meistens we. gefleckten regelm. Blumen.  
 Davideo, regelm., tief rosa, sehr gr. und empfehlenswerth fl. 2 — 4.  
 Decus italicum, regelm., rosenförmig, rein weiß, sehr schön.  
 Delicatissima, pomponf., we. mit rosa Streifen.  
 De Medici. fl. 3.  
 De Notaris, ganz regelm., dunkelscharlach, oft weiß gefleckt, schön.  
 Depressa, nur halbvoll, gr., rosa, in der Art der conspicua.  
 Devoniana striata, ganz regelm., dunkelrosa mit hellen Mittelstreif., oft prachtvoll fl. 2 — 4.  
 Diamantina, dicke Pomponf., glänzend zart rosa, reizend schön.  
 Dobrei, anemonenbl., reich gef., hochscharl., sehr schön.  
 Docteur Horner, wird als eine große, regelmässige Blume in zart rosa angegeben. fl. 2 — 4.  
 Donkeleri, halbvoll, bekannte prächtig panaschirte unentbehrliche Blume.  
 Dorina Lechi, beschrieben als feurig carminrosa, weiß gefleckt und gestreift, regelm. fl. 2 — 5.  
 Duc de Brabant, in der Art der Eclipse und imbricata alba, oft sehr regelm.  
 Duc de Bretagne, sehr reich regelmässig, rosa-carmin, ganz vorzüglich. fl. 1. 30 kr. — 5.  
 Duc de Litta, regelm., dunkelcarm. mit hellen Mittelstreifen.  
 Duc de Reichstadt, regelm., dunkelcarm., helle Mittelstr., Art der Carswelliana.  
 Duc d'Ursel. fl. 1. 30 kr.  
 Duchesse d'Etruria, pomponbl., oft fast regelm., we., rosa gestreift.  
 Duchessa de Litta, anemonenf., glänzend we. mit gelbl. Centrum.  
 Duchessa di Milano, fleischfarb-rosa, fein punkirt und gefleckt, päonienförm., groß. fl. 2 — 6.  
 \* Duchessa de Normandie, schneeweiß. fl. 2.  
 Duchessa di Visconti, beschrieben als weiß-fleischfarb, rosag. ecreuse, regelm. fl. 2 — 5.  
 Duchessa d'Orleans, ganz regelm., fleischf.-we., mit schönen Rosa-Streifen, eine Hauptblume von reizender Schönheit; aber etwas spätblüthig.  
 Dux Armoricanus, beschrieben als carmin und rosa, leicht weiß gestreift, prächtig. fl. 2 — 5.  
 Eburnea, sehr gef., rein we., vorzüglich.  
 Eclipse, gefüll., we., röslich schimmernd, gestreift.  
 — rosea, eine Ausweichung im zartesten Rosa, sehr ähnlich mit Galliesii.  
 Elegans (Chandler), anemonenf., sehr lebhaft rosa, eine sehr fräftige, hervortretende Blume.  
 Elena Ugoni, hat viel Aehnlichkeit mit Duchesse d'Orleans fl. 2 — 6.  
 Emico Bettoni. fl. 1. 30 kr.



- Emilia, Pomponf., leuchtend hochscharlach.  
 Emilia Bona, beschrieben als rosa-zinnober, weiß gestreift, regelm. fl. 2 — 5.  
 Emilia Campione, dunkelfrosa, hell gestreift, regelm., vorzüglich. fl. 3.  
 Emilie Gavazzi, regelm., we., einzelne Streifen, sehr schön.  
 Emilie grandiflora, kugelbl., ein Seitenstück zu triumphans, überaus kräftig.  
 Emperor, gr., leb. rosa, hat Ähnlichkeit mit reticulata, sehr schön.  
 Enrichetta Bisi. fl. 2.  
 Erecta, in der Art der Governativa.  
 Estheri, kugelbl. sehr gr., blaß fleischf. mit rosa.  
 Eximia, regelm., sehr voll, reich corallenr.; prächtig, aber nicht willig.  
 Fairleya, anemonbl., gesättigt corallenr., sehr hervorleuchtend.  
 Fanny Elsler, in der Art der Clowesiana.  
 Fatua, fast regelm., reich gef., gr., rosa carmin.  
 Faustine, anemonenbl., we., mit rosa und carmin stark gebändert, nelfenartig.  
 Faustino Lechi, weiß, rosa gefleckt, regelm., extra. fl. 2 — fl. 4.  
 Feastii, sehr gr., regelm., milchwe., zuweilen zart gestr.  
 Feastii rosea, eine Auszeichnung der Feasti in rosa. fl. 2.  
 Festiva, anemonenf. carmoisir. mit gr., we. Flecken.  
 Fimbriata, wie alba plena, mit gefranzten Petalen.  
 — rubra, eine schöne panaschierte Blume.  
 Floy's virginica, fast gef., symetrisch, sehr gr., tief rosa, sehr ansehnlich.  
 Formosa, gedrängt gef., rosacarm.  
 Fornarina, regelm., sehr reich, fein gestellt, rein weiß, kaum sichtbar gestreift. fl. 2 — 6.  
 Fortuita, fast regelm., gr., weiß, sehr kräftige Blume.  
 Fortune's yellow (Staudish), neue gelbbühende Camellia aus China. fl. 12.  
 Fortuna (Herbert), regelmäßig fleischfarb. fl. 2.  
 \* Fra Arnoldo da Brescia. fl. 5.  
 Frederic Confalonieri. fl. 3. 30 kr.  
 Frostii (America), ganz regelm., reich gef., carminrosa mit we. Mittelstr. Eine der vorzügl. Neuheiten. Ähnlichkeit mit Sarah Frost.  
 Fulgens nova, pompenbl., oft fast regelm., zinnobercarm, verz.  
 Galleii, Form der Eclipse, zart fleischfarb-rosa.  
 Garibaldi. fl. 2.  
 General Washington, regelm., we. mit gelbl. Mittelstreifen, sehr willig blühend.  
 General Lafayette, wird als schönste bunte Blume angerühmt. fl. 2.  
 General Zuchi, wahrscheinlich cruciata (Favisch).  
 Gloria belgica, unregelm., reich gef., dunkelscharl.  
 Gloria della Isola Borromè, rosa, weiß gefleckt und gestreift, regelm. fl. 2 — 4.  
 Gillesii, anemonenf., lebhaft blut., oft prächtig weiß gefleckt.  
 Governativa, regelm., gut gef., dunkelscharl.  
 Grandis (Low), regelm., dunkelscharl. fl. 2 — 6.  
 Gretry, dunkelblut.  
 Gumanni, striata, ganz regelm., carmin. fl. 1. 30 kr.  
 Guthriana (Low), regelm., schön gerundet, dunkelcarmoisin schattiert.  
 Halleyi, sehr verz., ganz regelm., in der Art der Carswelliana, sehr willig blühend.  
 Haylocki, pompenbl., sehr gr., rein we.  
 Hempsteadii, regelm., rosa.  
 Hendersoni, regelm., zart hellrosa, sehr willig und werthv.  
 Henriette imperialis, weiß, regelm. fl. 1. 30 kr. bis fl. 3.  
 Henry Clay. fl. 2.  
 Henry Faber, regelm., reich gef., lebhaft dunkelfrosa.  
 Hogg's spectabilis, gedrängt, anemonf., hellrosacarm.  
 Il 22 Marzo, dunkelscharlach mit weißen Mittelstreifen. fl. 5.  
 Il Zephirò, Ähnlichkeit mit rugosissima major.  
 Imbricata, regelm., carm., öfters we. gef., sehr schön.  
 — alba, fast regelm., we. mit einzelnen Rosafar., willig.  
 — magna, beschr. als gr., regelm., reich gef.  
 Incarnata (Buff), regelm., geräthet we., unübertreffl., wirft leicht ab.  
 Insubria, regelm., reich gef., feur. carm., oft we. gef., sehr empfehlensw.  
 Inocenza, fast regelm., rosenform., rein we.  
 Iride, ganz regelm., Form der Pr. Bacciochi, carmoisinrosa mit hellen Spigen, sehr schön.  
 fl. 2. — fl. 6.  
 Isabella II., rein weiß, rosenförmig, regelm., ausgezeichnet. fl. 4. bis 8.



- \* Jacksoni (Verschaffelt), wird als schönste, dunkle, gestreifte Blume gerühmt. fl. 3.  
 Jardin d'hyver, ganz regelmässig, rosa-carmin.  
 Jeffersoni, regelm., reich carmin, sehr empfehlenswerth.  
 Jubile (Low), sehr regelm., we., leicht geröthet, rosa gestr., mit gelbl. Centrum. fl. 2 — 6.  
 Juliana (Climax, Comtesse Rambaldo), gef. rosenförm., we., fl. 3.  
 King, anemonef., sehr reich, milchw., oft mit Rosa, empfehlensw.  
 Lady Broughton, regelm., scharlach, extra. fl. 5.  
 Lady Grafton, stark pomponbl. hellcarm., stark geadert.  
 Lady Hill, in der Art der punctata.  
 Landrethi, regelm., Liebl. hellrosa.  
 La Reine, fast die Form und Farbe der candidissima, spars. gestr., sehr schön.  
 Lawrenceana, Bau und Farbe der eximia, nicht willig.  
 Leda, regelm., rosenf., glänz. weis., oft zart gestr., sehr schön.  
 Lecana superba, ganz regelm., sehr reich, dunkelscharl., immer noch eine der unentbehrlichsten Blumen.  
 Lefevriana, pomponbl., dunkelrosa, früh und will.  
 Le 8 Août. fl. 3. 30 kr.  
 Leodora, in der Art der Carswilliana fl. 2.  
 Leopolda. fl. 2.  
 Leopoldina, pomponbl., eine der schönst. punktir. Camellien.  
 Linkii, wahrscheinf. einerlei mit Catherine Longhi.  
 Lowii, ganz regelm., reich, dunkelscharl., vorzügl.  
 Madam Fetters, reich scharlach, vorzüglich. fl. 2 — 5.  
 Madoni, regelm., reich, rosenförm., we., rosa punkt., vortreflich und willig blühend.  
 Magdaleine, regelm., reich, fein scharl.  
 Magnifica, sehr gr., reich gef., lebhaft salmr.  
 Magnifica perfecta, gr. Aehnlichkeit mit Adelaide und Traversi.  
 Maometo, fast regelm., sehr gr., rund, dunkelforallenz., empfehlensw.  
 Marchese Therese d'Ambr. fl. 2.  
 Marchioness of Exeter, fast regelm., sehr gr., rosa.  
 Maria Dorothea, pomponf., reich gef., rein we., sehr willig und frühblühend.  
 Maria Eliza, (Buist), pomponf., reich gef., we., mit rosa und gelblich, sehr schön und willig.  
 Maria Luigia di Parma, einers. mit admirabilis, hochscharlach, weis. gesteckt.  
 Maria Theresa, ganz regelm., we., mit carmin punkt.  
 Marianne Trivulgio, regelm., rein we. mit carm. gestr. fl. 2 — 6.  
 \* Marie Morren. fl. 2.  
 Masters double red, eine reichere variegata.  
 Mathotiana, reicher in Farbe als Amalthea oder Bruceana fl. 1. 30 kr. — fl. 4.  
 Mazzuchelli, übertrifft die Carswelliana, vorzüglich.  
 Medicea, pomponbl., oft fast regelm., fein carmin-scharl., vortreflich.  
 Meloni, beschrieben als weis. und rosa, carmin gestreift, von schönster Form. fl. 4 — 5e.  
 Meneghini, ganz regelm., carmin, sehr schön.  
 Micans, in Fülle und Farbe fast die eximia übertreffend.  
 Miniata (Low), regelm., rosenförm., hochscharl., prächt. fl. 2 — 10.  
 Mistriss Abby Wilder, ganz regelm., die vollkommenste der weissen Blumen. fl. 2 — 10.  
 Mistriss Gunnel (America), eine der edelsten, regelmässigen, rein weissen Musterblumen. fl. 1. 30 kr. bis fl. 12.  
 Modesta rubra, fast regelm., carmin.  
 Monarch, carmoisin, eine sehr imponirende lebhaft dunkelrothe, oft panaschirte Blume.  
 Montblanc, fugelbl., sehr reich, rein we.  
 Monteroni, ganz regelm., rosenförm., bis jetzt neben M. Abby Wilder die schönste weisse Camellia, blühet leider nicht sehr reichlich.  
 Monteroni rosea, eine Auszeichnung von Mont. in fleischfarb., unübertrefflich. fl. 2 — 5.  
 \* Monteroni rubra (Italien) carmin, weis. gestreift fl. 2.  
 Montfortiana vera, grosse Aehnlichkeit mit Ottoniana.  
 Murrayana vera, anemonef. lebhaft carmin-scharlach.  
 Myrtifolia alba, regelm., rein we., sehr schätzbar und willig.  
 Napoleon (Mariani), pomponbl., sehr gr., dunkelscharl.  
 Nassiniana, regelm., in Form eines Sechsecks, fein carmin, vorzügl. und sehr willig.  
 Neoboracensis, eine gr. imponirende Blume in scharlach.  
 Negri, regelm., we., rosa punktir., spätblüh.  
 Nec plus ultra (America), pomponf., zimobertarm.  
 Nec plus ultra (Italien), reizend weis.-fleischfarb. fl. 2 — 5.



- Nicholsii, pompenbl., zinnobercarmin, sehr willig.  
 Nitida (*Chandler*), regeln., reich, hellfcharl., sehr schäpbar.  
 Nobilissima, pompenbl., rein we., sehr früh und willig.  
 Norma, fl. 2.  
 Ochroleuca, regeln., reich gef., we. mit gelbem Schimmer, sehr schäpbar.  
 Odorata vera, oft regeln., rosenf., lebh. dunkelfrofa.  
 Onor di Bibiani, ganz regeln., gleichmäßig, glänzend weiß, fein rosa gestreift.  
 Optima (*Low*), rosa mit carmoisin gestreift, prächtig. fl. 3.  
 Ottoniana, anemonenf., schalenf., glänzend tiefrofa.  
 Origlomanna superba, gr. Ähnlichkeit mit Sweetiana (*Colwill*).  
 Palagi, sehr gr., dicht gef., pomponf. od. fugelbl.; eine der imponirendsten punkt. Blumen, in der Art der Sweetiana (*Colwill*).  
 Pallade, fast regeln., milchwe., zart gebänd., sehr empfehlensw.  
 Palmeri, ganz regeln., sehr fein carmin, unübertreffl., von auffallend kurzem niederen Wuchse.  
 Palmers perfection, regeln., dunkelcarmin, oft etwas klein.  
 Paolo e Virginia, schneeweiß, dunkelroth punktiert, sehr auffallend fl. 2 — 6.  
 Parini vera, starke krause Pomponf., fleischf., reich und fein punktiert.  
 Parksii, in der Art der variegata.  
 Pavonia. Sehr ähnlich der althaeiflora.  
 Pensylvanica, regeln., prächtig rofa, in der Art der cruciata.  
 Picta (*Loddiges*), regeln., sehr gr., glänz. rosa mit we. Flecken, vorzüglich.  
 Pictorum rosea, regeln., sehr gr., lebhaft rofa.  
 Pio IX. (*Faroli*), schneeweiß, fugelörm., regeln., wunderschön. fl. 3. — 5.  
 Pirzio, anemonenf., gr., we., rosa gebändert.  
 Pisani, regeln., reich gef., we., Schaublume. fl. 2 — 6.  
 Pomponia, die alte weiße pompenblüthige.  
 — aurea, we. mit stark gelbl. Schimmer.  
 Powathan (*Floys*), gr., reich gef., anemonenf., auffall. rund, dunkelcarmoisin.  
 Pratti, regeln., gr. u. reich gef., hellrofa, oft weißlich gestr.  
 Prince de Trubetzkoi. fl. 1. 30 kr.  
 Prince of Wales, dicke Pomponf., zinnobercarmin.  
 Princesse Adelaide, in der Form und Farbe der treffl. incarnata, mit carmin punkt. u. gestr. fl. 2 — 10.  
 Princesse Bacciochi, ganz regeln., sehr fein, reich dunkelcarmin, sehr schäpbar.  
 Princesse Mathilde.  
 Princesse royale, fast regeln., fcharlachroth.  
 Procapitans alba, in der Art der alba grandiflora, sehr willig.  
 Pulchella rosea (*Halley*), regeln., sehr gr., fein salmrosa, sehr imponirend.  
 Pulverulenta, in der Art der Reevesiana.  
 Punctata rosea, eine rothgelbe. punctata.  
 \* Queen of Denmark. fl. 12.  
 Queen of England (*Fielder*), in der Art der Saccoi nova.  
 Queen of great Britain, gr., fcharlachcarmin.  
 Queen of Portugal, in der Art der picturata.  
 Queen Victoria (*Pressley*), fast regeln., dunkelroth, oft weiß gestr.  
 Radesckio, hochfcharlach. fl. 1. 30 kr.  
 Reevesiana, anemonenf., hellfcharlach.  
 Regina d'Italia, regeln., schön gerundet, prächtig rosa mit weißen Mittelfstreifen, von auffallend kräftigem Wuchse fl. 2 — 20.  
 Regina d'Ingliterra, schöner als imbricata alba.  
 Regularis, zeigte einige Ähnlichkeit mit nec plus ultra (*America*).  
 Reine de France.  
 Reine des fleurs, regeln., gr., dunkelroth, vorzüglich.  
 Reine des Vierges. fl. 1. 30 kr.  
 \* Renica, fcharlach mit weiß marmorirt, regeln. fl. 3 — 6.  
 Ridolphi, anemonenf., weiß, gelblich schimmernd.  
 Rising Sun, beidr. als ganz regeln., sehr gef., feurig dunkelroth.  
 Ristori, fast regeln., violettroth mit breiten hellen Mittelfstreifen.  
 Robertsoni, regeln., gr., die schönste in leuchtend dunkelfcharlach, leider nicht willig.  
 Romolo. fl. 2.  
 Rosa bostonia, ganz regeln., reich carmin vom ersten Rang. fl. 2 — 15.  
 — d'Orleans, eine Ausweichung der Duchesse d'Orleans in Rosa.  
 — regis, eine Ausweichung der King in Rosa. fl. 2 — 4.



- Rubescens (*Low*), regelm., carminroth, weißlich gestreift.  
 Rugosissima major (*graciosa*), besser und dichter als Vandesiana carnea; sehr imponirend.  
 Saccoi nova, eine der schönsten, regelmäßigen, willigstblühenden Camellien von der lieblichsten Rosafarbe. (In Prachteremplaren abgeblüht.)  
 Saffo, regelm., dicht, reich carmin-rosa.  
 Samoiloff, regelm., reich, carminroth.  
 Sarah Frost, regelm. rosa-carmin, mit hellen Mittelstreifen, vorzügliche Preisblume im J. 1850.  
 Scaramouche, regelmäßig, rosa carmin. fl. 1. 30 kr.  
 Scazzosi, carmin, fein gefleckt. fl. 4.  
 Schrymakersi nova, doppelt anemonenbl., tief korallenscharlach.  
 Scylla, Form und Färbung der eximia, scharlach-carmin.  
 Servi, regelm., dunkelscharlach.  
 Sgariglio (*Croff*). fl. 4.  
 Sherwoodii, fast regelm., gr., dunkelrosa.  
 Sovereign (*Low*) fl. 2 — 6.  
 Species nova (*Mac-Nab*), aus China, mit sehr großem Blatt. fl. 15.  
 Spiralis alba, beschrieben als schön weiß, regelm. fl. 2.  
 Spiralis nova, regelm., fein carmin, weißlich gestreift.  
 Splendidissima alba, Pomponf., dicht, rein weiß.  
 Squamosa, regelm., reich, carmin-roth, vorzüglich.  
 Sterope, anemonenf., feurig, dunkelscharlach.  
 Striped major, in der Art der picturata, durchaus vorzüglich.  
 Sulcata, regelm., weiß mit gelbl. Mittelstreifen, spätblühend.  
 Sweetiana (*Colwell*), pomponbl., eine der vorzüglichsten punktirten Blumen.  
 Sylvia, Form der Chandleri, gesättigt dunkelscharlach.  
 Tambroniana, pomponf., röthlich-weiß, fein punktirt.  
 Tavarin, pomponf. sehr groß, zinnobercarmin, schön.  
 Teutonia, regelm., reich, oft hellrosa, oft rein weiß und gestr., vorzügl.  
 — incarnata, eine Ausweichung in unvergleichlicher Zärte fl. 2 — 6.  
 Tissifone, fl. 1. 30 kr.  
 Tomasini, regelm., zart rosa, sehr willig.  
 Tompsoni superba, runde dicke Pomponf., zinnober-carmin, höchst empfehlenswerth.  
 Torielli, größer und reicher als cruciata.  
 Tosi, regelm., dunkler als pendula.  
 Traversi plenissima, wie Adelaide.  
 Trebbiensis. fl. 2 bis 5.  
 Tricolor, dopp., geröth., weiß, mit breiten carminrothen Bändern.  
 Trionfo di Cernebbio, weiß, gestreift und gefleckt. fl. 2. — 6.  
 Triomphe de la ville Ciani. fl. 2 bis 5.  
 Triomphe de Milan, pomponbl. weiß mit rosa punktirt.  
 Triumphans, fugeblüthig, lebhaft licht-rosa, vorzüglich.  
 Tryphosea, pomponbl., rein weiß, gelblich.  
 Turnbulli, eine verbesserte Egertonia.  
 Valeriana, anemonenbl., rosenf., fein scharlach.  
 Variegata, die alte, unregelm., rosa mit weiß gefleckt.  
 Variegata alba, unregelm., reich gef., weiß, rosa gestreift.  
 Varischi, einerlei mit cruciata.  
 Vauxii, ähnlich der Murrayana vera.  
 Verschaffelti, lebhaft rosa, schön gestreift.  
 Vestalis, regelm., rein weiß, gelblich schimmernd.  
 Vesuvio, anemonenf., feurigtes Scharlach.  
 Vexillo di Flora, fast regelm., fein rosa-carmin.  
 Vexillo Lombardo. fl. 2 bis 5.  
 Victoria Antwerpensis, pomponbl., rein weiß.  
 — rosea, eine Ausweichung im zärtesten Fleischfarb-rosa.  
 Villageoise, pomponbl., gestr. u. punktirt, in der Art der Leopoldina.  
 Violacea superba, monströs, oft fast regelm., gr., dunkelroth, vorzüglich.  
 Vittata vera, pomponbl., rein weiß, groß und schön.  
 Waardii, anemonenbl., dicht, dunkelscharlach.  
 Washingtonia, sehr gr., zuweilen die größte aller Camellien-Blumen, in Form und Farbe der Amalthea ähnlich.

Wellsiana, in der Art der Eclipse rosea und Galleesii.  
 Wilderi, edelste regelmäßige Form, sehr reich, lebhaft zart rosa. H. 2 — 15.  
 Youngii, anemonenf., gr., leuchtend rosa-carmin.  
 Camellia reticulata, doppelt, großblühende lebhaft rosafarbene.

## Georginen oder Dahlien

### und Pflanzen für feine Blumenbeete im freien Lande.

Das vollständige Preissverzeichniss über Georginen oder Dahlien, die geschätztesten Neuheiten enthaltend, wird jedesmal zu Ende Januar gratis ausgegeben. Dasselbe enthält ferner eine Auswahl von schönblühenden Pflanzen, welche sich zur Auspflanzung ins freie Land für feine Blumenbeete besonders eignen.

## Schlingpflanzen &c.

für Spaliere in Zimmer, gleichwie passende Gegenstände für die Zimmerdecoration, Hängevasen etc. zu den billigsten Preisen.



## Levgoyen- und Aster-Samen

in vorzüglichster Qualität.

Sommer-Levgoyen, 50 Sorten, jede à 100 Korn fl. 1. 50 kr.

|              |    |   |   |   |    |    |
|--------------|----|---|---|---|----|----|
| 24           | —  | — | — | — | 12 | —  |
| 20           | —  | — | — | — | 1  | —  |
| 16           | —  | — | — | — | 48 | —  |
| 12           | —  | — | — | — | 56 | —  |
| 8            | —  | — | — | — | 24 | —  |
| Röhr - Aster | 20 | — | — | — | 1  | —  |
|              | 12 | — | — | — | —  | 56 |
| Kugel- —     | 10 | — | — | — | —  | 50 |
| Zwerg- —     | 20 | — | — | — | 1  | —  |
|              | 12 | — | — | — | —  | 56 |
| Pyramiden- — | 16 | — | — | — | —  | 48 |
| Türkische —  | 8  | — | — | — | —  | 24 |

Andere Sommerblumensamen besorgen wir gerne aus bester Quelle oder nach Auftrag.

## Gras - Samen.

Zur Anlage von Rasenplätzen und Kunstwiesen:

Lolium perenne, englisches Raygras pr. Pfund 15 kr.

pr. 100 Pfund fl. 20.

Dessgleichen verschiedene beste Grasarten gemischt.

Ausserdem übernehmen wir alle auf das Gartenwesen bezüglichen Geschäfte, neue Anlagen und Pflanzungen jeder Art, sowohl an hiesigem Orte als auswärts, unter Zusicherung pünktlichster und billigster Ausführung.

Beigegen- und Acker-Samen

Inhalts - Verzeichniss.

Sommer-Beigegen, 50 Sorten, jede 2 100 Korn R. 1. 50 kr.

|  |        |    |
|--|--------|----|
| Tafel- und Oeconomie-Obst-Sorten                           | Seite: | 5  |
| Propfreier   | "      | 11 |
| Spargelpflanzen  | "      | 12 |
| Gehölz- und Ziersträucher                                  | "      | —  |
| Azalea für das freie Land                                  | "      | 15 |
| Magnolien  | "      | 18 |
| Pæonia Moutan  | "      | 19 |
| Coniferen oder Nadelhölzer                                 | "      | 22 |
| Ziersträucher in Töpfen und Vasen                          | "      | 26 |
| Rosensortiment   | "      | —  |
| Staudengewächse (Perennirende Pflanzen)                    | "      | 36 |
| Phlox  | "      | 41 |
| Verbenen   | "      | 42 |
| Gewächshaus - Pflanzen                                     | "      | —  |
| Cinerarien   | "      | 44 |
| Pelargonien  | "      | 50 |
| Warmhaus - Pflanzen  | "      | 52 |
| Einige Wasserpflanzen                                      | "      | 54 |
| Earrenkräuter  | "      | 55 |
| Azalea indica  | "      | —  |
| Rhododendron   | "      | 58 |
| Camellien  | "      | 61 |
| Georginen oder Dahlien und Pflanzen für Blumenbeete        | "      | 68 |
| Schlingpflanzen etc.                                       | "      | —  |
| Einige Blumensamen   | "      | 69 |
| Grassädmen   | "      | —  |
| Ueberrahme aller auf das Gartenwesen bezüglichen Geschäfte | "      | —  |



**V e r z e i c h n i s s**  
der verschiedenen  
*feinen Tafel- und Oeconomie-Obstsorten,  
Gehölze für Garten-Anlagen, Gewächshaus-  
Pflanzen,*  
aus den Sammlungen  
von  
**S. & J. R i n z ,**  
Kunst- und Handels-Gärtner,  
in  
**FRANKFURT AM MAIN.**

**Herbst**

**1854.**

**European Nursery Catalogues**

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Wageningen University & Research – Library  
Digital version sponsored by:  
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)